

SH.A. AYUPOV
M.M. IBRAGIMOV
K.K. KUDAYBERGENOV

FUNKSIONAL ANALIZDAN
MISOL VA MASALALAR

85.32

P-78

Taqrizchilar:

V.I. Chilin

M. Ulug'bek nomidagi O'zMU professori,
fizika-matematika fanlari doktori

R.M. Turgunbayev

Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti,
fizika-matematika fanlari nomzodi

Ayupov Sh.A. va boshq. Funksional analizzdan misol va masalalar: o'quv qo'llanma. Ayupov Sh.A., Ibragimov M.M., Kudaybergenov K.K.; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. – Nukus: Bilim, 2009. – 304 b.

Qoraqalpoq davlat universiteti ilmiy-metodik kengashining 2009 - yil 30 - avgustdag'i 1-sonli bayonnomasi bilan tavsija etilgan.

BBK 85.32P78

Ushbu o'quv qo'llanma oliy ta'lif muassasalarida tahsil olayotgan bakalavriat talabalarini funksional analizning asosiy tushunchalari (to'plamlar nazariyasi, o'lchovlar va Lebeg integrali, metrik fazo, chiziqli, normalangan, Hilbert fazolari, ularda aniqlangan operator va funksionallarning xossalari va ularning integral tenglamalarga tatlbiqlari) bilan tanishtirishga mo'ljalangan.

© Ayupov Sh. A., Ibragimov M.M.
Kudaybergenov K.K., 2009
© Nukus «Bilim» 2009

M U N D A R I J A

Kirish	5
I. To'plamlar nazariyasi elementlari	7
§ 1.1. To'plam tushunchasi. To'plamlar ustida amallar	7
§ 1.2. Akslantirishlar. O'zaro bir qiyamatli mosliklar	16
§ 1.3. To'plamning quvvati tushunchasi	22
II. O'lchovlar nazariyasi elementlari	33
§ 2.1. O'lchov, tushunchasi	33
§ 2.2. O'lchovli funksiyalar	44
§ 2.3. Lebeg integrali	59
III. Metrik fazolar	74
§ 3.1. Metrik fazolar	74
§ 3.2. Metrik fazolarda kompakt to'plamlar	89
§ 3.3. Qisqartirib akslantirish prinsipi va uning tatbiqlari	96
IV. Normalangan fazolar	106
§ 4.1. Chiziqli fazolar va chiziqli funksionallar	106
§ 4.2. Normalangan fazolar	122
§ 4.3. Evklid va Hilbert fazolari	144
V. Topologik fazolar	162
§ 5.1. Topologik fazolar	162
§ 5.2. Topologik fazolarda kompaktlik	177
§ 5.3. Chiziqli topologik fazolar	184
VI. Chiziqli operatorlar	196
§ 6.1. Chiziqli operatorlar	196
§ 6.2. Uzluksiz chiziqli funksionallar	214
§ 6.3. Qo'shma fazolar	229
§ 6.4. Kuchsiz topologiya va kuchsiz yaqinlashish	239
VII. Chiziqli operatorlar fazosi	250
§ 7.1. Chiziqli operatorlar fazosi	250

K I R I SH

§ 7.2. Chiziqli operatorlar spektri	262
§ 7.3. Kompakt operatorlar	271
§ 7.4. Integral operatorlar va tenglamalar	283
Adabiyotlar	296

Funksional analiz fani XX asrning boshlarida matematik analiz, algebra, geometriya fanlaridagi tushuncha va metodlarni umumlashtirish natijasida paydo bo'lib, hozirgi zamон matematikasining eng ahamiyatlil bo'lmalarining biri hisoblanadi. Bu fanning paydo bo'lishi va rivojlanishi dunyoga taniqli olimlar bo'lgan D. Hilbert, F. Riss, S. Banax, M. Freshe, A.N. Kolmogorov, S.L. Sobolev, A.N. Tixonov, S.M. Nikolskiy kabiarning nomlari bilan bog'liq.

Funksional analiz nazariyasi metodlaridan matematikaning xohlagan yo'nalishini o'rganishda foydalananish mumkin. Shu sababli, tuklif etilayotgan o'quv qo'llammaning zamonaviy matematikani chuqur o'rgannoqchi bo'lgan universitetlar, pedagogika institutlari talabalariga, hamda matematika famiga qiziquvchli boshqa o'quvchilarga ham foydasi katta deb o'yaymiz.

Funksional analiz fani bo'yicha rus, ingliz va boshqar tillarda juda yaxshi yozilgan adabiyotlar ko'p. O'quvchilarga o'zbek tilida taqdim etilayotgan bu o'quv qo'llamma oliv o'quv yurtlari "Matematika" va "Amaliy matematika va informatika" ta'lim yo'nalishshari uchun funksional analiz fani bo'yicha o'quv dasturiga mos yozildi.

Qo'llamma 7 bobdan iborat bo'lib, funksional analiz fani bo'yicha misol va masalalar berilgan. Birinchi bob to'plamlar nazarイヤasi elementlariga bag'ishlangan bo'lib, to'plam tushunchasi, to'plamlar ustida amallar, aksantirishlar, ozaro bir qiymatli mosliklar, ekvivalent va sanoqli to'plamlarga misollar berilgan.

Ikkinchi bob o'ichovlar nazarイヤasi elementlariga bag'ishlangan bo'lib, unda o'ichov tushunchasi, o'ichovli funksiyalar va Lebeg integrallariga misollar berilgan.

Uchinchchi bobda metrik fazolarga bag'ishlangan bo'lib, metrik fazolar, metrik fazolarda kompakt to'plamlar va qisqartirib aksantirish prinsipi va uning tatbiqiariga misollar berilgan.

To'rtinchi bobda chiziqli fazolar va chiziqli funksionallar, normalangan fazolar, Evklid va Hilbert fazolariga misollar berilgan.

Beshinchchi bobda topologik fazolar, topologik fazolarda kompaktlik va chiziqli topologik fazolarga misollar berilgan.

Oltinchi bobda chiziqli operatorlar, uzluksiz chiziqli funksionallar,

qo'shma fazolar, kuchsiz topologiya va kuchsiz yaqinlashishlarga misollar berilgan.

Yettinchli bobda chiziqli operatorlar fazosi, chiziqli operatorlar spektri, kompakt operatorlar, integral operatorlar va tenglamalarga misollar berilgan.

O'quv qollanmanni tayyorlashda katta hissa qo'shgan Qoraqalpoq davlat universiteti funksional analiz kafedrasi o'qituvchilari F.-m.f.n. S.J. Tleumuratov, A.J. Arziyev, J. Seyfullayev va T.S. Kalandarovlarga mualliflar o'zlarining chuqur minnatdorchiligini bildiradi.
O'quv qollanmaning taqrizchilari prof. V.I. Chilinga, dotsent R. Turgunbayevlarga qimmatli maslahathari uchun mualliflar o'zlarining chuqur minnatdorchiligini bildiradi.

I BOB

To'plamlar nazariyasi elementlari

1.1. To'plam tushunchasi. To'plamlar ustida amallar

Matematikada har xil to'plamlar uchraydi. Masalan, tekitlikdag'i barcha nuqtalar to'plami, barcha ratsional sonlar to'plami, barcha juft sonlar to'plami va hokazo. To'plam tushunchasi juda keng ma'nodagi tushuncha bo'lgani uchun uning ta'rifini berish juda qiyin. Shuning uchun bu tushuncha odatda ta'rifisiz qabul qilinadi.

To'plamlar lotin alifbosining 'bosh A, B, C, \dots ' harflari bilan, to'planning elementlari esa kichlik a, b, c, \dots harflari bilan belgilanadi. Biror a buyumning A to'planning elementi ekanligi $a \in A$ ko'rinishda, a buyumning A to'plamiga tegishli emasligini $a \notin A$ kabi yoziladi. Masalan, A to'plam sifatida barcha natural sonlar to'plamimi olsak, u holda $2 \in A$ va $-2 \notin A$. Birorta ham elementi bo'lмаган to'plan $bo'sh$ to'plam deyiladi va $u \notin A$ ko'rinishda belgilanadi. Bo'sh to'planga $x^2 + 1 = 0$ tenglamaning haqiqiy yechimlari to'plani misol bo'ldi.

Agar A to'planning har bir elementi B to'planning ham elementi bo'lsa, u holda A to'plami B to'planning *qism to'plami* deyiladi va $A \subset B$ ko'rinishda belgilanadi. A va \emptyset to'plamlar A to'plamining *tosmasi* *qism to'plamlari* deyilib, A to'plamining boshqacha qismi to'plamlari uning *xos qism to'plamlari* deb ataladi.


1. $A = \{2, 3, 4, 5\}$ va $B = \{-1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ bo'lsa, u holda A to'plami B to'plamining xos qismi to'plami bo'ldi.

2. $A = \{1, 3, 6, 9\}$ va $B = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ to'plamining hech biri ikkinchisining qismi to'plami emas.

3. Barcha butun sonlar to'plami barcha ratsional sonlar to'plamining xos qismi to'plami bo'ldi.

Agar $A \subset B$ va $B \subset A$ bo'lsa, u holda A va B to'plamlari o'zaro teng deyiladi va $A = B$ ko'rinishda belgilanadi. A va B to'plamlarining o'zaro teng emasligini $A \neq B$ ko'rinishda belgilaymiz.

A va B to'plamlarning kamida bittasiga tegishli bo'lgan barcha elementlardan iborat to'plam A va B to'plamlarining *birlashmasi* deb atadi va $A \cup B$ ko'rinishda belgilanadi.



1-rasm


4. $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ va $B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$ bo'lsin. U holda $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$ bo'ladi.

5. Agar A barcha juft sonlar to'plami, B barcha toq sonlar to'plami bo'lsa, u holda $A \cup B$ barcha butun sonlar to'plamidan iborat bo'ladi.

Biror X to'plami berilgan bo'lib, uning har bir x elementiga ba'zi A_x to'plami mos qo'yilgan bo'lsin. Elementlari A_x to'plamlardan iborat \mathcal{N} to'plamni *to'plamlar sistemasi* deb ataymiz va uni $\mathcal{N} = \{A_x : x \in X\}$ ko'rinishda yozamiz.

\mathcal{N} to'plamlar sistemasining birlashmasi deb A_x to'plamlarning kamida bittasiga tegishli bo'lgan barcha elementlardan iborat to'plamga aytildi va bu to'plam $\bigcup A_x$ ko'rinishida belgilanadi.

A va B to'plamlarning ikkalasiga ham tegishli barcha elementlardan iborat to'plamga bu to'plamlarning *kesishmasi* deyiladi va bu to'plam $A \cap B$ ko'rinishda belgilanadi.



2-rasm

6. $A = \{6, 8, 10, 12, 14\}$ va $B = \{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17\}$ bo'lsa, u holda $A \cap B = \{12, 14\}$.

7. A to'plami 3 ga karrali sonlardan, B to'plami esa 4 ga karrali sonlardan iborat bo'lsa, u holda $A \cap B$ to'plami 3 va 4 sonlariga umumiy karrali sonlardan iborat bo'ladi.

$\mathcal{H} = \{A_x\}$, $x \in X$ to'plamlar sistemasining kesishmasi deb har bir A_x to'plamga tegishli bo'lgan barcha elementlardan iborat to'plamga aytiladi va bu to'plam $\bigcap A_x$ ko'rinishda belgilanadi.

Agar $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa, u holda A va B to'plamlari o'zaro kesishmaydigan to'plamlar deb ataladi. Misol uchun, barcha ratsional sonlar to'plami bilan barcha irratsional sonlar to'plami o'zaro kesishmaydigan to'plamlar bo'ladi.

A to'plamning B to'plamga tegishli bo'lмаган barcha elementlari dan iborat to'plam A va B to'plamlarning ayirmasi deb ataladi va $A \setminus B$ ko'rinishda belgilanadi.

8. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ va $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ bo'lsa, u holda $A \setminus B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

9. Barcha haqiqiy sonlar va barcha ratsional sonlar to'plamlarining ayirmasi barcha irratsional sonlar to'plamidan iborat bo'ladi.

$A \setminus B$ va $B \setminus A$ to'plamlarning birlashmasiga A va B to'plamlarining simmetrik ayirmasi deyiladi va bu ayirma $A \Delta B$ ko'rinishda belgilanadi:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

10. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ va $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ bo'lsa, u holda

$$A \Delta B = \{1, 2, 3, 4, 10, 11, 12\}.$$

11. Barcha haqiqiy sonlar to'plami bilan barcha ratsional sonlar to'plamining simmetrik ayirmasi barcha irratsional sonlar to'plamidan iborat bo'ladi.

Birinchi elementi A to'plamga, ikkinchi elementi esa B to'plamga tegishli bo'lган barcha (a, b) juftliklar to'plami A va B to'plamlarning dekart (to'g'ri) ko'paytmasi deb ataladi va bu ko'paytma $A \times B$ ko'rinishda belgilanadi.

12. \mathbb{R} barcha haqiqiy sonlar to'plami bo'lsa, u holda $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tekislikdagi barcha nuqtalardan iborat bo'ladi.

13. \mathbb{Q} orqali to'g'ri chiziqdagi barcha ratsional sonlar to'plamini belgilaylik. U holda $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ tekislikdagi koordinatalari ratsional sonlardan iborat barcha nuqtalar to'plamidan iborat bo'ladi.

Ba'zida qaralayotgan barcha to'plamlar biror X to'plamning qism to'plamlari bo'lsa, u holda X fazo deb ataladi.

$X \setminus E$ ayirma (bu yerda $E \subset X$) E to'plamning X to'plamiga nisbatan to'ldiruvchisi deb ataladi va \mathbf{CE} ko'rimishda belgilanadi.

14. $X = [-1, 2]$ va $E = (0, 1)$ bo'lsa, u holda $\mathbf{CE} = [-1, 0] \cup [1, 2]$.

15. \mathbb{R} barcha haqiqiy sonlar to'plami, \mathbb{Q} barcha ratsional sonlar to'plami bo'lsa, u holda \mathbf{CQ} barcha irratsional sonlar to'plami bo'ladi.

Masalalar

1.1.1. Isbotlang:

$$a) (A \cap C) \cup (B \cap D) \subset (A \cup B) \cap (C \cup D);$$

$$b) (B \setminus C) \setminus (B \setminus A) \subset A \setminus C;$$

$$c) A \setminus C \subset (A \setminus B) \cup (B \setminus C).$$

Yechimi. a) $\forall x \in (A \cap C) \cup (B \cap D) \Rightarrow x \in A \cap C$ yoki $x \in B \cap D \Rightarrow (x \in A \text{ va } x \in C)$ yoki $(x \in B \text{ va } x \in D) \Rightarrow (x \in A \text{ yoki } x \in B) \text{ va } (x \in C \text{ yoki } x \in D) \Rightarrow x \in A \cup B \text{ va } x \in C \cup D \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \Rightarrow (A \cap C) \cup (B \cap D) \subset (A \cup B) \cap (C \cup D)$.

b) $\forall x \in (B \setminus C) \setminus (B \setminus A) \Rightarrow x \in B \setminus C \text{ va } x \notin B \setminus A \Rightarrow (x \in B \text{ hamda } x \notin C) \text{ va } (x \in B \text{ hamda } x \in A) \Rightarrow x \in A \setminus C \Rightarrow (B \setminus C) \setminus (B \setminus A) \subset A \setminus C$.

c) $\forall x \in A \setminus C \Rightarrow x \in A \text{ va } x \notin C \Rightarrow x \in A \setminus B \text{ yoki } x \in B \setminus C \Rightarrow x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus C) \Rightarrow A \setminus C \subset (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$.

1.1.2. $A \setminus B = C$ tengligidan $A = B \cup C$ tengligi kelib chiqadimi?

Yechimi. Kelib chiqmaydi. Misol uchun $A = [0, 2]$, $B = [1, 4]$ bo'lganda $A \setminus B = [0, 1)$ bo'lib, $B \cup C = [0, 4]$ bo'ladi.

1.1.3. $A = B \cup C$ tengligining o'rinnli bo'lishidan, $A \setminus B = C$ tengligi kelib chiqadimi?


Yechimi. Umunan aytganda kelib chiqmaydi. Misol uchun $B = C \neq \emptyset$ bo'lganda $(B \cup C) \setminus B = \emptyset \neq C$.

1.1.4. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$ tengligini isbotlang.


Yechimi. $\forall x \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow x \in A \text{ va } x \notin B \cup C$. Natijada $x \in A \setminus B$ va $x \notin C$ bo'lganligidan, $x \in (A \setminus B) \setminus C$, ya'ni $A \setminus (B \cup C) \subset (A \setminus B) \setminus C$ imunosabati o'rinnli. Aksincha $\forall x \in (A \setminus B) \setminus C$ bo'lsin. U holda $x \in A \setminus B$ va $x \notin C$. Natijada $x \in A$, $x \notin B \cup C$ bo'lgani uchun $x \in A \setminus (B \cup C)$, ya'ni $A \setminus (B \cup C) \supset (A \setminus B) \setminus C$. Natijada berilgan tenglikning o'rinnli ekanligi kelib chiqadi.

1.1.5. $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$ tengligi o'rinnimi?

Yechimi. Umumiy holda bu tenglikning o'rinnli emas ekanligini quyidagi rasmlarda ko'rishiga bo'ladi.



3-rasm



4-rasm

1.1.6. Tenglikni isbotlang:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Yechimi. $\forall x \in A \Delta B \Rightarrow x \in A \setminus B$ yoki $x \in B \setminus A \Rightarrow (x \in A \text{ va } x \notin B)$ yoki $(x \in B \text{ va } x \notin A) \Rightarrow (x \in A \text{ yoki } x \in B) \text{ va } (x \notin A \text{ va } x \notin B) \Rightarrow x \in A \cup B \text{ va } x \notin A \cap B \Rightarrow x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) \Rightarrow$

$$A \Delta B \subset (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

$\forall x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) \Rightarrow x \in A \cup B$ va $x \notin A \cap B \Rightarrow (x \in A$ yoki $x \in B)$ va $(x \notin A$ yoki $x \notin B) \Rightarrow (x \in A$ va $x \notin B)$ yoki $(x \in B$ va $x \notin A) \Rightarrow x \in A \Delta B \Rightarrow$

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subset A \Delta B.$$

Deinak, $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ tengligi o'rinnli.

1.1.7. C to'plami bo'sh bo'lishi uchun ixtiyoriy A to'plami berilganda $A \Delta C = A$ tengligining o'rinnli bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Yetarliligi. $A \Delta C = A$ tengligi o'rinnli bo'lsin. U holda $(A \setminus C) \cup (C \setminus A) = A$. Bundan $C \setminus A$ to'plamning bo'sh ekanligi kelib chiqadi. Shu bilan birga, $A \setminus C = A$ bo'lgani uchun $A \cap C = \emptyset$ tengligi o'rinnli. Demak, $C = \emptyset$.

Zarurligi. $C = \emptyset$ bo'lsa, u holda

$$A \Delta C = (A \setminus C) \cup (C \setminus A) = (A \setminus \emptyset) \cup (\emptyset \setminus A) = A \cup \emptyset = A.$$

1.1.8. To'plamlar nazariyasidagi eng bir ahamiyatli tushunchalardan biri bo'lgan ikkilanganlik prinsipi quyidagi ikki tenglikka asoslangan. Shu tengliklarni isbotlang:

a) $C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha};$

b) $C(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} CA_{\alpha}.$

Yechimi. a) Dastlab $C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) \subset \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha}$ ekanligini isbotlaymiz:

$$\begin{aligned} \forall x \in C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) &\Rightarrow x \notin \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \Rightarrow \forall \alpha, x \notin A_{\alpha} \Rightarrow x \in CA_{\alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x \in \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha} \Rightarrow C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) \subset \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha}. \end{aligned}$$

Endi $\bigcap_{\alpha} CA_{\alpha} \subset C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha})$ munosabatining o'rinnli ekanligini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} \forall x \in \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha} &\Rightarrow x \in CA_{\alpha} \Rightarrow x \notin A_{\alpha} \Rightarrow x \notin \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x \in C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) \Rightarrow \bigcap_{\alpha} CA_{\alpha} \subset C(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}). \end{aligned}$$

Natijada berilgan tenglikning o'rinnli ekanligi kelib chiqadi.

b) Dastlab $C(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) \subset \bigcup_{\alpha} CA_{\alpha}$ ekanligini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} \forall x \in C(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) &\Rightarrow x \notin \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \alpha', x \notin A_{\alpha'} \Rightarrow x \in CA_{\alpha'} \Rightarrow x \in \bigcup_{\alpha} CA_{\alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow C(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) \subset \bigcup_{\alpha} CA_{\alpha}. \end{aligned}$$

Endi $\mathbf{C}(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) \supset \bigcup_{\alpha} \mathbf{C}A_{\alpha}$ munosabatning o'rini ekanligini qaraylik:

$$\begin{aligned} \forall x \in \bigcup_{\alpha} \mathbf{C}A_{\alpha} &\Rightarrow \exists \alpha', x \in \mathbf{C}A_{\alpha'} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x \notin A_{\alpha'} \Rightarrow x \in \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \Rightarrow \\ &\Rightarrow x \in \mathbf{C}(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) \Rightarrow \bigcup_{\alpha} \mathbf{C}A_{\alpha} \subset \mathbf{C}(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}). \end{aligned}$$

Natijada berilgan tenglikning o'rini ekanligi kelib chiqadi.

1.1.9. Ikkilanganlik prinsipidan foydalanib

$$\mathbf{C}(\mathbf{C}(X \cup Y) \cap (\mathbf{C}X \cup \mathbf{C}Y))$$

ifodani soddalashtiring.

Yechimi.

$$\begin{aligned} &\mathbf{C}(\mathbf{C}(X \cup Y) \cap (\mathbf{C}X \cup \mathbf{C}Y)) = \\ &= \mathbf{C}(\mathbf{C}(X \cup Y)) \cup \mathbf{C}(\mathbf{C}X \cup \mathbf{C}Y) = \\ &= (X \cup Y) \cup (\mathbf{C}X \cap \mathbf{C}Y) = \\ &= (X \cup Y) \cup (X \cap Y) = X \cup Y. \end{aligned}$$

1.1.10. Quyidagi tengliklarni isbotlang:

- a) $\mathbf{C}(CA \setminus B) = \mathbf{C}(CB \setminus A)$;
- b) $CA \Delta CB = A \Delta B$;
- c) $\mathbf{C}(CA \Delta CB) = CA \Delta B$;
- d) $\mathbf{C}(CA \Delta B) = (B \setminus A) \cup (CB \setminus CA)$.

Yechimi. a) Dastlab $\mathbf{C}(CA \setminus B) \subset \mathbf{C}(CB \setminus A)$ munosabatni ko'rsatamiz.

$\forall x \in \mathbf{C}(CA \setminus B) \Rightarrow x \notin CA \setminus B \Rightarrow x \in \mathbf{C}A, x \in B$ yoki $x \notin CA \Rightarrow x \notin A, x \notin CB$ yoki $x \in A \Rightarrow x \notin CB \setminus A \Rightarrow x \in \mathbf{C}(CB \setminus A)$;

Endi esa $\mathbf{C}(CB \setminus A) \subset \mathbf{C}(CA \setminus B)$ munosabatni ko'rsatamiz.

$\forall x \in \mathbf{C}(CB \setminus A) \Rightarrow x \notin CB \setminus A \Rightarrow x \in A, x \in CB$ yoki $x \notin CB \Rightarrow x \notin CA, x \notin B$ yoki $x \in B \Rightarrow x \in \mathbf{C}(CA \setminus B)$. Natijada berilgan tenglik kelib chiqadi.

b) $\forall x \in CA \Delta CB \Leftrightarrow x \in CA, x \notin CB$ yoki $x \notin CA, x \in CB \Leftrightarrow x \notin A, x \in B$ yoki $x \in A, x \notin B \Leftrightarrow x \in A \Delta B$.

c) $\forall x \in \mathbf{C}(CA \Delta CB) \Leftrightarrow x \notin CA \Delta CB \Leftrightarrow x \in CA, x \in CB$ yoki $x \notin CA, x \notin CB \Leftrightarrow x \in CA, x \notin B$ yoki $x \notin CA, x \in B \Leftrightarrow x \in CA \Delta B$.

d) $\forall x \in \mathbf{C}(CA \Delta B) \Leftrightarrow x \notin CA \Delta B \Leftrightarrow x \in CA, x \in B$ yoki $x \notin CA, x \notin B \Leftrightarrow x \notin A, x \in B$ yoki $x \in A, x \notin B \Leftrightarrow x \notin CA, x \in CB$ yoki $x \in CB \Leftrightarrow x \in B \setminus A$ yoki $x \in CB \setminus CA \Leftrightarrow x \in (B \setminus A) \cup (CB \setminus CA)$.

1.1.11. *Har bir $n \in \mathbb{N}$ soni uchun A_n orqali $\frac{1}{n}$ sonidan katta bo'lmagan barcha musbat ratsional sonlar to'plamini belgilaymiz. U holda $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ kesishmaning bo'sh to'plam ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. Ixtiyoriy a musbat sonini olamiz. U holda shunday $m \in \mathbb{N}$ natural soni topiladiki, $\frac{1}{m} < a$ tengsizligi o'rinni bo'ladi, ya'ni $a \notin \left(0, \frac{1}{m}\right)$. Bundan $a \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{k}\right)$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ to'plam bo'sh to'plam bo'ladi.

1.1.12. *Absolyut qiymati $\frac{n+1}{n}$ ($n \in \mathbb{N}$) sonidan katta bo'lmagan barcha haqiqiy sonlar to'plamini A_n orqali belgilaymiz. $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ kesishmasining $[-1, 1]$ segmentiga teng ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. $\forall a \in [-1, 1]$ sonini olamiz, u holda

$$-\frac{n+1}{n} < -1 \leq a \leq 1 < \frac{n+1}{n}$$

tengsizliklaridan $a \in A_n = \left[-\frac{n+1}{n}, \frac{n+1}{n}\right]$ ekanligi ko'rindi.

Endi $|a| > 1$ tengsizligini qanoatlantriruvchi ixtiyoriy a sonini olamiz. U holda shunday m soni topiladiki, $\frac{m+1}{m} = 1 + \frac{1}{m} < |a|$ tengsizligi o'rinni bo'ladi, ya'ni $a \notin A_m$. Demak, $a \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$. Natijada $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = [-1, 1]$ tengligiga ega bo'lamiz.

1.1.13. *A, B, C va D to'plamlari uchun*

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

tengligi o'rinni bo'lishini ko'rsating.

Yechimi. $\forall z = (x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D)$ element olamiz. U holda $z \in A \times B$ va $z \in C \times D$ bo'ladi. Bundan $x \in A$, $x \in C$ hamda $y \in B$, $y \in D$. Demak, $x \in A \cap C$, $y \in B \cap D$. Bu munosabatlardan

$$z = (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$$

ekanligi ko'rindi. Demak,

$$(A \times B) \cap (C \times D) \subset (A \cap C) \times (B \cap D).$$

Endi $(A \cap C) \times (B \cap D)$ to'plamdan ixtiyoriy $z = (x, y)$ element olamiz. U holda $x \in A \cap C$, $y \in B \cap D$. Bundan $x \in A$, $x \in C$, $y \in B$, $y \in D$ munosabatlari kelib chiqadi. Bu munosabatlardan esa $z \in$

$A \times B$ va $z \in C \times D$ ekanligi kelib chiqadi. U holda $z \in (A \times B) \cap (C \times D)$. Demak,

$$(A \cap C) \times (B \cap D) \subset (A \times B) \cap (C \times D).$$

1.1.14. A, B va C to'plamlari uchun

$$(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. $(A \setminus B) \times C$ to'plamdan ixtiyoriy $z = (x, y)$ element olamiz. U holda $x \in A \setminus B$, $y \in C$. Bundan $x \in A$, $x \notin B$, $y \in C$. Bu esa $z \in A \times C$, $z \notin (B \times C)$ ekanligini ko'rsatadi, ya'ni $z \in (A \times C) \setminus (B \times C)$.

Endi $z = (x, y) \in (A \times C) \setminus (B \times C)$ bo'lsin. U holda $z \in (A \times C)$, $z \notin B \times C$. Bundan esa, $x \in A$, $x \notin B$, $y \in C$. Demak, $x \in A \setminus B$, $y \in C$, ya'ni $z \in (A \setminus B) \times C$.

Natijada $(A \setminus B) \times C \subset (A \times C) \setminus (B \times C)$ va $(A \setminus B) \times C \supset (A \times C) \setminus (B \times C)$ munosabatlardan berilgan tenglik kelib chiqadi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Isbotlang:

- a) $(X \setminus C) \setminus (X \setminus A) \subset A \setminus C$;
- b) $A \Delta (A \Delta B) = B$.

2. Tengliklarni isbotlang:

- a) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$;
- b) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$.

3. $A \setminus B \subset C$ va $A \subset B \cup C$ munosabatlarning teng kuchli ekanligi isbotlang.

4. $A \supset C$ bo'lganda $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C$ tengligining o'rini bo'lishini ko'rsating.

5. Quyidagi munosabatlarning teng kuchli ekanligini isbotlang:

- a) $A \subset B$;
- b) $CB \subset CA$;
- c) $A \cup B = B$.

6. Tengliklarni isbotlang:

- a) $C(A \setminus B) = CA \cup B$;
- b) $C(C(CA \cup B) \cup (A \cup CB)) = B \setminus A$;
- c) $(A \cap B) \cup (A \cap CB) \cup (CA \cap B) = A \cup B$.

7. Ixtiyoriy E, F, G to'plamlar uchun quyidagi tengliklarning o'rini ekanligini isbotlang:

- a) $E \times (F \cup G) = (E \times F) \cup (E \times G)$;
- b) $(F \cup G) \times E = (F \times E) \cup (G \times E)$;
- c) $E \times (F \cap G) = (E \times F) \cap (E \times G)$;
- d) $(F \cap G) \times E = (F \times E) \cap (G \times E)$.

1.2. Akslantirishlar. O'zaro bir qiymatli moslik

X va Y ixtiyoriy to'plamlar bo'lzin. Agar ma'lum bir f qoida bo'yicha X to'plamning har bir elementiga Y to'plamning faqat bir elementi mos qo'yilgan bo'lsa, u holda bu moslikka X to'plamda aniqlanib, qiymatlari Y to'plamiga tegishli bo'lgan *akslantirish* deyiladi va u $f : X \rightarrow Y$ ko'rinishda yoziladi.

Misollar. 1. Har bir haqiqiy songa o'zining kvadratini mos qo'ysak, bu moslik akslantirish bo'ladi. Sababi, ixtiyoriy haqiqiy sonning kvadrati faqat bitta bo'ladi.

2. $(0, +\infty)$ to'plamga tegishli har bir haqiqiy songa uning logarifmini mos qo'ysak, bu moslik akslantirish bo'ladi.

3. $C[a, b]$ orqali $[a, b]$ segmentdagi barcha uzliksiz funksiyalar to'plainini belgilasak, u holda

$$f(x) \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

moslik $C[a, b]$ ni \mathbb{R} ga o'tkazuvchi akslantirish bo'ladi.

$f : X \rightarrow Y$ akslantirishda x elementga mos keluvchi y elementi $f(x)$ ko'rinishda belgilanadi va y elementi x elementning *obrazi* deb ataladi. Obrazi y bo'ladigan X to'plamning barcha elementlari to'plamiga y elementning *proobrazi* deyiladi va u $f^{-1}(y)$ ko'rinishda belgilanadi, ya'ni

$$f^{-1}(y) = \{x \in X : f(x) = y\}.$$

A to'plami X to'plamning biror qism to'plami bo'lzin. $f(a)$ ko'rinishdagi (bu yerda $a \in A$) barcha elementlardan iborat $\{f(a) : a \in A\}$ to'plami A to'plamning obrazi deb ataladi va $f(A)$ ko'rinishda belgilanadi:

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\}.$$

B to'plami Y to'plamning ba'zi qism to'plami bo'lzin. X to'plamning obrazi B to'plamga tegishli bo'lgan barcha elementlari $\{a \in X : f(a) \in B\}$ to'plamiga B to'plamning proobrazi deyiladi va $f^{-1}(B)$ ko'rinishda belgilanadi.

Agar $f : X \rightarrow Y$ akslantirishda $f(X) = Y$ bo'lsa, u holda X to'plamni Y to'plamning ustiga akslanadi deyiladi. Shu bilan birga, bu akslantirishni sureksiya deb haim ataymiz. Umumiy holda, ya'ni $f(X) \subset Y$ bo'lganda, f funksiyasi X ni Y ning ichiga akslantiradi deyiladi.

Misollar. 4. $y = x^2$ funksiyasi \mathbb{R} ni \mathbb{R}_+ to'plamning ustiga akslantiradi.

5. $y = 2x$ funksiya $[0, 1]$ segmentni $[0, 2]$ segmentning ustiga akslantiradi.

6. Tekislikdag'i barcha vektorlar to'plamini G bilan belgilab, har bir vektorga o'zining modulni mos qo'yaylik. Bu moslik G to'plamni \mathbb{R} to'plamning ichiga akslantiradi.

$f : X \rightarrow Y$ akslantirishda o'zaro teng bo'lмаган иктиори $x_1, x_2 \in X$ elementlar uchun $f(x_1) \neq f(x_2)$ bo'lsa, u holda f ineksiya deb ataladi.

Misollar. 7. $y = x^3$ funksiya \mathbb{R} ni \mathbb{R} ga o'tkazuvchi ineksiya bo'ladi.

8. $y = x^2$ funksiyasi ineksiya bo'la olmaydi. Chunki $-2 \neq 2$, lekin ularning obrazlari teng, ya'ni $f(-2) = f(2)$ tengligi o'rinali bo'ladi.

Bir vaqtning o'zida syureksiya va ineksiya bo'lган $f : X \rightarrow Y$ akslantirish bieksiya, yoki X va Y to'plamlar orasida o'zaro bir qiyamatli moslik deb ataladi.

Misollar. 9. Har bir natural n soniga $2n - 1$ sonini mos qo'ysak, u holda u barcha natural sonlar va barcha toq natural sonlar to'plamlari orasidagi o'zaro bir qiyamatli moslik bo'ladi.

10. $y = \operatorname{ctg} \pi x$ funksiya $(0, 1)$ interval va \mathbb{R} orasida o'zaro bir qiyamatli moslik o'rnatadi.

Masalalar

1.2.1. Ikki to'plam birlashmasining proobrazi shu to'plamlar proobrazlarining birlashmasiga teng ekanligini isbotlang:

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

Yechimi. Aytaylik, x element $f^{-1}(A \cup B)$ to'plamiga tegishli bo'lsin. U holda $f(x) \in A \cup B$. Bundan $f(x) \in A$ yoki $f(x) \in B$ munosabatlarning kamida bittasi o'rinnlidir, ya'ni $x \in f^{-1}(A)$ yoki $x \in f^{-1}(B)$. U holda $x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. Natijada, $f^{-1}(A \cup B) \subset f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ munosabatning o'rinali bo'lishi ko'rindi.

Aksincha, $x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ ixtiyoriy element bo'lsin. U holda $x \in f^{-1}(A)$ yoki $x \in f^{-1}(B)$ munosabatlarning kamida bittasi o'rinnlidir, ya'ni $f(x) \in A$ yoki $f(x) \in B$. Natijada $f(x) \in A \cup B$. U holda $x \in f^{-1}(A \cup B)$. Shuning uchun $f^{-1}(A \cup B) \supset f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. Natijada berilgan tenglikning o'rinali ekanligi kelib chiqadi.

1.2.2. *Ikki to'plam kesishmasining proobrazi shu to'plamlar proobrazlarining kesishmasiga teng ekanligini isbotlang.*

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

Yechimi. x element $f^{-1}(A \cap B)$ to'plamning ixtiyoriy elementi bo'lsin. U holda $f(x) \in A \cap B$. Bundan $f(x) \in A$ va $f(x) \in B$ munosabatlarning o'rinali ekanligi kelib chiqadi. Bu munosabatlardan esa $x \in f^{-1}(A)$ va $x \in f^{-1}(B)$ munosabatlarning o'rinali bo'lishi ko'rindi. Natijada $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. U holda

$$f^{-1}(A \cap B) \subset f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

Aksincha, $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$ ixtiyoriy element bo'lsin. U holda $f(x) \in A$ va $f(x) \in B$. Bundan $f(x) \in A \cap B$ ekanligi ko'rindi. Natijada $x \in f^{-1}(A \cap B)$. Demak,

$$f^{-1}(A \cap B) \supset f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

1.2.3. *Ikki to'plam birlashmasining obrazi shu to'plamlar obrazlarining birlashmasiga tengligini isbotlang:*

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

Yechimi. $y \in f(A \cup B)$ ixtiyoriy element bo'lsin. U holda $A \cup B$ to'plamda $y = f(x)$ tenglikni qanoatlantruvchii x element mavjud. Bu x element A yoki B to'plamning birortasiga tegishli bo'lgani uchun $y \in f(A) \cup f(B)$. Shuning uchun

$$f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B).$$

Aksincha, $f(A) \cup f(B)$ to'plamga tegishli ixtiyoriy y element olaylik. U holda $A \cup B$ to'plamda $y = f(x)$ tenglikni qanoatlantriradigan x element mavjud bo'ladi. Bundan $y \in f(A \cup B)$ ekanligi kelib chiqadi. Shuning uchun

$$f(A \cup B) \supset f(A) \cup f(B).$$

1.2.4. Agar $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya

$$f(x) = 3 \sin x + 4 \cos x$$

formula bilan aniqlansa, u holda $f([0, 2\pi])$ ni toping.

Yechimi. Bu funksiyaning $[0, 2\pi]$ dagi eng kichik va eng katta qiyamatlari:

$$\min_{0 \leq x \leq \pi} f(x) = -5, \quad \max_{0 \leq x \leq \pi} f(x) = 5.$$

f uzuksiz bo'lganligi uchun, oraliq qiymat haqidagi Boltsano – Veyershtrass teoremasidan, bu funksiya $[-5, 5]$ oraliqdagi barcha qiymatlarni qabul etadi. Demak, $f([0, 2\pi]) = [-5, 5]$.

1.2.5. Agar $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya

$$f(x) = x^3 + 3x$$

formula bilan aniqlansa, u holda $f^{-1}([0, 4])$ ni toping.

Yechimi. Funksiyaning hosilasi $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ bo'lganligidan, bu funksiya monoton o'suvchidir. Demak,

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 4$$

tengliklardan, f uzuksizligi va oraliq qiymat haqidagi Boltsano – Veyershtrass teoremasidan, bu funksiya $[0, 1]$ oraliqni $[0, 4]$ oraliqqa o'zaro bir qiymatli akslantiradi. Bundan f funksiya $[0, 4]$ dagi barcha qiymatlarni qabul etadi. Demak, $f^{-1}([0, 4]) = [0, 1]$.

1.2.6. Natural sonlar va barcha musbat juft sonlar to'plamlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatning.

Yechimi. Har bir n natural songa $2n$ juft sonini mos qo'yamiz. Bu moslik berilgan to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli bo'ladi.

1.2.7. Natural sonlar va barcha nomanfiy ratsional sonlar to'plamlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatning.

Yechimi. Nomanfiy ratsional sonlar to'plamini \mathbb{Q}^+ orqali belgilab, har bir $r \in \mathbb{Q}^+$ sonni qisqarmas kasr ko'rinishda yozib olamiz va bu kasrning surati bilan maxrajining yig'indisini r ning balandligi deb ataymiz. Balandligi berilgan songa teng bo'lgan nomanfiy ratsional sonlar cheklidir. Endi barcha nomanfiy ratsional sonlarni balandliklarining o'sish tartibi bilan yozamiz:

$$0, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, 4, \frac{1}{5}, 5, \frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \dots \quad (1.1)$$

Har bir $r \in \mathbb{Q}^+$ soniga (1.1) ketma-ketlikda turgan nomerini mos qo'yamiz. Bu moslik \mathbb{Q}^+ va barcha natural sonlar to'plamlari orasida o'zaro bir qiymatli bo'ladi.

1.2.8. $[0, 1]$ segmentni $[a, b]$ segmentiga akslantiruvchi o'zaro bir qiymatli moslikni toping.

Yechimi. $y = (b - a)t + a$ funksiya $[0, 1]$ segmentni $[a, b]$ segmentga o'zaro bir qiymatli akslantiradi.

1.2.9. Berilgan to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli f moslikni toping:

a) $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$;

- b) $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$;
c) $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

Yechimi. a) $y = \operatorname{ctg} \pi x$ funksiya $(0, 1)$ intervalini \mathbb{R} ga o'zaro bir qiymatli akslantiradi;

b) Barcha hadlari $(0, 1)$ intervalda joylashgan $\{x_n : x_n = \frac{n}{n+1}\}$ ketma-ketlikni olib, segmentning 0 nuqtasiga intervalning x_1 nuqtasini; 1 nuqtaga $x_2 \in (0, 1)$ nuqtani; $x_1 \in [0, 1]$ nuqtaga $x_3 \in (0, 1)$ nuqtani; $x_2 \in [0, 1]$ nuqtaga $x_4 \in (0, 1)$ nuqtani; umuman $x_n \in [0, 1]$ nuqtaga $x_{n+2} \in (0, 1)$ nuqtani mos qo'yib, boshqa $x \in [0, 1]$ nuqtalarga shu nuqtanining o'zini mos qo'yamiz. Bu moslik bieksiya bo'ladi.

c) Biz yuqorida o'zaro bir qiymatli $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ va $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mosliklarning mavjudligini ko'rsatdik. U holda $g \circ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ o'zaro bir qiymatli moslik bo'ladi.

1.2.10. Tekislikda koordinatalari $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ va $y < 1$ shartlarni qanoatlantiruvchi barcha nuqtalar to'plamini A orqali belgilaymiz. Barcha haqiqiy sonlar to'plami \mathbb{R} hamda A orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatiting.

Yechimi. Bu ikki to'plam orasida o'zaro bir qiymatli moslikni geometrik yo'l bilan o'rnatamiz. Ravshanki A to'plami markazi $(0, 1)$ nuqtada radiusi $r = 1$ bo'lgan aylananing $y = 1$ chiziqdan pastda joylashgan qismi. \mathbb{R} to'plami sifatida absissa o'qini olainiz. Aylana markazidan absissa oqidagi b nuqtaga kesma o'tkazsak yarim aylanani biror c nuqtada kesib o'tadi. Bu c nuqtani b nuqtaga mos qo'yamiz. Aylana markazini absissa oqining har bir nuqtasi bilan tutashtirib, kesmaning absissadagi uchiga aylananing kesma kesib o'tgan nuqtasini mos qo'yamiz. Natijada bu moslik o'zaro bir qiymatli moslik bo'ladi.

1.2.11. $[0, 3]$ va $[0, 1] \cup [2, 3]$ to'plamlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatiting.

Yechimi. $[0, 3]$ to'plamning $[0, 1]$ qism to'plamining har bir elementini o'ziga mos qo'yamiz. $[1, 3]$ to'plamdan olingan har bir x elementini $\frac{x}{2} + 1,5$ elementga mos qo'yamiz. Natijada

$$y(x) = \begin{cases} x & \text{agar } x \in [0, 1], \\ \frac{x}{2} + 1,5 & \text{agar } x \in [1, 3] \end{cases}$$

ko'rinishdag'i funksiya orqali $[0, 3]$ va $[0, 1] \cup [2, 3]$ to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslikka ega bo'lamiz.

1.2.12 $[0, 5]$ va $[0, 1] \cup [2, 3] \cup 4, 5$ to'plamlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatiting.

Yechimi. Quyidagi funksiyani qaraylik:

$$y(x) = \begin{cases} 2x, & \text{agar } x \in [0, 1), \\ x, & \text{agar } x \in [2, 3], \\ 2x - 5, & \text{agar } x \in [4, 5]. \end{cases}$$

Bu funksiya orqali $[0, 1]$ ni $[0, 2)$ ga, $[2, 3]$ ni o'ziga, $(4, 5]$ ni esa $(3, 5]$ ga o'zaro bir qiyamatli akslantiradi. Demak, $[0, 5]$ va $[0, 1] \cup [2, 3] \cup (4, 5]$ to'plamlar orasida o'zaro bir qiyamatli moslikka ega bo'lamiz.

1.2.13. Tekislikda

$$A = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$$

va

$$B = \{(x, y) : x^2 + y^2 > 1\}$$

to'plamlari orasida o'zaro bir qiyamatli moslik o'rnatning.

Yechimi. Quyidagi akslantirishni qaraylik:

$$(x, y) \in A \mapsto \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right) \in B.$$

Bu akslantirish A va B to'plamlar orasida o'zaro bir qiyamatli moslik o'rnatadi. Bu akslantirish inversiya deb ataladi.

1.2.14. Tekislikda

$$\Pi = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$$

ochiq to'rtburchak va \mathbb{R}^2 tekislik orasida o'zaro bir qiyamatli akslantirish o'rnatning.

Yechimi. 1.2.9 a)-misolga ko'ra $y = \operatorname{ctg}\pi x$ funksiya $(0, 1)$ va \mathbb{R} orasida o'zaro bir qiyamatli akslantirishdir. Bundan

$$(x, y) \in \Pi \mapsto (\operatorname{ctg}\pi x, \operatorname{ctg}\pi y) \in \mathbb{R}^2$$

akslantirish Π ochiq to'rtburchak va \mathbb{R}^2 tekislik orasida o'zaro bir qiyamatli akslantirishdir.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Tengliklarni isbotlang:

- a) $f^{-1}(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(A_{\alpha}).$
- b) $f^{-1}(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha} f^{-1}(A_{\alpha}).$
- c) $f(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} f(A_{\alpha}).$

2. Ikki to'plam kesishmasining obraz shu to'plamlar obrazlarining kesishmasiga hamina vaqt teng bo'ladimi?
3. $f(CA) = Cf(A)$ tengligi hamina vaqt o'rini bo'ladimi?
4. Guruhdag'i talabalar to'plamini A bilan, ular ta'lim olayotgan auditoriyadagi stullar to'plamini B bilan belgilaylik. Har talabaga o'zining o'tirgan stulin'i mos qo'yayliq. Bu moslik qanday hollarda:
 - a) akslantirish; b) syureksiya; c) ineksiya; d) bieksiya bo'ladi?
5. Chekli A va B to'plamlar orasida qanday hollarda o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatish mumkin?
6. Barcha natural sonlar to'plami \mathbb{N} va barcha juft sonlar to'plami \mathbb{J} orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnating.
7. Barcha natural sonlar to'plami \mathbb{N} va barcha ratsional sonlar to'plami \mathbb{Q} orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnating.
8. Aylana va to'g'ri chiziq orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnating.
9. \mathbb{R}^3 fazosidagi bir nuqtasi olib tashlangan sfera bilan tekislik orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnating.
10. Tekislikdagi ikki koordinatasi ham ratsional sonlar bo'lgan barcha nuqtalar to'plami bilan \mathbb{Q} orasidagi bieksiyani toping.
11. $[a, b]$ segmentni \mathbb{R} ga o'zaro bir qiymatli akslantiruvchi funksiya mavjudmi?
12. $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$ va $(0, 1)$ to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnating.
13. Tekislikda

$$\left\{ (x, y) : -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \right\}$$

ochiq to'rtburchak va \mathbb{R}^2 tekislik orasida o'zaro bir qiymatli akslantirish o'rnating.

1.3. To'plamning quvvati tushunchasi

Ta'rif. Agar ikki to'plam orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatish mumkin bo'lsa, u holda bu to'plamlar ekvivalent deb ataladi. A va B to'plamlarining ekvivalentlig'i $A \sim B$ kabi belgilanadi.

Agar ikkita chekli to'plam ekvivalent bo'lsa, u holda ularning elementlari soni teng bo'ladi. Cheksiz to'plamlar haqida bunday deb aytta olmaymiz. Sababi cheksiz to'plamning elementlari soni haqida tushuncha berish mumkin emas. Ixtiyoriy tabiatli ikki to'plam ekvivalent bo'lsa, u holda bu to'plamlarning quvvati teng deyiladi. Shunday qilib,

quvvat - chekli to'plamlarning elementlari soni tushunchasining cheksiz to'plamlar uchun umumlashtirilishi ekan.

A to'plamning quvvatini $m(A)$ ko'rinishda belgilaymiz. Demak, A va B to'plamlar ekvivalent bo'lsa, u holda $m(A) = m(B)$ bo'ladi. Agar bu to'plamlar ekvivalent bo'lmasa, u holda $m(A) \neq m(B)$.

Agar B to'plami A to'plamining biror qism to'plamiga ekvivalent bo'lsa, u holda B to'plamining quvvati A to'plamining quvvatidan katta emas deyiladi va bu $m(B) \leq m(A)$ yoki $m(A) \geq m(B)$ ko'rinishlarda belgilanadi.

Agar A va B to'plamlari ekvivalent bo'lmasdan, A to'plam B to'plamning qandaydir bir qism to'plamiga ekvivalent bo'lsa, u holda B to'plam A to'plamga nisbatan quvvatliroq deyiladi va u $m(B) > m(A)$ yoki $m(A) < m(B)$ ko'rinishlarda belgilanadi.

Misollar. 1. $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$ bo'lgani uchun $m(\mathbb{N}) = m(\mathbb{Q})$. $m(\mathbb{N})$ odatda \aleph_0 ko'rinishda belgilanadi.

2. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Shuning uchun $m(\mathbb{Q}) \leq m(\mathbb{R})$.

Ta'rif. Barcha natural sonlar to'plamiga ekvivalent bo'lgan to'plam sunoqli to'plam deb ataladi.

Misol uchun barcha butun sonlar to'plami, barcha toq sonlar to'plami sunoqli bo'ladi.

Sanoqli bo'lмаган cheksiz to'plam sanoqsiz to'plam deyiladi.

$[0, 1]$ segmentiga ekvivalent bo'lgan to'plam kontinuum quvvatga ega deyiladi. Kontinuum quvvatni c ko'rinishda belgilaymiz. Quvvati kontinuum quvvatdan ham katta to'plamning mavjudligini quyidagi teorema yordamida ko'rsatish mumkin.

Teorema. Biror M to'plamning barcha qism to'plamlari sistemasini 2^M ko'rinishda belgilasak, u holda $m(2^M) > m(M)$ munosabati o'rmlil bo'ladi.

Agar M to'plam chekli bo'lib, uning quvvati n ga teng bo'lsa, u holda 2^M ning quvvati 2^n ga teng bo'lishini ko'rish qiyin emas. Shuni hisobga olib m quvvatli ixtiyoriy M to'plam uchun 2^M ning quvvatini 2^m ko'rinishda belgilaymiz.

Quvvati 2^c bo'lgan to'plam giperkontinuum quvvatga ega to'plam deb ataladi. Misol uchun $[0, 1]$ segmentning barcha qism to'plamlari to'plami giperkontinuum quvvatga ega.

Masalalar

1.3.1. \mathbb{R} to'plami va $(0, 1)$ intervali bilan ekvivalent ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $y = \operatorname{arctg}x$ funksiyasi monoton o'suvchi, aqilganish sohasi \mathbb{R} va qiymatlar sohasi $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ bo'lganligidan, $y = \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}x + \frac{1}{2}$ funksiyasi \mathbb{R} to'plami va $(0, 1)$ intervali orasida o'zaro bir qiymatli aks-lantirish bo'ladi. Bundan \mathbb{R} to'plami $(0, 1)$ intervaliga ekvivalent ekanligi kelib chiqadi.

1.3.2. Sanoqli to'plamlarning sanoqli sondagi birlashmasi sanoqli to'plam bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ sanoqli to'plamlar berilgan bo'lsin. $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ to'plamning sanoqli ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Sodda-lilik uchun $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$ deb olaylik. Chunki, bu shart bajarilmagan holda $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ to'plamlar o'rniغا

$$B_1 = A_1, B_2 = A_2 \setminus A_1, \dots, B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right), \dots$$

to'plamlarni qaraymiz. $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i \neq j$ va $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ekanligi ravshan.

A_k to'plamlar sanoqli bo'lgani uchun ularning elementlarini nomer-lab chiqamiz:

$$A_1 : a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}, \dots$$


$$A_2 : a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

$$A_k : a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}, \dots$$

$$\dots \dots \dots$$

a_{kn} elementlari bilan tekislikning koordinatalari (k, n) bo'lgan nuq-talari orasidagi o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatamiz: $a_{kn} \leftrightarrow (k, n)$. a_{kn} elementlarni tekislikda sxematik ravishda chizmadagidek qilib ko'rsatish mumkin (5-rasm). A_k ning elementlariga I chorakning ab-sissasi k ($k = 1, 2, \dots$) ga, ordinatalari $1, 2, \dots$ bo'lgan nuqtalar mos keladi.



5-rasm

Jadvaldagı elementlarni: a_{11} ni birinchi element, a_{12} ni ikkinchi element, a_{21} ni uchinchi element va h.k. chizmada ko'rsatilgandek qilib nomerlab chiqish mumkin. Shunday qilib, A ning har bir elementi ma'lum bir nomeraga ega bo'ladi.

1.3.3. Butun sonlar to'plami \mathbb{Z} , ratsional sonlar to'plami \mathbb{Q} sanoqli to'plamlar ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_+ \cup \mathbb{Z}_-$ deylik, bunda $\mathbb{Z}_+ = \{m : m \in \mathbb{Z}, m \geq 0\}$ va $\mathbb{Z}_- = \{m : m \in \mathbb{Z}, m \leq 0\}$. \mathbb{Z}_+ va \mathbb{Z}_- to'plamlar har biri natural sonlar to'plamiga ekvivalentlididan, ular sanoqli bo'ladi. 1.3.2-misoldan ikkita sanoqli to'plamning birlashmasi bo'lgan \mathbb{Z} to'plami ham sanoqlidir.

Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

$$\mathbb{Q}_n = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z} \right\}$$

bo'lsin. Har bir \mathbb{Q}_n to'plam sanoqli bo'lgan \mathbb{Z} to'plamiga ekvivalent. 1.3.2-misoldan sanoqli to'plamlar birlashmasi bo'lgan \mathbb{Q} to'plami ham sanoqlidir.

1.3.4. Barcha irratsional sonlar to'plami \mathbb{I} bilan barcha huqiqiy sonlar to'plami \mathbb{R} ekvivalent ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Bu to'plamlar orasida o'zaro bir qiymatli moslikni quyidagicha qurishga bo'ladi. $n\sqrt{2}, n \in \mathbb{N}$ ko'rinishdagi sonlar to'plamimi L orqali, \mathbb{I} ning $n\sqrt{2}$ ko'rinishda ifodalash mumkm bo'lmagan barcha elementlari to'plamini C orqali belgilaylik. U holda

$$\mathbb{I} = C \cup L, \mathbb{R} = C \cup (L \cup \mathbb{Q}).$$

1.3.3-misolga asosan, \mathbb{Q} sanoqli to'plam. L sanoqli ekanligidan, 1.3.2-misoldan $L \cup \mathbb{Q}$ ham sanoqlidir. Demak, L va $L \cup \mathbb{Q}$ to'plamlar orasida

o'zaro bir qiymatli akslantirish mavjud. C to'plamning har bir elementiga esa shu elementning o'zini mos qo'yamiz. Natijada \mathbb{I} va \mathbb{R} orasida o'zaro bir qiymatli moslik o'rnatiladi.

1.3.5. Chekli sondagi sanoqli to'plamlarning Dekart ko'paytmasi sanoqlidir.

Yechimi. Ko'paytuvchilar soni ikkita bo'lgan holni qarash yetarlidir.

$$A = \{a_1, \dots, a_n, \dots\}$$

va

$$B = \{b_1, \dots, b_n, \dots\}$$

sanoqli to'plamar bo'lsin.

$$A \times B = \{(a_i, b_j) : a_i \in A, b_j \in B\}$$

ning sanoqli ekanini ko'rsatamiz. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

$$D_n = \{\{(a_n, b_j) : b_j \in B\}$$

to'plamlarni qaraylik. $D_n \sim B$ bo'lganligidan, har bir D_n sanoqli to'plam. $A \times B = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$ ekanligi va 1.3.2-misoldan $A \times B$ to'plam ham sanoqli bo'ladi.

1.3.6. Koeffitsientlari ratsional sonlar bo'lgan barcha ko'phadlar to'plami $P[X]$ ning sanoqli ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Koeffitsientlari ratsional sonlar bo'lib, darajasi n ga teng barcha ko'phadlar to'plamini $P_n[X]$ orqali belgilaylik, bunda $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. $P[X] = \bigcup_{n \geq 0} P_n[X]$ bo'lganligidan, har bir $P_n[X]$ to'plamning sanoqli ekanini ko'rsatish yetarli. Buning uchun $P_n[X] \sim \mathbb{Q}^{n+1}$ ni asoslash yetarlidir. Bu esa

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots a_n t^n \rightarrow (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$$

moslikdan kelib chiqadi.

1.3.7. Ixtiyoriy cheksiz A to'plamning sanoqli to'plamga ekvivalent bo'lgan qism to'plami mavjudligini isbotlang.

Yechimi. A dan olingan biror nuqtani a_1 deb belgilaylik. A cheksiz to'plam bo'lganligi uchun $A \setminus \{a_1\}$ bo'sh emas. $A \setminus \{a_1\}$ dan biror element olib, uni a_2 orqali belgilaymiz. $(A \setminus \{a_1\}) \setminus \{a_2\}$ to'plam bo'sh emas, undan olingan elementni a_3 orqali belgilaymiz va h.k. A cheksiz to'plam bo'lgani uchun bu jarayonni cheksiz davom ettirish mumkin. Natijada, turli elementlardan iborat sanoqli $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ to'plam hosil bo'ladi.

1.3.8. $[0, 1]$ kesmaning sanoqsiz ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Faraz qilaylik $[0, 1]$ kesma sanoqli bo'lsin. U holda bu to'plam elementlarini nomerlab chiqish mumkin:

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

Bu sonlar 0 bilan 1 orasida joylashgani uchun ularni quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned}x_1 &= 0, a_{11}a_{12}a_{13}\dots a_{1n}\dots \\x_2 &= 0, a_{21}a_{22}a_{23}\dots a_{2n}\dots \\x_3 &= 0, a_{31}a_{32}a_{33}\dots a_{3n}\dots \\\dots &\dots \\x_n &= 0, a_{n1}a_{n2}a_{n3}\dots a_{nn}\dots\end{aligned}$$

bu yerda $a_{ik} - x_i$ sonining k-o'nlik raqami. Endi

$$b = 0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n \dots$$

sonini quyidagicha tuzaylik:

$$b_n = \begin{cases} 2, & \text{agar } a_{nn} = 1, \\ 1, & \text{agar } a_{nn} \neq 1. \end{cases}$$

Natijada $b_n \neq a_{nn}$, $n \in \mathbb{N}$. U holda $b \in [0, 1]$ soni

$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$

noplarning birortasiga ham teng emas. Bu esa

$$[0, 1] = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$$

gn ziddir. Hosil bo'lgan ziddiyatdan $[0, 1]$ kesmaning sanoqsiz ekanligi kelib chiqadi.

1.3.9. $[a, b]$ segmentda aniqlangan monoton funksiyaning uzulish nuqtalari to‘plami chekli yoki sanoqli bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. $[a, b]$ segmentda monoton o'suvchi $f(x)$ funksiya berilgan bo'lib, x_0 uning berilgan segmentga tegishli ixtiyoriy uzulish nuqtasi bo'lsin. $f(x)$ funksiya $[a, x_0]$ va $(x_0, b]$ yarim intervallarda monoton va chegaralangan bo'lgani uchun

$$f(x-0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{ va } f(x+0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

limitlar mavjud. Shuning uchun uzulish nuqtasi $f(x)$ funksiyaning 1-tur uzulish nuqtasi bo'ladi. $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ ayirmaga $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi sakrashi deyiladi. Berilgan funksiya monoton o'suvchi bo'lgani uchun har bir uzulish nuqtadagi sakrashi musbat sondan iborat. Berilgan funksiyaning sakrashi biror α sonidan katta bo'lgan uzulish nuqtalari soni chekli $\frac{f(b) - f(a)}{\alpha}$ sonidan katta emas. Haqiqatan, agar berilgan funksiya $\frac{f(b) - f(a)}{\alpha}$ sonidan katta n sondagi uzulish nuqtalarda α dan katta sakrashlarga ega bo'lsa, u holda bu sakrashlarning barchasining yig'indisi $f(b) - f(a)$ ayirmadan katta bo'lardi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Funksiyaning sakrashi $\frac{1}{k}$ sonidan katta bo'lgan uzulish nuqtalari to'plamini E_k orqali belgilaylik. Barcha uzulish nuqtalari to'plami E quyidagidan iborat bo'ladi:

$$E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k \cup \dots$$

E_k to'plamlarning har biri chekli bo'lganligidan, E to'plami ko'pi bilan sanoqli bo'ladi.

1.3.10. Agar ixtiyoriy $A \subset X$ sanoqli to'plami uchun $|X \setminus A| = |X|$ munosabati o'rinni bo'lsa, u holda X sanoqsiz to'plam ekanligini isbotlang.

Yechimi. Aksinchasini faraz qilaylik, Aytaylik, X sanoqli to'plam bo'lsin, ya'ni

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}.$$

Uning $A = \{x_5, x_6, \dots, x_n, \dots\}$ sanoqli qism to'plamini olsak, u holda $X \setminus A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ va $|X \setminus A| = 4$. Natijada $|X \setminus A| \neq |X|$ kelib chiqadi.

1.3.11. Uchlarining koordinatalari ratsional bo'lgan tekislikdagi barcha uchburchaklar to'plamining quvvati nimaga teng?

Yechimi. Tekislikdagi har bir uchburchak uchlarining koordinatalari orqali bir qiymatli aniqlanadi. U holda berilgan to'plamning har bir uchburchakiga $M = \mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2 \times \mathbb{Q}^2$ to'plamning elementlari mos keladi va aksincha. Sanoql to'plamlarning chekli sondagi Dekart ko'paytmasida sanoqli to'plam bo'lganligidan, M sanoqli to'plam bo'ladi. Demak, bunday uchburchaklar to'plami sanoqli bo'ladi.

1.3.12. Agar $|A \setminus B| = |B \setminus A|$ bo'lsa, u holda $|A| = |B|$.

Yechimi. Teng quvvatlari to'plamlar ekvivalent to'plamlar bo'lganligi uchun, agar $A \setminus B \sim B \setminus A$ bo'lsa, u holda $A \sim B$ munosabatini o'rinnigini isbotlash yetarli. $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ va $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ tengliklarini qaraylik. Bundan $A \setminus B$, $A \cap B$ va $B \setminus A$, $A \cap B$ to'plamlari

umumiy nuqtalarga ega emas. Shart bo'yicha $A \setminus B \sim B \setminus A$ va $A \cap B \sim A \cap B$ bo'lsa, u holda $A \sim B$.

1.3.13. *Agar $A \subset B$ va $|A| = |A \cup C|$ bo'lsa, u holda $|B| = |B \cup C|$.*

Yechimi. 1.3.12-misolga o'xshash, agar $A \subset B$ va $A \sim A \cup C$ bo'lsa, u holda $B \sim B \cup C$ imunosabatini isbotlaymiz.

Quyidagi munosabatlar o'rinnli:

$$B = A \cup (B \setminus A) \quad (1.2)$$

$$B \cup C = (A \cup (C \setminus B)) \cup (B \setminus A) \quad (1.3)$$

(1.2) va (1.3) tengliklarning o'ng tomonlaridagi birlashmadagi to'plamlar umumiy nuqtalarga ega emas. Bundan A va $A \cup (C \setminus B)$ to'plamlari ekvivalent, chunki $A \subset A \cup (C \setminus B) \subset A \cup C$ shart bo'yicha $A \sim A \cup C$. Demak, $A \sim A \cup (C \setminus B)$ va (1.2), (1.3) tengliklarini hisobga olsak, $B \sim B \cup C$ kelib chiqadi.

1.3.14. *Chekli sondagi barcha haqiqiy sonlar ketma-ketliklari to'plamining quvvati nimaga teng?*

Yechimi. Chekli sondagi barcha haqiqiy sonlar ketma-ketliklari to'plami $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ bo'lib, bu yerda A_n uzunligi n -ga teng bo'lgan ketma-ketliklar to'plami, ya'ni $A_n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$, bunda \mathbb{R} haqiqiy sonlar to'plami. $\mathbb{R} \sim (0, 1]$ dan $A_n \sim (0, 1] \times \dots \times (0, 1]$. Oxirgi to'plam $(0, 1]$ ga ekvivalent. Natijada $A_n \sim (n-1, n]$. U holda $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ to'plami $(0, 1] \cup (1, 2] \cup \dots = (0, +\infty)$ ga ekvivalent. Demak, kontinuum quvvatiga ega ekan.

1.3.15. *To'g'ri chiziqda o'zaro kesishmaydigan barcha intervallar to'plamining quvvati nimaga teng?*

Yechimi. To'g'ri chiziqda $\mathcal{F} = \{U_{\alpha} : U_{\alpha} \cap U_{\beta} = \emptyset, \alpha \neq \beta\}$ o'zaro kesishmaydigan intervallar to'plamini qaraymiz. Har bir U_{α} intervalga tegishli x_{α} ratsional sonini bu intervalga mos qo'yamiz. $U_{\alpha} \cap U_{\beta} = \emptyset$ bo'lganligidan, $\alpha \neq \beta$ da $x_{\alpha} \neq x_{\beta}$ o'rindir. Ratsional sonlar to'plami sanoqligidan, \mathcal{F} ham sanoqli to'plam.

1.3.16. *Agar M sanoqsiz to'plam va A uning chekli yoki sanoqli qism to'plami bo'lsa, u holda M va $M \setminus A$ to'plamlar o'zaro ekvivalent ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. $M \setminus A$ to'plam sanoqsiz bo'ladi, aks holda $M = A \cup (M \setminus A)$ tengligidan M to'plami chekli yoki sanoqli bo'lib qoladi. $M \setminus A$

to'plainidan sanoqli A_1 to'plamini olib, qolgan qismini N orqali belgilaymiz. U holda

$$M \setminus A = A_1 \cup N, \quad M = (A \cup A_1) \cup N$$

munosabatlariga egamiz. Sanoqli A_1 va $A \cup A_1$ to'plamlari orasida bir qiymatli moslik o'rnatamiz, N to'plamining har bir elementini o'ziga mos qo'yamiz. Natijada $M \setminus A$ va M to'plamlari orasida bir qiymatli moslik o'rnatamiz.

1.3.17. *Ixtiyoriy cheksiz A to'plami bilan chekli yoki sanoqli B to'plamining birlashmasi A to'plamiga ekvivalent bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. Agar A sanoqli bo'lsa, u holda $A \cup B$ to'plam sanoqli bo'lib, A to'plamiga ekvivalent ekanligi kelib chiqadi.

Agar A sanoqsiz bo'lsa, u holda $A \cup B$ to'plami ham sanoqsiz bo'ladi. Sanoqsiz to'plam undan chekli yoki sanoqli to'plamni olib tashlashdan paydo bo'lgan qism to'plamiga ekvivalent bo'lishidan $A \cup B$ to'plami $A = (A \cup B) \setminus (B \setminus A)$ to'plamiga ekvivalent ekanligi kelib chiqadi.

1.3.18. *Natural sonlarning barcha juftliklari to'plami P sanoqli bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. (p, q) natural sonlar juftligining balandligi deb $p+q$ somni aytamiz. Ravshanki balandligi n ga teng bo'lgan natural sonlar juftliklari $n - 1$ ta bo'ladi. P_n orqali balandligi n ga teng juftliklar to'plamini belgilaymiz.

$$P_n = \{(1, n-1), (2, n-2), \dots, (n-1, 1)\}$$

hamda $P = \bigcup_{n=2}^{\infty} P_n$ bo'lishidan P to'plamining sanoqli ekanligi kelib chiqadi.

1.3.19. *Agar D sanoqli to'plam bo'lsa, u holda uning elementlaridan tuzilgan barcha chekli ketma-ketliklar to'plami S sanoqli to'plam bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. n ta natural sondan iborat bo'lgan barcha to'plamlar birlasmasini P_n orqali belgilaymiz. Chekli to'plamlarning sanoqli birlasmasi sanoqli to'plam bo'lishidan P_n to'plamining sanoqli ekanligi ravshan. Bundan esa $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ to'plamining ham sanoqli ekanligi kelib chiqadi.

1.3.20. *\mathbb{R}^n fazoning ratsional koordinatali barcha nuqtalari to'plami \mathbb{Q}^n sanoqli bo'lishini ko'rsating.*

Yechimi. \mathbb{Q} sanoqli to'plam bo'lganligidan, n sondagi sanoqli to'plamlarning Dekart ko'paytmasi bo'lgan \mathbb{Q}'' to'plami, 1.3.5-misolga asosan sanoqli to'plam bo'ladi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Isbotlang:

- agar $A \subset B$ va $A \sim A \cup C$ bo'lsa, u holda $B \sim B \cup C$;
- agar $A \supset C, B \supset D$ va $C \cup B \sim C$ bo'lsa, u holda $A \cup D \sim A$.

2. Chekli A va B to'plamlarning elementlari sonini mos ravishda $n(A)$ va $n(B)$ ko'rinishlarda belgilaylik. Quyidagi tenglikni isbotlang:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

3. Tekislikda uchlarining koordinatalari ratsional sonlardan iborat bo'lgan barcha to'rtburchaklar to'plamining quvvatini toping.

4. Sanoqli to'plamning ixtiyoriy qism to'plami chekli yoki sanoqli bo'lishini ko'rsating.

5. Fazodagi ratsional koordinatali barcha nuqtalar to'plamining sanoqli ekanligini isbotlang.

6. Tekislikda markazining koordinatalari ratsional sonlar bo'lib, radiusi ham ratsional son bo'lgan barcha aylanalar to'plamining sanoqli ekanligini isbotlang.

7. Ixtiyoriy cheksiz to'plamning sanoqli qism to'plami mavjudmi?

8. Musbat sonlar to'plamining ba'zi sanoqsiz to'plamini E bilan belgilaylik. $E \cap (\xi, +\infty)$ to'plami sanoqsiz bo'ladigan $\xi > 0$ sonining mavjudligini isbotlang.

9. Sonlar o'qida berilgan E to'plamning ixtiyoriy ikki elementi orasidagi oraliq birdan katta bo'lsa, u holda bu to'plamning chekli yoki sanoqli bo'lishini ko'rsating.

10. Sanoqli to'plamning barcha chekli qism to'plamarining to'plami sanoqli ekanligini isbotlang.

11. Natural sonlarning qat'iy o'suvchi barcha ketma-ketliklari to'plamining quvvatini toping.

12. Natural sonlarning 10 sonini o'z ichiga olmaydigan barcha ketma-ketliklari to'plamining quvvatini toping.

13. Ratsional sonlarning mumkin bo'lgan barcha ketma ketliklari to'plamining quvvatini toping.

14. Tekislikda o'zaro kesishmaygan doiralar to'plami berilgan. Shu to'plam sanoqsiz bo'lishi mumkimmi?

15. $[a, b]$ segmentda aniqlangan barcha sonli funksiyalar to'plami giperkontinuum quvvatga ega ekanligini isbotlang.

16. $[a, b]$ segmentda uzlucksiz bo'lgan barcha funksiyalar to'plami kontinuum quvvatli ekanligini isbotlang.

17. $[a, b]$ segmentda monoton bo'lgan barcha funksiyalar to'plamining quvvati qanday?

II BOB

O'lchovlar nazariyasi elementlari

2.1. O'lchov tushunchasi

Bo'sh bo'lмаган X то'плам учун $P(X)$ орқали X то'пламнинг барча qism to'plamlari sistemasini belgilaymiz.

Bo'sh bo'lмаган $\mathcal{R} \subset P(X)$ система birlashma va ayirma amallariga nisbatan yopiq bo'lsa, ya'ni $A, B \in \mathcal{R}$ ekanligidan, $A \cup B \in \mathcal{R}$, $A \setminus B \in \mathcal{R}$ kelib chiqsa, u holda \mathcal{R} halqa deyiladi.

Agar \mathcal{R} halqa bo'lsa, u holda $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$ tengligidan $A \cap B \in \mathcal{R}$ kelib chiqadi. Bundan tashqari $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ tengligidan $A \Delta B \in \mathcal{R}$ kelib chiqadi. Demak, \mathcal{R} kesishma va simmetrik ayirma amallariga nisbatan yopiqdir.

Bo'sh bo'lмаган $\mathcal{S} \subset P(X)$ sistemaning har bir $A, B \in \mathcal{S}$ elementlari uchun shunday o'zaro kesishmaydigan $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{S}$ mavjud bo'lib, $A \setminus B = \bigcup_{i=1}^n C_i$ tengligi bajarilsa u holda \mathcal{S} yarim halqa deyiladi.

Misollar. 1. X ixtiyoriy bo'sh bo'lмаган то'плам bo'lsa, u holda $S = P(X)$ yarim halqa bo'ladi.

2. $S = \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ yarim halqa bo'ladi.

3. $S = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ yarim intervallar sistemasi yarim halqa bo'ladi.

4. $S = \{[a, b] \times [c, d] : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ то'rtburchaklar sistemasi yarim halqa bo'ladi.

Agar $\mathcal{R} \subset P(X)$ halqa uchun $X \in \mathcal{R}$ bo'lsa, u holda \mathcal{R} algebra deyiladi. (buladi) ✓

Agar ixtiyoriy $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{R}$ uchun $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}$ bo'lsa, u holda \mathcal{R} - σ -halqa deyiladi.

Agar \mathcal{R} bir vaqtida algebra va σ -halqa bo'lsa, u holda \mathcal{R} - σ -algebra deyiladi.

Yuqoridagi misollardan, 1, 2 misollardagi yarim halqlar σ -algebra bo'lib, 3, 4 misollardagi yarim halqlar σ -algebra bo'lmaydi.

$\mathcal{S} \subset P(X)$ biror yarim lialqa bo'lsin. $\mu : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ nomanfiy funksiyasi ixtiyoriy o'zaro kesishmaydigan $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{S}$, bunda

$\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{S}$, to'plamlar uchun

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

tengligini qanoatlantirsa, u holda μ o'lchov deyiladi.

Agar ixtiyoriy o'zaro kesishmaydigan $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{S}$, bunda $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{S}$, to'plamlar uchun

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

tengligi bajarilsa, u holda μ sanoqli-additiv (yoki σ -additiv) deyiladi.

Misollar. 1. $S = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}\}$ yarim intervallar yarim halqasida

$$\mu([a, b]) = b - a$$

sanoqli-additiv o'lchov bo'ladi.

2. $S = \{[a, b] \times [c, d] : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ yarim halqada

$$\mu([a, b] \times [c, d]) = (b - a)(d - c)$$

sanoqli-additiv o'lchov bo'ladi.

3. X ixtiyoriy bo'sh bo'limgan to'plam, $x \in X$ va $S = P(X)$ da

$$\mu(A) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \in A, \\ 0, & \text{agar } x \notin A \end{cases}$$

sanoqli-additiv o'lchov bo'ladi.

4. Agar μ_1, \dots, μ_n o'lchovlar, t_1, \dots, t_n musbat sonlar bo'lsa, u holda $\mu = \sum_{i=1}^n t_i \mu_i$ ham o'lchov bo'ladi. Hususan, $x_1, \dots, x_n \in X$ uchun

$$\mu(A) = \sum_{x_i \in A} 1$$

o'lchov bo'ladi.

✓ Aytaylik, X biror to'plam, $\mathcal{S} \subset P(X)$ yarim halqa, μ esa o'lchov bo'lsin. Har bir $A \in \mathcal{S}$ to'plam uchun $\mu^*(A)$ tashqi o'lchovni

$$\mu^*(A) = \inf\left\{\sum_k \mu(A_k) : A \subset \bigcup_k A_k, A_k \in \mathcal{S}\right\}$$

kabi aniqlaymiz. Agar $A \in P(X)$ to'plami va $\forall \varepsilon > 0$ uchun shunday $B \in \mathcal{S}$ to'plami topilib, $\mu^*(A \triangle B) < \varepsilon$ bajarilsa, u holda A to'plami Lebeg ma'nosida o'lchovli deyiladi.

Masalalar

2.1.1. *X to‘plamning ixtiyoriy bo‘sh bo‘lmagan qism to‘plamlari oilasi S uchun, S ni o‘z ichiga oluvchi shunday yangona R(S) halqa mavjudki, u S ni o‘z ichiga oluvchi ixtiyoriy halqada yotadi.*

Yechimi. $R_0 = \bigcap_{\alpha} R_\alpha$ kesishmani qaraymiz, bunda $R_\alpha - S$ ni o‘z ichiga oluvchi X ning qism to‘plamlaridan iborat halqa. S ni o‘z ichiga oluvchi $P(X)$ halqa bo‘ladi, shu sababdan $R_0 \neq \emptyset$.

Endi $A, B \in R_0$ bo‘lganligidan, $\forall \alpha$ uchun $A, B \in R_\alpha$. Ta’rifga ko‘ra $A \cup B \in R_\alpha$ va $A \setminus B \in R_\alpha$ munosabati o‘rimli. α ixtiyoriy ekanligidan, $A \cup B \in R_0$ va $A \setminus B \in R_0$. Demak, R_0 halqa bo‘ladi.

Har bir α uchun $S \subset R_\alpha$ bo‘lganligidan, $S \subset R_0$ kelib chiqadi. S ni o‘ziga oluvchi X to‘plamning qism to‘plamlarining ixtiyoriy halqasi biror R_α ga tengdir, bundan u R_0 halqani o‘z ichiga oladi.

2.1.2. *Agar $S \subset P(X)$ yarim halqa bo‘lsa, u holda $R(S)$ minimal halqa shunday A to‘plamlardan iborat bo‘ladiki, bunda*

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad A_i \in S, \quad A_i \cap A_j = \emptyset,$$

$i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, $n \in \mathbb{N}$.

Yechimi. L orqali X ning shunday qism to‘plamlarini belgilaymizki, bu qism to‘plamlar S ga tegishli to‘plamlarning chekli yoyilmasiga ega bo‘lsin. L ni o‘z ichiga oluvchi har bir halqa chekli birlashmalarga nisbatan yopiqdir. Tasdiqi isbotlash uchun L halqa ekanligini ko‘rsatish yetarlidir.

$A, B \in L$ lar uchun $A \cup B \in L$ va $A \setminus B \in L$ ekanligini ko‘rsatish kerak.

Aytaylik,

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad B = \bigcup_{i=1}^m B_i,$$

bunda $A_i \cap A_j = \emptyset$ va $B_i \cap B_j = \emptyset$, $i \neq j$. Dastlab $A \cup B_1 \in L$ mi isbotlaymiz.

Quyidagi tenglik o‘rinlidir:

$$A \cup B_1 = (A \setminus B_1) \cup B_1 = \left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \setminus B_1 \right) \cup B_1 = \left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_1) \right) \cup B_1.$$

Endi S yarim halqa bo‘lganligidan, har bir $A_i \setminus B_1$ to‘plam S ga tegishli to‘plamlarning chekli yoyilmasiga egaligidan barcha $A \cup B_1$ yig‘indilar

shunday yoyilmaga ega bo'ladi. $A \cup B_1$ ga ketma-ket B_2, B_3, \dots, B_n to'plamlarni birlashtirsak, biz har bir qadamida L ning to'plamiga ega bo'lamiz, bundan $A \cup B \in L$ o'rini.

Quyidagini yozamiz:

$$A \setminus B_1 = \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) \setminus B_1 = \left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \setminus B_1) \right)$$

Bundan $A \setminus B_1 \in L$. Endi

$$A \setminus (B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_m) = (((A \setminus B_1) \setminus B_2) \setminus \dots \setminus B_m)$$

dan $A \setminus B \in L$.

2.1.3. Agar $B \subset A$ o'lebovli to'plamlar bo'lsa, u holda

$$\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. $B \subset A$ bo'lganligidan, $A = (A \setminus B) \cup B$ bo'lib, $A \setminus B$ va B to'plamlar o'zaro kesislimaydi. U holda

$$\mu(A) = \mu((A \setminus B) \cup B) = \mu(A \setminus B) + \mu(B).$$

Bundan

$$\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$$

tenglikka ega bo'lamiz.

2.1.4. A, B o'lebovli to'plamlar. Agar E, F o'lebovli to'plamlar uchun

$$A \triangle E = B \triangle F, \quad \mu(E) = \mu(F) = 0$$

bo'lsa, u holda $\mu(A) = \mu(B)$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $A \triangle E = (A \setminus E) \cup (E \setminus A)$ va $B \triangle F = (B \setminus F) \cup (F \setminus B)$ ekanligidan,

$$(A \setminus E) \cup (E \setminus A) = (B \setminus F) \cup (F \setminus B)$$

ya'ni

$$\mu((A \setminus E) \cup (E \setminus A)) = \mu((B \setminus F) \cup (F \setminus B))$$

Bundan

$$\mu(A \setminus E) + \mu(E \setminus A) = \mu(B \setminus F) + \mu(F \setminus B).$$

U holda $\mu(E) = \mu(F) = 0$ ekanligidan, $\mu(E \setminus A) = \mu(F \setminus B) = 0$. Demak, $\mu(A \setminus E) = \mu(B \setminus F)$.

Endi

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu((A \setminus E) \cup E) = \mu(A \setminus E) + \mu(E) = \mu(A \setminus E) = \\ &= \mu(B \setminus F) = \mu(B \setminus F) + \mu(F) = \mu((B \setminus F) \cup F) = \mu(B),\end{aligned}$$

ya'ni $\mu(A) = \mu(B)$.

2.1.5. *Tenglikni isbotlang:*

$$\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B).$$

Yechimi. A, B to'plamlar o'lclovli bo'lsa $A \cup B, A \cap B, A \setminus (A \cap B), B \setminus (A \cap B)$ to'plamlari ham o'lclovli ekanligi ma'lum va $A \cap B, A \setminus (A \cap B), B \setminus (A \cap B)$ to'plamlar o'zaro kesishmaydi. U holda

$$\begin{aligned}\mu(A \cup B) &= \mu((A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B)) = \\ &= \mu(A \setminus (A \cap B)) + \mu(B \setminus (A \cap B)) + \mu(A \cap B) = \\ &= \mu(A) - \mu(A \cap B) + \mu(B) - \mu(A \cap B) + \mu(A \cap B) = \\ &= \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).\end{aligned}$$

Bundan $\mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$.

2.1.6. *Tenglikni isbotlang:*

$$\begin{aligned}\mu(A \cup B \cup C) &= \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \\ &- \mu(A \cap B) - \mu(B \cap C) - \mu(C \cap A) + \mu(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

Yechimi. 2.1.5-misoldan foydalansak,

$$\begin{aligned}\mu(A \cup B \cup C) &= \mu((A \cup B) \cup C) = \\ &= \mu(A \cup B) + \mu(C) - \mu((A \cup B) \cap C) = \\ &= \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B) + \mu(C) - \mu((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \\ &= \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \mu(A \cap B) - \mu((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \\ &= \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \mu(A \cap B) - \\ &- [\mu((A \cap C) + \mu(B \cap C) - \mu((A \cap C) \cap (B \cap C)))] = \\ &= \mu(A) + \mu(B) + \mu(C) - \\ &- \mu(A \cap B) - \mu(B \cap C) - \mu(C \cap A) + \mu(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

2.1.7. *Agar*

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots A_n \subseteq \cdots$$

o'chovli to'plamlar va $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ bo'lsa, u holda $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi.

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \\ &= \mu(A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n-1}) \cup \dots) = \\ &= [\mu - \text{sanoqli-additiv}] = \\ &= \mu(A_1) + \mu(A_2 \setminus A_1) + \dots + \mu(A_n \setminus A_{n-1}) + \dots = \\ &= \mu(A_1) + \sum_{k=2}^{\infty} (\mu(A_k) - \mu(A_{k-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).\end{aligned}$$

2.1.8. Agar

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$$

o'chovli to'plamlar va $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ bo'lsa, u holda $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. 2.1.7-misoldan

$$\mu\left(A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_1 \setminus A_n)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n)).$$

Bundan

$$\mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n)),$$

$$\text{ya'ni } \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

2.1.9. O'nli kasr yozuvida 7 raqami qatnashmagani [0, 1] kesmadagi barcha sonlar to'plamining Lebeg o'lchovini toping.

Yechimi. E o'nli kasr yozuvida 7 raqami qatnashmagani [0, 1] kesmadagi barcha sonlar to'plami bo'lsin.

Bu to'plamni quyidagicha qurish mumkin. Birinchi qadamda [0, 1] kesma teng 10 kesmaga bo'lmadi va [0.7, 0.8] yarim intervali chiqarib tashlanadi, chunki bu oraliqqa tegishli sonlarning o'nli kasr yozuvida verguldan keyingi birinchi raqami 7 ga tengdir.

Ikkinchi qadamda qolgan

$$\begin{aligned}[0, 0.1], [0.1, 0.2], [0.2, 0.3], [0.3, 0.4], [0.4, 0.5], \\ [0.5, 0.6], [0.6, 0.7], [0.8, 0.9], [0.9, 1]\end{aligned}$$

W

kesmalar ham teng 10 kesmaga bo'linib, har bir yettinchi kesma chiqarib tashlanadi, ya'ni $[0, 0.1]$ dan $[0.07, 0.08]$, $[0.1, 0.2]$ dan $[0.17, 0.28]$ va hokazo.

Keyin qolgan barcha kesmalar ham shu tarzda bo'linib, har bir 7-chi kesma chiqarib tashlanadi. Bu jarayon cheksiz davom ettirilsa, qolgan muqtalar to'plami E to'plamini beradi.

Endi $[0, 1] \setminus E$ ning o'lechovini hisoblaymiz. Bu to'plam uzuunligi $\frac{1}{10}$ bo'lgan bitta $[0.7, 0.8]$ kesina, uzuunligi $\frac{1}{10^2}$ bo'lgan 9-ta kesma, uuuuman, uzuunligi $\frac{1}{10^{k+1}}$ bo'lgan 9^k -ta kesma va hokazo kesmalardan iborat. Bundan

$$\mu([0, 1] \setminus E) = \frac{1}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9^2}{10^3} + \dots + \frac{9^k}{10^{k+1}} + \dots = 1$$

Demak, $\mu(E) = 0$.

2.1.10. O'nli kasr yozuvida 1 va 2 raqamlari qatnashmagan $[0, 1]$ kesmadagi barcha sonlar to'plamining Lebeg o'lechovini toping.

Yechimi. Bu to'plamni E orqali belgilaymiz hamda quyidagicha quramiz.

Birinchi qadamda $[0, 1]$ kesinadan $[0.1, 0.3)$ yarim intervalni chiqarib tashlab, qolgan $[0.3, 1]$ kesmani qoldiramiz. Chunki $[0.1, 0.3)$ oraliqdagi ixtiyoriy sonning o'nli kasr yozuvi $0.1\dots$ yoki $0.2\dots$ ko'rinishda bo'ladi:

Ikkinci qadanda har bir $[0.3, 0.4)$, $[0.4, 0.5)$, ..., $[0.9, 1]$ kesmalar uchun ham dastlabki $\frac{2}{5}$ qisimidan iborat yarim intervallarni olib tashlaymiz.

Shu jarayoni cheksiz davom ettirsak o'lechovlari

$$\frac{2}{5}, \frac{2 \cdot 3}{25}, \frac{2 \cdot 9}{125}, \dots, \frac{2 \cdot 3^k}{5 \cdot 5^k}, \dots$$

sonlar ketma-ketligiga mos oraliqlar olib tashlanadi. Bu oraliqlar $[0, 1] \setminus E$ dan iborat bo'ladi. U holda

$$\mu([0, 1] \setminus E) = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \dots = 1$$

Demak, $\mu(E) = 0$.

2.1.11. \mathbb{R} da ixtiyoriy musbat o'lechovga ega to'plam kontinuum quvvatga egaligini isbotlang.

Yechimi. $A \subset \mathbb{R}$ to'plami uchun $\mu(A) = \varepsilon > 0$ bo'lsin. \mathbb{R} da Lebeg o'lechovi xossalidan shunday $G \subset A$ oshiq to'plam mavjud bo'lib, $\mu(A \setminus G) < \frac{\varepsilon}{2}$. Bundan

$$\mu(G) = \mu(A) - \mu(A \setminus G) > \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}, \quad \checkmark$$

ya'ni G musbat o'lchovga ega. Demak, G bo'sh bo'lmasagan ochiq toplam. U holda shunday $a \neq b$ sonlari topilib, $(a, b) \subset G$, ya'ni $(a, b) \subset A$. Endi (a, b) to'plam kontinuum qurvatga ega ekanligidan, A ham kontinuum qurvatga egaligi kelib chiqadi.

2.1.12. Agar $[0, 4]$ kesmaning A va B qism to'plamlari uchun $\mu(A) + \mu(B) > 4$ bo'lsa $\mu(A \cap B) > 0$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $4 < \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$, u holda

$$\mu(A \cap B) > 4 - \mu(A \cup B) \geq 4 - 4 = 0,$$

bundan esa $\mu(A \cap B) > 0$.

2.1.13. Haqiqiy sonlar to'plamidagi A o'lchovli to'plam orqali aniqlangan

$$f(t) = \mu([a, t] \cap A), \quad t \in [a, b]$$

funksiyasining uzluksiz ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Ixtiyoriy $t_0 \in [a, b]$ soni berilgan bo'lsin. Dastlab $[a, b]$ kesmadan ixtiyoriy $t_n \downarrow t_0$ bo'lgan ketma-ketlik olamiz. U holda $A_n = [a, t_n] \cap A$ ichma-ich joylashgan kamayuvchi to'plamlar ketma-ketligini tuzadi, hamda 2.1.8-misoldan foydalansak,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu([a, t_n] \cap A) = \\ &= \mu\left(\bigcap_n ([a, t_n] \cap A)\right) = \mu([a, t_0] \cap A) = f(t_0) \end{aligned}$$

munosabatiga ega bo'lamiz.

Endi $[a, b]$ kesmadan ixtiyoriy $t_n \uparrow t_0$ bo'lgan ketma-ketlik olamiz. U holda

$$A_n = [a, t_n] \cap A$$

ichma-ich joylashgan o'suvchi to'plamlar ketma-ketligi bo'lib o'lchovning uzluksizligidan,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu([a, t_n] \cap A) = \\ &= \mu\left(\bigcap_n ([a, t_n] \cap A)\right) = \mu([a, t_0] \cap A) = f(t_0) \end{aligned}$$

munosabatga ega bo'lamiz. Demak, $f(t)$ funksiya uzluksiz.

2.1.14. Haqiqiy sonlar to'plamida chegaralangan, o'lchovi 4 ga teng A to'plamining o'lchovi 2 ga teng B qism to'plami mavjud ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $A \subset \mathbb{R}$, $\mu(A) = 4$ to'plami berilgan bo'lsin. A to'plami chegaralangan bo'lganligidan, A to'plamini o'z ichiga oluvchi shunday $[a, b]$ oraliq mavjud bo'lib, $\mu([a, b] \cap A) = 4$ tengligi o'rinni bo'ldi. Ushbu

$$f(t) = \mu([a, t] \cap A), \quad t \in [a, b]$$

funksiyasini qaraymiz. Bu funksiya uchun

$$f(a) = 0; \quad f(b) = 4$$

ekanligi ravshan. Yuqoridagi misolda esa bu funksiyaning uzluksizligi ko'rsatilgan edi. Bundan oraliq qiymat haqidagi Boltsano – Koshi teoremasiga ko'ra shunday $t_0 \in [a, b]$ topilib,

$$f(t_0) = 2$$

tengligi o'rinni bo'ldi. U holda $B = [a, t_0] \cap A$ deb belgilasak, $B \subset A$ va $\mu(B) = 2$ munosabatlarini qanoatlantiruvchi to'plamga ega bo'lamiz.

2.1.15. \mathbb{R} da Lebeg o'chovi orqali aniqlangan

$$f(t) = \mu([0, t] \cap A), \quad 0 \leq t \leq 4$$

funksiyani aniqlang va uning grafigini chizing, bu yerda $A = [1, 2] \cup [3, 4]$.

Yechimi. Agar $t \in [0, 1)$ bo'lsa, u holda $[0, t] \cap A = \emptyset$. Bundan

$$f(t) = \mu([0, t] \cap A) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Agar $t \in [1, 2)$ bo'lsa, u holda $[0, t] \cap A = [1, t]$. Bundan

$$f(t) = \mu([0, t] \cap A) = \mu([1, t]) = t - 1.$$

Agar $t \in [2, 3)$ bo'lsa, u holda $[0, t] \cap A = [1, 2]$. Bundan

$$f(t) = \mu([0, t] \cap A) = \mu([1, 2]) = 1.$$

Agar $t \in [3, 4]$ bo'lsa, u holda $[0, t] \cap A = [1, 2] \cup [3, t]$. Bundan

$$f(t) = \mu([0, t] \cap A) = \mu([1, 2] \cup [3, t]) = t - 2.$$

Demak,

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{agar } t \in [0, 1), \\ t - 1, & \text{agar } t \in [1, 2), \\ 1, & \text{agar } t \in [2, 3), \\ t - 2, & \text{agar } t \in [3, 4]. \end{cases}$$

lidir. Demak, har bir $x \in D$ soniga

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots \quad (2.2)$$

bunda $a_n = 0, 2$, ketma-ketligi mos keladli. Bunday ketma-ketliklar to'plami quvвати kontinuumidir. Buning uchun, (2.2) ko'rnishdagi har bir ketma-ketlik ka

$$b_1, b_2, \dots, b_n, \dots \quad (2.3)$$

ni mos q'ymaziz, bunda $b_n = 0$ agar $a_n = 0$ da, $b_n = 1$ agar $a_n = 2$.

Endi (2.3) korinishdagi ketma-ketlikni $[0, 1]$ kesmadagi sonning ikkilik yozuviga deb qarasak, u holda (2.3) ko'rnishdagi sonlar to'liq $[0, 1]$ ni beradi. Bunday D kontinuum quvvatli to'plam.

D to'plam o'chovini topaylik. D to'plam to'ldiruvchisining o'chovi

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \dots + \frac{2^{n-1}}{3^n} + \dots = 1.$$

Bundan $\mu(D) = 0$.

D to'plami Kantor to'plamit deyiladi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. O'nli kast yozuvida kamida bitta 3 raqami qatnashgan $[0, 1]$ kesmadagi barcha sonlar to'plamining Lebeg o'chovini toping.

2. Biror to'g'ri chiziqda yotuvchi tekislikdagi ixtiyoriy A to'plamining yassi o'chovi no'l ekanligini ko'rsating.

3. Haqiqiy sonlar to'plamida chegaralangan, o'chovi 5 ga teng A to'plamining o'chovi 3 ga teng B qism to'plani mavjud ekanligini ko'rsating.

4. Kamida bitta ichki nuqtasi bolgan to'plamining o'chovi no'l bo'lishi mumkinni?


5. O'uli kast yozuvida birorta ham 1 raqami qatnashmagan $[0, 1]$ kesmadagi barcha sonlar to'plamining Lebeg o'chovini toping.

6. O'nli kast yozuvida kamida bitta 1 raqami qatnashgan $[0, 1]$ kesmadagi barcha sonlar to'plamining Lebeg o'chovini toping.

7. $E \subset [0, 1]$ o'chovsiz to'plam va A shunday to'plamki, $\mu([0, 1] \setminus E) = 0$. $E \cap A$ to'plami ham o'chovsiz ekanligini ko'rsating.

8. O'suvchi chekli o'chovi A_n to'plamlarning birlashmasining o'chovi har doim chekli bo'ladimi?

9. Haqiqiy sonlar to'plamida chegaralangan, o'chovi 3 ga teng A to'plamining o'chovi 1 ga teng B qism to'plani mavjud ekanligini ko'rsating.



2.1.16. \mathbb{R} da kontinuum qurvatga ega va o'chovi nol bo'lgan to'plamga misol keltiring.

Yechimi. $F_0 = [0, 1]$ bolsin. Bu to'plamdan $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ oralig'i chiqarib tashlaymiz va qolgan to'plamni F_1 bilan belgilaymiz. Endi F_1 to'plamdan $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ va $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ oralig'larni chiqarib tashlaymiz va qolgan to'plamni F_2 bilan belgilaymiz. F_2 to'plamni 4 ta kesmadan iborat bo'lib, keyingi qadanda har bir kesmadan uzunligi $(\frac{1}{3})^3$ ga teng o'rta oralig'i chiqarib tashlaymiz va qolgan to'plamni F_3 bilan belgilaymiz va hokazo. Bu jarayoni davom ettirib ichma-ich joylashgan F_n yopiq to'plamlar ketma-ketligiga ega bo'laniz. $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ deb belgilaymiz. D to'plamning tuzilishini qaraylik. Bu to'plangua

$$0, 1, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}, \dots$$

nuqtalari tegishlidir. Lekin D to'plamda bu nuqtalardan boshqa nuqtalar ham mavjud. $[0, 1]$ kesmadagi sonlarni uchlik sanoq sistemasida yozamiz:

$$x = \frac{a_1}{3} + \frac{a_2}{3^2} + \frac{a_3}{3^3} + \dots + \frac{a_n}{3^n} + \dots \quad (2.1)$$

bunda $a_n = 0, 1, 2$. O'nli kasrdagidek, bunda ham ba'zi sonlar (2.1) shaklda ikkita usulda yozish mumkin. Masalan,

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{0}{3^2} + \dots + \frac{0}{3^n} + \dots = 0 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{2}{3^n} + \dots$$

$x \in [0, 1]$ soni D to'plamga tegishli bo'lishi uchun uning (2.1) to'plamining o'chovi 3 ga teng A to'plami qatnashmasligi zarur va yetarli, lekin shuha dai bitor yozuvida chegaralangan, o'chovi 3 ga teng A to'plamining o'chovi 1 ga teng B qism to'plani mavjud ekanligini ko'rsating.

10. Ixtiyoriy bo'sh bo'lмаган ochiq A to'plami uchun $\mu(A) > 0$ ekanligini ko'rsating.
11. Agar $A \subset [a, b]$ mustbat o'lchovli to'plam bo'lsa, u holda ba to'plamda shunday x va y nisqalar mayjud bo'lib, ular orasidagi masofa rational son bo'lishini ko'rsating.

2.2. O'lchovli funktsiyalar

Ω ixtiyoriy bo'sh bo'lмаган to'plam, Σ bu to'plamning qism to'plamlaridan tuzilgan biror σ -algebra, μ esa Σ da aniqlangan chekl sanoqli-additiv o'lchov bo'lsin. (Ω, Σ, μ) uchligiga o'lchovli fazo deyiladi.

Biror $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funktsiya berilgan bo'lsin. Agar $\forall c \in \mathbb{R}$ uchun

$$f^{-1}((-\infty, c)) = \{x \in \Omega : f(x) < c\}$$

to'plami o'lchovli bo'lsa, u holda f funktsiya o'lchovli funktsiya deyildi. Ω o'lchovli to'plamda f va g o'lchovli funktsiyalar uchun

$$\{x \in \Omega : f(x) \neq g(x)\}$$

to'plami o'lchovi nolga teng bo'lsa, u holda f va g funktsiyalar ekvivalent deyildi va $f \sim g$ kabi belgilanadi.

Agar Ω to'plamda aniqlangan $\{f_n(x)\}$ funktsiyalar ketma-ketligi uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ tengligi bajarilmaydigan nuqtalar to'plami o'lchovi nolga teng bo'lsa, $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlik $f(x)$ funktsiyaga degarli yaqinlashadi deyildi.

Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0$$

bo'lsa, u holda $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlik $f(x)$ funktsiyaga o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi deyildi.

Deyarli yaqinlashish $f_n \xrightarrow{\mu} f$ kabi, o'lchov bo'yicha yaqinlashish esa $f_n \xrightarrow{\mu} f$ kabi belgilanadi.

Masalalar

2.2.1. (Ω, Σ, μ) o'lchovli fazo va $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funktsiya berilgan bo'lsin. U holda quyidagilar o'zaro teng kuchli ekanligini ko'rsating:

- a) $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o'lchovli funktsiya;

$$\{x \in \Omega : f(x) < c\}$$

to'plami o'lchovli bo'ladи.

$$\{x \in \Omega : f(x) \geq c\} = \Omega \setminus \{x \in \Omega : f(x) < c\}$$

tengligidan $\{x \in \Omega : f(x) \geq c\}$ to'plamining o'lchovli ekanligi kelib chiqadi.

b) \Rightarrow c). Aytaylik, har bir $c \in \mathbb{R}$ uchun

$$\{x \in \Omega : f(x) \geq c\}$$

to'plami o'lchovli bo'lsin. U holda

$$\{x \in \Omega : f(x) > c\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in \Omega : f(x) \geq c + \frac{1}{n} \right\}$$

tengligidan va o'lchovli to'plamlarning sanoqli birlashmasi yana o'lchovli bo'lishidan $\{x \in \Omega : f(x) > c\}$ to'plamining o'lchovli ekanligiga ega bo'lamiz.

c) \Rightarrow d). Aytaylik, har bir $c \in \mathbb{R}$ uchun

$$\{x \in \Omega : f(x) > c\}$$

to'plami o'lchovli bo'lsin.

$$\{x \in \Omega : f(x) \leq c\} = \Omega \setminus \{x \in \Omega : f(x) > c\}$$

tengligidan $\{x \in \Omega : f(x) \leq c\}$ to'plamining o'lchovli ekanligi kelib chiqadi.

d) \Rightarrow a). Aytaylik, har bir $c \in \mathbb{R}$ uchun

$$\{x \in \Omega : f(x) \leq c\}$$

to'plami o'lchovli bo'lsin.

$$\{x \in \Omega : f(x) < c\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ x \in \Omega : f(x) \leq c + \frac{1}{n} \right\}$$

Tenglikidan va o'lbchovli to'plamning saoqli kesishmasi yana o'lbchovli bo'lishidan $\{x \in \Omega : f(x) < c\}$ to'planning o'lbchovli ekanligiga ega bo'laniiz. Demak, f o'lbchovli funktsiya bo'ladi.

2.2.2. $f(x)$ va $g(x)$ o'lbchovli funktsiyalar bo'lsa, u holda

- a) $f(x) \pm g(x)$;

b) $f(x)g(x)$;

c) $\frac{f(x)}{g(x)}$, ($g(x) \neq 0, x \in \Omega$) funktsiyalari ham o'lbchovli bo'lishini ko'rsating.

Yechimi. $f(x)$ va $g(x)$ o'lbchovli funktsiyalar va $k, a \in \mathbb{R}$ bo'lsin.

$$\{x \in \Omega : (f+a)(x) < c\} = \{x \in \Omega : f(x) < c-a\}$$

tengligidan $f + a$ funktsiyaning o'lbchovli ekanligi,

$$\{x \in \Omega : (kf)(x) < c\} = \begin{cases} \{x \in \Omega : f(x) < k^{-1}c\}, & \text{agar } k > 0, \\ \{x \in \Omega : f(x) > k^{-1}c\}, & \text{agar } k < 0 \end{cases}$$

tengligidan esa kf funktsiyasining o'lbchovli ekanligi kelib chiqadi.

a) Avvalo

$$\{x \in \Omega : f(x) > g(x)\}$$

to'planning o'lbchovli ekanligini ko'rsatamiz. Haqiqatan,

$$\{x \in \Omega : f(x) > g(x)\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{x \in \Omega : f(x) > r\} \cap \{x \in \Omega : g(x) < r\})$$

tengligidan $\{x \in \Omega : f(x) > g(x)\}$ to'planning o'lbchovli ekanligi kelib chiqadi. Bundan

$$\{x \in \Omega : f(x) \pm g(x) > c\} = \{x \in \Omega : f(x) > \mp g(x) + c\}$$

to'plami o'lbchovli ekanligiga ega bo'lamiz. Demak, o'lbchovli funktsiyalarning yig'indisi va ayrimasi o'lbchovli bo'ladi.

- b) Oldin f^2 funktsiyaning o'lbchovli ekanligini ko'rsatamiz. Bu

$$\{x \in \Omega : f^2(x) < c\} = \begin{cases} \{x \in \Omega : -\sqrt{c} < f(x) < \sqrt{c}\}, & \text{agar } c > 0, \\ \emptyset, & \text{agar } c \leq 0 \end{cases}$$

tengligidan kelib chiqadi.

O'lbchovli funktsiyalarning ko'paytmasi o'lbchovli bo'lishini ko'rsatish uchun quyidagi ayniyatdan foydalamaniz:

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2].$$

Tenglikning o'ng tomoni o'lbchovli funktsiya bo'ladi, chunki ikki o'lbchovli funktsiyarning yig'indisi, ayrimasi va kvadrati ham o'lbchovli funktsiya. Demak, fg funktsiyasi ham o'lbchovli.

- c) Agar $f(x)$ funktsiyasi o'lbchovli va $f(x) \neq 0, x \in \Omega$ bo'lsa, u holda $\frac{1}{f(x)}$ ham o'lbchovli bo'lishini ko'rsataylik.

Agar $c > 0$ bo'lsa, u holda

$$\{x \in \Omega : 1/f(x) < c\} = \{x \in \Omega : f(x) > 1/c\} \cup \{x \in \Omega : f(x) < 0\},$$

agar $c < 0$ bo'lsa

$$\{x \in \Omega : 1/f(x) < c\} = \{x \in \Omega : 0 > f(x) > 1/c\},$$

agar $c = 0$ bo'lsa

$$\{x \in \Omega : 1/f(x) < c\} = \{x \in \Omega : f(x) < c\}.$$

Yuqoridaq tengliklarning o'ng tomoni har doim o'lbchovli to'plam bo'ladi. Demak, $\frac{1}{f(x)}$ ham o'lbchovli bo'ladi. Endi

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \frac{1}{g(x)}$$

tengligi hamda $f(x)$ va $\frac{1}{g(x)}$ o'lbchovlilikidan $\frac{f(x)}{g(x)}$ funktsiyasining o'lbchovli ekanligi kelib chiqadi.

2.2.3. Agar f funktsiya A to'plamda o'lbchovli bo'lsa, u holda quyidagi funktsiyalarning o'lbchovli ekanligini ko'rsating:

- a) $|f(x)|$;

$$b) f_+ = \max\{f(x), 0\};$$

$$c) f_- = -\min\{f(x), 0\}.$$

Yechimi. a) $|f(x)|$ funktsiyasi o'lbchovli ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun

$$\{x \in A : |f(x)| < c\}$$

to'plami o'lbchovli ekanligini ko'rsatish zarur.

$$\{x \in A : |f(x)| < c\} = \{x \in A : f(x) < c\} \cap \{x \in A : f(x) > -c\}$$

tengligini ko'rib otaylik. $f(x)$ funktsiyasi o'lbchovli ekanligidan, $\{x \in A : f(x) < c\}$ va $\{x \in A : f(x) > -c\}$ to'plamlari o'lbchovli ekanligi kelib chiqadi. Tenglikning o'ng tomonidagi to'plamning kesishmasi o'lbchovlilikidan $\{x \in A : |f(x)| < c\}$ to'planning o'lbchovliligi esa bo'lantiz. Demak, $|f(x)|$ funktsiyasi o'lbchovli.

b, c) f_+ , f_- funksiyalarning o'chovli ekanligi a) banddan va quyidagi tengliklardan kelib chiqadi:

$$f_+ = \max\{f(x), 0\} = \frac{|f(x)| + f(x)}{2},$$

$$f_- = -\min\{f(x), 0\} = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}.$$

2.2.4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uzlucksiz funksiyasi berilgan bo'lsin. Ixtiyoriy haqiqiy c soni uchun $f^{-1}((-\infty; c))$ to'plami ochiq bo'lishini isbotlang.

Yechimi. Ixtiyoriy haqiqiy c sonini olaylik. $x_0 \in f^{-1}((-\infty; c))$ bo'lsin, ya'ni $f(x_0) < c$. f funksiyasi x_0 nuqtada uzlucksizligidan musbat $\varepsilon < c - f(x_0)$ soni uchun shinday $\delta > 0$ soni topilib, $|x - x_0| < \delta$ bo'lganida $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ tengsizligi bajariladi. Demak, x_0 nuqtaning δ -atrofidagi har bir x uchun

$$f(x) < f(x_0) + \varepsilon < f(x_0) + c - f(x_0) = c.$$

Shuning uchun x_0 nuqtaning δ -atrofidagi barcha x nuqtalar $f^{-1}((-\infty; c))$ to'plamiga tegishli bo'ladi. Demak, $f^{-1}((-\infty; c))$ ochiq to'plam bo'ldi.

2.2.5. Agar $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya uzlucksiz bo'lsa, u holda f o'chovli ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Har bir $c \in \mathbb{R}$ uchun

$$\{x \in A : f(x) < c\}$$

to'plamni o'chovli ekanligini ko'rsatamiz. 2.2.4-misoldan bu to'plamning ochiq ekanligi kelib chiqadi. Bundan bu to'plam o'chovli va f funksiyasi o'chovli bo'ladi.

2.2.6. $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ o'chovli funksiya va $z = \varphi(y)$ funksiya \mathbb{R} da uzlucksiz bo'lsa, u holda $z = \varphi(f(x))$ funksiya Ω da o'chovli ekanligini isbotlang.

Yechimi. 2.2.4-misolga binoan $z = \varphi(y)$ uzlucksizligidan, ixtiyoriy haqiqiy c soni uchun $\varphi^{-1}((-\infty, c))$ to'plami \mathbb{R} da ochiq to'plam bo'ladi. \mathbb{R} da ochiq to'plam esa sanoqlicha intervallarning birlashmasi ko'rimishda bo'ladi, ya'ni

$$\varphi^{-1}((-\infty, c)) = \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k).$$

U holda $\varphi(f)$ murakkab funksiyasi uchun

$$\{x \in \Omega : \varphi(f(x)) < c\} = \bigcup_k f^{-1}((\alpha_k, \beta_k)) =$$

$$\begin{aligned}
 &= \bigcup_k \{x \in \Omega : \alpha_k < f(x) < \beta_k\} = \\
 &= \bigcup_k \left(\{x \in \Omega : f(x) < \beta_k\} \setminus \bigcap_k \{x \in \Omega : f(x) \geq \alpha_k\} \right)
 \end{aligned}$$

o'rini. Bundan

$$\{x \in \Omega : f(x) < \beta_k\}, \{x \in \Omega : f(x) \geq \alpha_k\}$$

to'plamlarining o'lchovliligidini va Ω to'plamida $f(x)$ funksiyasining o'lchovliligidini hisobga olsak, har bir $c \in \mathbb{R}$ uchun $\{x \in \Omega : \varphi(f(x)) < c\}$ to'plamining o'lchovli ekanligiga ega bo'lamiz. Demak, $z = \varphi(f(x))$ funksiyasi Ω da o'lchovli.

2.2.7. (Ω, Σ, μ) o'lchovli fazo va $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalari o'lchovli bo'sin. U holda

$$\frac{f(x)}{\ln(1 + |g(x)|)}$$

funksiyasining o'lchovli ekanligini isbotlang.

Yechimi. 2.2.2 va 2.2.3-misollardan $1 + |g(x)|$ o'lchovli funksiya, u holda 2.2.6-misoldan $\ln(1 + |g(x)|)$ o'lchovli bo'ladi. $\frac{f(x)}{\ln(1 + |g(x)|)}$ funksiyasi esa 2.2.2-misolga binoan o'lchovli.

2.2.8. Quyidagicha aniqlangan Dirixle funkiyasining o'lchovli ekanligini ko'rsating.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{agar } x \in \mathbb{I}. \end{cases}$$

Yechimi. Ixtiyoriy $c \in \mathbb{R}$ uchun

$$f^{-1}((-\infty, c)) = \begin{cases} \emptyset, & \text{agar } c \leq 0, \\ \mathbb{I}, & \text{agar } 0 < c \leq 1, \\ \mathbb{R}, & \text{agar } c > 1 \end{cases}$$

munosabatdan f funkiyasining o'chovli ekanligiga ega bo'lamiz.

2.2.9. Agar $\{f_n(x)\}$ o'lchovli funksiyalar ketma-ketligi Ω o'lchovli to'plamda $f(x)$ funkiyasiga deyarli yaqinlashsha, u holda $f(x)$ funksiysi ham o'lchovli ekanligini isbotlang.

Yechimi. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ni qanoatlantirmaydigan nuqtalar o'lchovi not ekanligidan, bu to'plamni bo'sh deb qarashimiz muunkin. Dastlab

$$\{x : f(x) < c\} = \bigcup_k \bigcup_n \bigcup_{m > n} \left\{ x : f_m(x) < c - \frac{1}{k} \right\}. \quad (2.4)$$

tengligi o'rini ekanligini ko'rsatamiz.

Aytaylik, x nuqtasi (2.4) tenglikning chap tomoniga tegishli bo'lsin, ya'ni $f(x) < c$. U holda shunday $k \in \mathbb{N}$ mavjud bo'lib, $f(x) < c - 2/k$. Endi $f_n(x) \rightarrow f(x)$ dan shunday $n \in \mathbb{N}$ mavjud bo'lib, barcha $m \geq n$ uchun

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}.$$

Bu esa x ning (2.4) tenglikning o'ng tomoniga tegishli ekanligini anglatadi.

Aksincha, x nuqta (2.4) tenglikning o'ng tomoniga tegishli bo'lsin. U holda shunday $k \in \mathbb{N}$ mavjud bo'lib, yetarlicha katta m larda

$$f_m(x) < c - \frac{1}{k}$$

bajariladi. Bundan $f(x) < c$, ya'ni x nuqtasi (2.4) ning chap tomoniga tegishli.

Endi (2.4) ning chap tomonidagi to'plamning o'lchovli ekanligidan, f funksiyaning o'lchovli ekanligi kelib chiqadi.

2.2.10. (Yegorov teoremasi). *E chekli o'lchovli to'plam, $\{f_n(x)\}$ o'lchovli funksiyalar ketma-ketligi E da $f(x)$ funksiyaga deyarli yaqinlashadi. U holda ixtiyoriy $\delta > 0$ soni uchun $E_\delta \subset E$ o'lchovli to'plam mavjud bo'lib,*

- 1) $\mu(E \setminus E_\delta) < \delta$;
- 2) E_δ to'plamda $\{f_n(x)\}$ ketma-ketlik $f(x)$ funksiyaga tekis yaqinlashadi.

Yechimi. 2.2.9-misolga ko'ra $f(x)$ o'lchovli funksiyadir. Har bir $n, m \in \mathbb{N}$ uchun

$$E_n^m = \bigcap_{i \geq n} \{x : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m}\}$$

va

$$E^m = \bigcup_{n \geq 1} E_n^m$$

bo'lsin. Ravshanki,

$$E_1^m \subseteq E_2^m \subseteq \cdots \subseteq E_n^m \subseteq \cdots.$$

2.1.7-misolga asosan, har bir m va har bir $\delta > 0$ uchun $n_0(m)$ nomeri topilib,

$$\mu(E^m \setminus E_{n_0(m)}^m) < \frac{\delta}{2^m}.$$

Endi

$$E_\delta = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_{n_0(m)}^m$$

to'plami uchun 1), 2) shartlar bajarilishini ko'rsatamiz.

Ayval $\mu(E \setminus E^m) = 0$ ekanligini tekshiraylik. $x_0 \in E \setminus E^m$ bo'lsin. U holda yetarlicha katta i lar uchun

$$|f_i(x_0) - f(x_0)| \geq \frac{1}{m},$$

ya'ni bu nuqtada $f_n(x)$ ketma-ketlik $f(x)$ ga yaqinlashmaydi. $\{f_n(x)\}$ ketma-ketlik E da $f(x)$ funksiyaga deyarli yaqinlashganligidan, $\mu(E \setminus E^m) = 0$. Bundan

$$\mu(E \setminus E_{n_0(m)}^m) = \mu(E^m \setminus E_{n_0(m)}^m) < \frac{\delta}{2^m}.$$

Demak,

$$\begin{aligned} \mu(E \setminus E_\delta) &= \mu\left(E \setminus \bigcap_{m=1}^{\infty} E_{n_0(m)}^m\right) = \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E \setminus E_{n_0(m)}^m\right) \leq \\ &\leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E \setminus E_{n_0(m)}^m) < \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^m} = \delta, \end{aligned}$$

ya'ni $\mu(E \setminus E_\delta) < \delta$.

Endi E_δ to'plamda $\{f_n(x)\}$ ketma-ketlik $f(x)$ funksiyaga tekis yaqinlashishini ko'rsatamiz. $x \in E_\delta$ bo'lsin. U holda har bir m uchun $i > n_0(m)$ bo'lganda,

$$|f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{m},$$

bu tekis yaqinlashishni anglatadi.

2.2.11. (Lebeg teoremasi). *E chekli o'lchovli to'plam. Agar $\{f_n(x)\}$ o'lchovli funksiyalar ketma-ketligi E da $f(x)$ funksiyaga deyarli yaqinlashsa, u holda bu ketma-ketlik $f(x)$ ga o'lchov bo'yicha ham yaqinlashadi.*

Yechimi. Aytaylik,

$$A = \{x \in E : f_n(x) \rightarrow f(x)\}$$

ya'ni $E = A \setminus B$ bo'lsin. U holda $\{f_n(x)\}$ ketma-ketlik E da $f(x)$ funksiyaga deyarli yaqinlashgani uchun $\mu(B) = 0$. Har bir $\varepsilon > 0$ soni uchun

$$R_n(\varepsilon) = \bigcup_{k=n}^{\infty} E(|f_k - f| \geq \varepsilon), M = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\varepsilon)$$

deylik.

$M \subseteq B$ ekanligini ko'rsatamiz. $x \notin B$ bo'lsin. U holda $x \in A$, ya'ni $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Bundan yetarlicha katta k lar uchun $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$, ya'ni $x \notin R_n(\varepsilon)$, va bundan $x \notin M$.

Demak,

$$M = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\varepsilon) \subset B.$$

Bundan $\mu(M) = 0$. Endi

$$R_1(\varepsilon) \supset R_2(\varepsilon) \supset \dots$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_n(\varepsilon)) = \mu(M) = 0.$$

Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E(|f_n - f| \geq \varepsilon)) = 0,$$

ya'ni $f_n(x)$ ketma-ketlik $f(x)$ ga o'lchov bo'yicha yaqinlashadi.

2.2.12. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

$$f_n(x) = e^{-|x-n|}, x \in \mathbb{R}$$

bo'lsin. $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketligi nol funksiyasiga deyarli yaqinlashuvchi bo'lib, o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi emasligini ko'rsating.

Yechimi. Har bir $x \in \mathbb{R}$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-|x-n|} = 0$$

bo'lganligidan, $f_n \xrightarrow{d} 0$.

Endi $0 < \varepsilon < 1$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| \geq \varepsilon\} &= \{x \in \mathbb{R} : |e^{-|x-n|}| \geq \varepsilon\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : e^{|x-n|} \leq \varepsilon^{-1}\} = \{x \in \mathbb{R} : |x-n| \leq \ln \varepsilon^{-1}\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : n + \ln \varepsilon \leq x \leq n - \ln \varepsilon\} = (n + \ln \varepsilon; n - \ln \varepsilon), \end{aligned}$$

ya'ni

$$\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| \geq \varepsilon\} = (n + \ln \varepsilon; n - \ln \varepsilon).$$

Bundan

$$\mu\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \varepsilon\} = [n - \ln \varepsilon] - [n + \ln \varepsilon] = -2 \ln \varepsilon.$$

Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\{x \in \mathbb{R} : |f_n(t)| \geq \varepsilon\} = -2 \ln \varepsilon \neq 0.$$

Bundan $f_n \xrightarrow{\mu} 0$ o'rini emas.

2.2.13. $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya

$$f_n(x) = \cos^n \pi x, x \in \mathbb{R}$$

kabi aniqlangan bo'lsa, u holda $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlikning nol funksiyasiga deyarli yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. Haqiqiy $a \in \mathbb{R}$ soni uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 1, & \text{agar } a = 1, \\ 0, & \text{agar } |a| < 1, \\ \text{mavjud emas}, & \text{agar } a = -1 \end{cases}$$

ekanligidan,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \pi x = \begin{cases} 1, & \text{agar } x = 2k, k \in \mathbb{Z}, \\ 0, & \text{agar } x \in \mathbb{R} \setminus \{k : k \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{mavjud emas}, & \text{agar } x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

kelib chiqadi. Demak,

$$\{x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \pi x \neq 0\} = \mathbb{Z}.$$

\mathbb{Z} nanoqli to'plam ekanligidan, uning Lebeg o'chovi nolga teng. Bundan $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlikning nol funksiyasiga deyarli yaqinlashishadi.

2.2.14. $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ funksiyasi

$$f_n(x) = \chi_{(\sqrt{n}, \sqrt{n+1})}(x)$$

formula bilan aniqlangan bo'lsa, $\{f_n\}$ ketma-ketligi nol funksiyaga o'chov bo'yicha yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. Ta'rif bo'yicha $\forall \varepsilon > 0$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \varepsilon\}) = 0 \quad (2.5)$$

ekanligini ko'rsatish yetarli.

$0 < \varepsilon < 1$ bo'lsin.

$$A_n(\varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |\chi_{(\sqrt{n}, \sqrt{n+1})}(x)| \geq \varepsilon\}$$

to'planni aniqlaymiz. Bu to'plam $A_n(\varepsilon) = (\sqrt{n}, \sqrt{n+1})$ ga teng. Bundan

$$\mu(A_n(\varepsilon)) = \mu((\sqrt{n}, \sqrt{n+1})) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

deylik.

$M \subseteq B$ ekanligini ko'rsatamiz. $x \notin B$ bo'lsin. U holda $x \in A$, ya'ni $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Bundan yetarlicha katta k lar uchun $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$, ya'ni $x \notin R_n(\varepsilon)$, va bundan $x \notin M$.

Demak,

$$M = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\varepsilon) \subset B.$$

Bundan $\mu(M) = 0$. Endi

$$R_1(\varepsilon) \supset R_2(\varepsilon) \supset \dots$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_n(\varepsilon)) = \mu(M) = 0.$$

Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E(|f_n - f| \geq \varepsilon)) = 0,$$

ya'ni $f_n(x)$ ketma-ketlik $f(x)$ ga o'lchov bo'yicha yaqinlashadi.

2.2.12. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

$$f_n(x) = e^{-|x-n|}, x \in \mathbb{R}$$

bo'lsin. $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketligi nol funksiyasiga deyarli yaqinlashuvchi bo'lib, o'lchov bo'yicha yaqinlashuvchi emasligini ko'rsating.

Yechimi. Har bir $x \in \mathbb{R}$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-|x-n|} = 0$$

bo'lganligidan, $f_n \xrightarrow{d} 0$.

Endi $0 < \varepsilon < 1$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| \geq \varepsilon\} &= \{x \in \mathbb{R} : |e^{-|x-n|}| \geq \varepsilon\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : e^{|x-n|} \leq \varepsilon^{-1}\} = \{x \in \mathbb{R} : |x-n| \leq \ln \varepsilon^{-1}\} = \\ &= \{x \in \mathbb{R} : n + \ln \varepsilon \leq x \leq n - \ln \varepsilon\} = (n + \ln \varepsilon; n - \ln \varepsilon), \end{aligned}$$

ya'ni

$$\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| \geq \varepsilon\} = (n + \ln \varepsilon; n - \ln \varepsilon).$$

Bundan

$$\mu\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \varepsilon\} = [n - \ln \varepsilon] - [n + \ln \varepsilon] = -2 \ln \varepsilon.$$

Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\{x \in \mathbb{R} : |f_n(t)| \geq \varepsilon\} = -2 \ln \varepsilon \neq 0.$$

Bundan $f_n \xrightarrow{\mu} 0$ o'rini emas.

2.2.13. $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiya

$$f_n(x) = \cos^n \pi x, x \in \mathbb{R}$$

kabi aniqlangan bo'lsa, u holda $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlikning nol funksiyasiga deyarli yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. Haqiqiy $a \in \mathbb{R}$ soni uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 1, & \text{agar } a = 1, \\ 0, & \text{agar } |a| < 1, \\ \text{mavjud emas}, & \text{agar } a = -1 \end{cases}$$

ekanligidan,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \pi x = \begin{cases} 1, & \text{agar } x = 2k, k \in \mathbb{Z}, \\ 0, & \text{agar } x \in \mathbb{R} \setminus \{k : k \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{mavjud emas}, & \text{agar } x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

kelib chiqadi. Demak,

$$\{x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \pi x \neq 0\} = \mathbb{Z}.$$

\mathbb{Z} samoqli to'plam ekanligidan, uning Lebeg o'lchovi nolga teng. Bundan $\{f_n(x)\}$ funksional ketma-ketlikning nol funksiyasiga deyarli yaqinlashishadi.

2.2.14. $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ funksiyasi

$$f_n(x) = \chi_{(\sqrt{n}, \sqrt{n+1})}(x)$$

formula bilan aniqlangan bo'lsa, $\{f_n\}$ ketma-ketligi nol funksiyaga o'lchov bo'yicha yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. Ta'rif bo'yicha $\forall \varepsilon > 0$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x)| \geq \varepsilon\}) = 0 \tag{2.5}$$

e'onligini ko'rsatish yetarli.

$0 < \varepsilon < 1$ bo'lsin.

$$A_n(\varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |\chi_{(\sqrt{n}, \sqrt{n+1})}(x)| \geq \varepsilon\}$$

to'plamni aniqlaymiz. Bu to'plam $A_n(\varepsilon) = (\sqrt{n}, \sqrt{n+1})$ ga teng. Bundan

$$\mu(A_n(\varepsilon)) = \mu((\sqrt{n}, \sqrt{n+1})) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Endi $n \rightarrow \infty$ da

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$$

ekanligidan, $\mu(A_n(\varepsilon)) \rightarrow 0$.

2.2.15. Quyidagi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funktsiyasining o'lchovli ekanligini ko'rsating.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt[n]{n^4 + [x]^4}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Yechimi. Dastlab $\cos nx$ va $\sqrt[n]{n^4 + [x]^4}$ funktsiyalari \mathbb{R} da uzhuk-siz ekanligini aytib o'taylik. Bu funktsiyalarning uzhukszılıgidian 2.2.5-misolga ko'ra ularning o'lchovli ekanligi kelib chiqadi. 2.2.2-misoldan o'lchovli funktsiyalarning nishbati o'lchovli ekanligidan,

$$\frac{\cos nx}{\sqrt[n]{n^4 + [x]^4}}$$

funktional ketma-ketlikning har bir hadi o'lchovli. Quyidagi baholash-larni ko'rib o'taylik:

$$|\cos nx| \leq 1, \quad \sqrt[n]{n^4 + [x]^4} \leq \sqrt[n]{n^4} = n^{4/3}.$$

Endi

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4/3}$$

sonli qatori yaqinlashuvchi ekanligidan,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt[n]{n^4 + [x]^4}}$$

qatorining teorisiga yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. 2.2.9-misoldan o'lchovli funktsiyalar ketma-ketligining limit funktsiyasi ham o'lchovli bo'lishidan $f(x)$ funktsiyasi o'lchovli bo'latdi.

2.2.16.

$$f(x, y) = \operatorname{sign} \cos \pi(x^2 + y^2), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

funktsiyasi \mathbb{R}^2 da o'lchovli ekanligini isbotlang.

Yechimi. sign_x funktsiyasi ta'rifiga ko'ra

$$\operatorname{sign}_x = \begin{cases} 1, & \text{agar } x > 0, \\ 0, & \text{agar } x = 0, \\ -1, & \text{agar } x < 0. \end{cases}$$

Denak, $\operatorname{sign} \cos \pi(x^2 + y^2)$ oddiy funktsiya bo'lib, u 1, 0, -1 qiyumatlami mos ravishda quyidagi to'plamarda qabul qiladi:

$$\cos \pi(x^2 + y^2) > 0, \quad \cos \pi(x^2 + y^2) = 0, \quad \cos \pi(x^2 + y^2) < 0.$$

Denak, funktsiya 1 qiyumatni

$$A_1 = \bigcup_{k=0}^{\infty} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2k - \frac{1}{2} < x^2 + y^2 < 2k + \frac{1}{2} \right\},$$

0 qiyumatni

$$A_0 = \bigcup_{k=0}^{\infty} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k + \frac{1}{2} \right\},$$

-1 qiymatni esa

$$A_{-1} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2k + \frac{1}{2} < x^2 + y^2 < 2k + \frac{3}{2} \right\}$$

to'plamlarida qabul qilar ekan.

A_1, A_0 va A_{-1} to'plamlari sanoqli sondagi ochiq xalqlarning birlashmasi ko'rinishdagi ochiq to'plan bo'lganligidan, o'lchovli bo'ladidi. Har bir $k = 0, 1, \dots$ uchun

$$\bigcup_{k=0}^{\infty} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k + \frac{1}{2} \right\}$$

yopiq va u sanoqli sondagi o'lchovli to'plamning birlashmasi sifatida o'lchovli bo'ladidi. Uzlusiz funktsiyaning ta'rifdan qiymatlarini o'lchovli A_1, A_0 va A_{-1} to'plamlarida qabul qiluvchi $f(x, y)$ o'lchovli bo'ledi.

2.2.17. $\{f_n(x)\} \text{ va } \{g_n(x)\}$ ketma-ketliklari Ω to'plamda o'lchov bo'yicha $f(x)$ va $g(x)$ funktsiyalariga yaqinlashsin. U holda $\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x) + g_n(x)) \stackrel{\mu}{=} f(x) + g(x)$ bo'lishini isbotlang.

Yechimi. O'lchovli funktsiyalarning o'lchov bo'yicha yaqinlashishining ta'rifiga nuvofigi istiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\{(x \in \Omega : |f_n(x) + g_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon)\} = 0$$

ekanligini ko'tsatish zarur.

Quyidagi begilashlarni kiritaylik:

$$A_n(f, \varepsilon) = \{x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\},$$

$$A_n(g, \varepsilon) = \{x \in \Omega : |g_n(x) - g(x)| \geq \varepsilon\},$$

$$A_n(f + g, \varepsilon) = \{x \in \Omega : |f_n(x) + g_n(x) - f(x) - g(x)| \geq \varepsilon\}.$$

$$A_n(f + g, \varepsilon) \subseteq A_n\left(f_n, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cup A_n\left(g_n, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

ekanligini ko'rsatamiz. $x \in A_n(f + g, \varepsilon)$ bo'lsin. U holda

$$|f_n(x) + g_n(x) - f(x) - g(x)| \geq \varepsilon.$$

Endi

$$|f_n(x) + g_n(x) - f(x) - g(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)|$$

tengsizligidan

$$|f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| \geq \varepsilon.$$

Bundan

$$|f_n - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}, \quad |g_n - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}$$

tengsizliklardan kamida bittasi o'rinnlidir, ya'ni

$$x \in A_n\left(f_n, \frac{\varepsilon}{2}\right) \cup A_n\left(g_n, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Endi $f_n(x) \xrightarrow{\mu} f(x)$ va $g_n(x) \xrightarrow{\mu} g(x)$ bo'lgani uchun $\mu(A_n(f_n, \frac{\varepsilon}{2})) \rightarrow 0$ va $\mu(A_n(g_n, \frac{\varepsilon}{2})) \rightarrow 0$. Bundan $\mu(A_n(f + g, \varepsilon)) \rightarrow 0$ ya'ni

$$f_n(x) + g_n(x) \xrightarrow{\mu} f(x) + g(x).$$

2.2.18. Yegorov teoremasini

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1]$$

funksional ketma-ketligiga qo'llang. $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi $f(x) \equiv 0$ funksiyasiga tekis yaqinlashadigan $[0, 1]$ segmentning to'ldiruvchisi nol o'lchovli to'plami mavjud emasligini isbotlang.

Yechimi. Ixtiyoriy $0 < \delta < 1$ soni uchun $A_\delta = [0, 1 - \frac{\delta}{2}]$ ni olamiz. U holda

$$\mu(A_\delta) = 1 - \frac{\delta}{2} > \mu(A) - \delta = 1 - \delta$$

va

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1 - \frac{\delta}{2}]} |x^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^n = 0.$$

Endi $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi CA da $f(x) \equiv 0$ funksiyaga tekis yaqinlashadigan $A \subset [0, 1]$ nol o'lchovli to'plamning mavjud emasligini isbotlaymiz.

Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni shunday A to'plami mavjud bo'lsin. U holda yetarlicha kichik $\delta > 0$ uchun $CA \cap [1-\delta, 1]$ kesishmasi bo'sh emas, aks holda $\mu(CA) \neq 1$. Shuning uchun CA to'plamining nuqtalaridan tuzilgan va $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 1$ bo'ladigan $\{x_k\}$ ketma-ketligi mavjud. $\{x_k\}$ ketma-ketligi CA to'plamda $f(x) = 0$ ga tekis yaqinlashishidan har bir $\varepsilon > 0$ uchun shunday n_ε topiladi, barcha $n \geq n_\varepsilon$ va $x \in CA$ uchun $x^n < \varepsilon$. Bundan $\{x_k\}$ ketma-ketligi uchun $\varepsilon < 1$ deb olsak, u holda ixtiyoriy $k \in \mathbb{N}$ va $n \geq n_\varepsilon$ sonlari uchun $x_k^n < \varepsilon$ tengsizligi o'rinni bo'ladi. Oxirgi tengsizlikda $k \rightarrow \infty$ deb olsak, u holda $1 \leq \varepsilon$ bo'ladi. Bu esa $\varepsilon < 1$ ga zid. Hosil bo'lgan ziddiyatdan $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi CA da $f(x) = 0$ funksiyaga tekis yaqinlashadigan $A \subset [0, 1]$ nol o'lchovli to'plam mavjud emas.

2.2.19. Agar f funksiya $[a, b]$ oraliqda uzluksiz bo'lsa, u holda

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) = 0\}$$

to'plamning yopiq ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $[a, b] \setminus A$ to'plamning ochiq ekanligini ko'rsatamiz. $x_0 \notin A$ bo'lsin. Aniqlik uchun $\varepsilon = \frac{1}{2}f(x_0) > 0$ deylik. f ning uzluksizligidan shunday $\delta > 0$ topilib, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ da $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ o'rindir. Bundan $f(x) > f(x_0) - \varepsilon = 2\varepsilon - \varepsilon > 0$. Demak,

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b] \subset [a, b] \setminus A.$$

Bundan $[a, b] \setminus A$ to'plam ochiq ekanligi ko'rinadi.

2.2.20. Agar f va g uzluksiz funksiyalar $[a, b]$ oraliqda ekvivalent bo'lsa, u holda bu oraliqda $f \equiv g$ ni isbotlang.

Yechimi. f va g uzluksiz funksiyalar bo'lganligidan, 2.2.9-misolga ko'ra

$$B = \{x \in [a, b] : (f - g)(x) \neq 0\}$$

to'plami ochiq bo'ladi. $f \sim g$ ekanligidan, B to'plam o'lchovi nolga tengdir. Demak, B o'lchovi nolga teng bo'lgan ochiq to'plam. Bundan $B = \emptyset$, ya'ni $f \equiv g$.

Mustaqil ish uchun masalalar

- Quyidagi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyalar \mathbb{R} da o'lchovli bo'lishini ko'rsating.

a) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[x] + n}, x \in \mathbb{R}$
 b) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n[x])}{n\sqrt{n}}, x \in \mathbb{R}$

2 – 8 missollarda $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksional ketma-ketlikni deyari yuqinlashishga tekshiring.

2. $f_n(x) = \sin^n \pi x.$

3. $f_n(x) = \frac{n^2 |\sin \pi x|}{1 + n^2 |\sin \pi x|}.$

4. $f_n(x) = \frac{x^n}{1 + x^n} \chi_{[0,1]}(x).$

5. $f_n(x) = (x^n - x^{2n}) \chi_{[0,1]}(x).$

6. $f_n(x) = \frac{2nx}{1 + n^2 x^2} \chi_{[0,1]}(x).$

7. $f_n(x) = e^{n(x-2)} \chi_{[0,2]}(x).$

8. $f_n(x) = (x^n - x^m) \chi_{[0,1]}(x).$

9 – 13 missollarda $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funksional ketma-ketlikni o'chov bo'yicha yaqinlashishga tekshiring.

9. $f_n(x) = \chi_{(\sqrt[n]{n}, \sqrt[n]{n+1})}(x).$

10. $f_n(x) = 2^{-n} \chi_{[n, \ln(n+1)]}(x).$

11. $f_n(x) = \sin^n x \chi_{[2\pi n, 2\pi(n+1)]}(x).$

12. $f_n(x) = \cos x + |x| \chi_{[\sqrt[n]{n}, \sqrt[n]{n+1}]}(x).$

13. $f_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \chi_{[k, k+\frac{1}{k}]}(x).$

14. \mathbb{R} da aniqlangan har bir monoton funksiya o'chovli bo'lishini isbotlang.

15. (Ω, Σ, μ) o'chovli fazo bo'lib, $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi Ω to'plamda o'chov bo'yicha $f(x)$ funksiyasiga yaqinlashsin. U holda $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^2(x) \leq 0$ ekranligini isbotlang.

16. Agar f, g funksiyalar $[a, b]$ oraliqida uzhaksiz bo'lsa, u holda to'planning yopiq ekranligini ko'rsating.

$$\{x \in [a, b] : f(x) = g(x)\}$$

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & \text{agar } f(x) \leq n, \\ n, & \text{agar } f(x) > n. \end{cases}$$

U holda har bir $f_n(x)$ funksiya E da chegaralangan bo'ladı. Demak, har bir $f(x)$ funksiya E to'plamida integrallanvchi. Bu ketma-ketlik kamayuvchi emas, ya'mi har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

$$\{x \in [a, b] : f(x) = c\}$$

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x), x \in A.$$

18. Agar f funksiya $[a, b]$ oraliqida uzhaksiz bo'lsa, u holda ixtiyor yopiq ekranligini ko'rsating.

2.3. Lebeg integrali

(Ω, Σ, μ) o'chovli fazo bo'lsim. $E \subset \Omega$ chekli o'chovli to'plam, bu to'plamda aniqlangan $f(x)$ o'chovli funksiya uchun

$$A < f(x) < B$$

bo'lsim. $[A, B]$ oraliqni $A = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_n = B$ bilan bo'laniz va har bir yarim segmentiga

$$E_k = \{x \in E : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}, k = \overline{0, n-1}$$

to'plamlarni mos qo'yaniż. Lebegning quyisi va yuqori yig'indilari deb ataluvchi

$$s = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E_k)$$

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} y_{k+1} \mu(E_k)$$

yig'indilarni qaraymiz. Agar $\lambda = \max(y_{k+1} - y_k)$ deb olsak, u holda

$$0 \leq S - s \leq \lambda \mu(E). \quad (2.6)$$

(2.6) tengsizlikda $\lambda \rightarrow 0$ bo'lganda $\{S\}$ va $\{s\}$ yig'indilar bioror songa intiladi va bu son $f(x)$ funksiyaning E to'plam bo'yichcha Lebeg integrali devildi. Lebeg integrali (L) $\int_E f(x) d\mu(x)$ kabi belgilanadi.

Chekli o'chovli E to'plamida chegaralannagan $f(x)$ o'chovli funksiya uchun Lebeg integrali quyidagicha kiritiladi. Dastlab $f(x)$ funksiya E to'plamida nonanfy bo'lsin. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $f_n(x)$ funksiyani quyidagicha aniqlaylik:

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x), & \text{agar } f(x) \leq n, \\ n, & \text{agar } f(x) > n. \end{cases}$$

U holda har bir $f_n(x)$ funksiya E da chegaralangan bo'ladı. Demak,

har bir $f(x)$ funksiya E to'plamida integrallanvchi. Bu ketma-ketlik kamayuvchi emas, ya'mi har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun

Bu $\{f_n(x)\}$ ketma-ketlik uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x)$$

limit chekli bo'lsa u holda nomanifiy $f(x)$ funksiya integrallanuvchi deyiladi.

Endi chekli o'chovli E to'plamda ixtiyoriy chegaralanniagan o'chovli $f(x)$ funksiyani olaylik. Bu funksiyani misbat va manfiy $f = f_+ + f_-$ qismlarga ajratamiz. $f(x)$ funksiyaning Lebeg integralini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\int_E f(x) d\mu(x) = \int_E f_+(x) d\mu(x) + \int_E f_-(x) d\mu(x).$$

f funksiyaning (a, b) oraliqdagi tebranishi deb

$$\omega(a, b) = \sup_{a < x < b} f(x) - \inf_{a < x < b} f(x)$$

soniga aytildi. f funksiyaning x nuqtadagi tebranishi deb,

$$\omega(x) = \sup\{\omega(a, b) : a < x < b\}$$

soniga aytildi. Ta'rifdan bevosita ko'rindikli, f funksiyaning x nuqtada uzluksizligi $\omega(x) = 0$ ga teng kuchlidir.

Masalalar

2.3.1. $f(x)$ chegaralangan o'chovli funksiya E o'chovli to'plamda $a \leq f(x) \leq b$ tengsizlikni qanoatlantirsa, u holda

$$a\mu(E) \leq \int_E f(x) d\mu \leq b\mu(E)$$

o'rinnlidir.

Yechimi. Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ sonini olib $A = a - \varepsilon$, $B = b - \varepsilon$ deylik. U holda $A < f(x) < B$. Bundan Lebeg yig'indilarini $[A, B]$ oraliqni bo'laklab yozishimiz mumkin:

$$A \sum_{k=0}^{n-1} \mu(E_k) \leq \sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E_k) \leq B \sum_{k=0}^{n-1} \mu(E_k).$$

Bunda $\mu(E) = \sum_{k=0}^{n-1} \mu(E_k)$ ni hisobga olsak, u holda

$$A\mu(E) \leq \sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E_k) \leq B\mu(E).$$

Bu tengsizlik ixtiyoriy bo'laklashda o'rini ekanligidan,

$$(a - \varepsilon)\mu(E) \leq \int_E f(x) d\mu \leq (b + \varepsilon)\mu(E).$$

ε soni ixtiyoriyligidan

$$a\mu(E) \leq \int_E f(x) d\mu \leq b\mu(E).$$

2.3.2. *E o'lchovli to'plamda $f(x) \equiv c$ bo'lsa, u holda $\int_E f(x) d\mu = c\mu(E)$ o'rindir.*

Yechimi. *E to'plamda $c \leq f(x) \leq c$ bo'lganligidan, 2.3.1-misolga ko'ra*

$$c\mu(E) \leq \int_E f(x) d\mu \leq c\mu(E),$$

ya'ni $\int_E f(x) dx = c\mu(E)$.

2.3.3. *$f(x)$ o'lchovli funksiya E o'lchovli to'plamda $f(x) \geq 0$ tengsizlikni qanoatlanadirsa, u holda $\int_E f(x) d\mu \geq 0$ o'rindir.*

Yechimi. *E to'plamda $f(x) \geq 0$ bo'lganligidan, 2.3.1-misolga ko'ra*

$$\int_E f(x) d\mu \geq 0\mu(E),$$

ya'ni $\int_E f(x) d\mu \geq 0$.

2.3.4. *Agar $E_i \in \Sigma$, $E_i \cap E_j \neq \emptyset$, $i \neq j$, $E = \bigcup_i E_i$ bo'lsa, u holda*

$$\int_E f(x) d\mu = \sum_k \int_{E_k} f(x) d\mu. \quad (2.7)$$

Yechimi. Avvalo ikkita qo'shiluvchi bo'lgan holni qaraylik, ya'ni $E = E' \cup E''$. y_0, y_1, \dots, y_n bo'laklash nuqtalari bo'lsin. Har bir $k = \overline{0, n-1}$ uchun

$$E_k = \{x \in E : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\},$$

$$E'_k = \{x \in E' : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\},$$

$$E''_k = \{x \in E'' : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}$$

deylik. Ravshanki, $E_k = E'_k \cup E''_k$, $E'_k \cap E''_k = \emptyset$. Bundan

$$\sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E_k) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E'_k) + \sum_{k=0}^{n-1} y_k \mu(E''_k).$$

Bunda $\lambda \rightarrow 0$ desak, u holda

$$\int_E f(x) d\mu = \int_{E'} f(x) d\mu + \int_{E''} f(x) d\mu.$$

Induksiya bo'yicha (2.7) tenglik chekli qo'shiluvchi uchun ham o'rinali ekanlig'i kelib chiqadi.

Endi $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ holni qaraylik. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $R_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} E_k$ deylik. $\mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k)$ dan

$$\mu(R_n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu(E_k) \rightarrow 0 \quad (2.8)$$

munosabatiga ega bo'lamiz. (2.7) tenglik chekli qo'shiluvchi uchun ham o'rinali ekanligidan,

$$\int_E f(x) d\mu = \sum_{k=1}^n \int_{E_k} f(x) d\mu + \int_{R_n} f(x) d\mu.$$

2.3.1-misoldan

$$A\mu(R_n) \leq \int_{R_n} f(x) d\mu \leq B\mu(R_n).$$

(2.8) ni hisobga olsak, u holda $n \rightarrow \infty$ da

$$\int_{R_n} f(x) d\mu \rightarrow 0.$$

Bundan (2.7) tenglik kelib chiqadi.

2.3.5. Agar $\mu(E) = 0$ bo'lsa, u holda $\int_E f(x) d\mu = 0$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Har bir bo'laklash to'plamini $E_k = \{x \in E : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}$ uchun $E_k \subset E$ bo'lganligidan, $\mu(E_k) = 0$ bo'ladi. Bundan

$$\int_E f(x) d\mu = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(E_k) = 0.$$

2.3.6. Agar $f \sim g$ bo'lsa, u holda $\int_E f(x) d\mu(x) = \int_E g(x) d\mu(x)$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $E_1 = \{x \in E : f(x) \neq g(x)\}$ bo'lsin. U holda $f \sim g$ bo'lganligidan,

$$\mu(E_1) = 0$$

va

$$f(x) = g(x), x \in E \setminus E_1$$

o'rindir. 2.3.5-misoldan $\int_{E_1} f(x) d\mu(x) = \int_{E_1} g(x) d\mu(x) = 0$. Bundan

$$\begin{aligned} \int_E f(x) d\mu(x) &= \int_{E \setminus E_1} f(x) d\mu(x) + \int_{E_1} f(x) d\mu(x) = \\ &= \int_{E \setminus E_1} g(x) d\mu(x) + \int_{E_1} g(x) d\mu(x) = \int_E g(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

2.3.7. Agar f funksiya $[a, b]$ oraliqda Riman ma'nosida integrallanuvchi bo'lsa, u holda uning uzulish nuqtalari to'plami D nol o'lchoviga ega.

Yechimi. f funksiya $[a, b]$ oraliqda Riman ma'nosida integrallanuvchi bo'lganligidan, u chegaralangandir. Har bir $k \in \mathbb{N}$ uchun

$$D_k = \{x \in [a, b] : \omega(x) \geq \frac{1}{k}\}$$

deylik. U holda

$$D_1 \subset D_2 \subset \dots \subset D_k \subset \dots$$

$D = \bigcup_{k \geq 1} D_k$ bu f ning uzulish nuqtalari to'plamidir. Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ sonini olamiz. Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

nuqtalarni olaylik:

$$m_i = \inf_{x_{i-1} < x < x_i} f(x), M_i = \sup_{x_{i-1} < x < x_i} f(x),$$

Darbu yig'indilari

$$s = \sum_{i=0}^{n-1} m_i(x_{i+1} - x_i), S = \sum_{i=0}^{n-1} M_i(x_{i+1} - x_i),$$

va

$$S - s < \varepsilon.$$

$F = \{i \in \overline{0, n-1} : M_i - m_i \geq 1/k\}$ bo'lsin. U holda

$$D_k \subset \bigcup_{j \in F} [x_{j-1}, x_j],$$

bundan

$$\mu(D_k) \leq \sum_{j \in F} (x_j - x_{j-1}).$$

Endi

$$\begin{aligned} S - s &= \sum_{i=0}^{n-1} (M_i - m_i)(x_{i+1} - x_i) \geq \\ &\geq \sum_{j \in F} (M_i - m_i)(x_{i+1} - x_i) \geq \sum_{j \in F} \frac{1}{k} (x_{i+1} - x_i) \geq \frac{1}{k} \mu(D_k). \end{aligned}$$

$S - s < \varepsilon$ dan $\mu(D_k) \leq \varepsilon k$. ε ning ixtiyorligidan, $\mu(D_k) = 0$ kelib chiqadi. U holda $\mu(D) \leq \sum_{k \geq 1} \mu(D_k) = 0$, ya'ni $\mu(D) = 0$.

2.3.8. Agar f funksiya $[a, b]$ oraliqda Riman ma'nosida integrallanuvchi bo'lsa, u holda f funksiya $[a, b]$ oraliqda Lebeg ma'nosida ham integrallanuvchi bo'ladi va

$$(L) \int_a^b f(x) d\mu(x) = (R) \int_a^b f(x) dx.$$

Yechimi. f funksiya $[a, b]$ oraliqda Riman ma'nosida integrallanuvchi bo'lganligidan, u chegaralangandir va uzulish nuqtalari to'plaini D uchun, 2.3.7-misolga ko'ra $\mu(D) = 0$. Nol o'lchovli to'plamda ixtiyoriy funksiya o'lchovli ekanligidan, f ning $E = [a, b] \setminus D$ to'plamda o'lchovli ekanligini ko'rsatamiz.

$c \in \mathbb{R}$ sonini olamiz. $x \in E(f > c)$, ya'ni $f(x) > c$ bo'lsin. $\varepsilon_x = c - f(x)$ deylik. E to'plamda f uzliksizligidan shunday $\delta_x > 0$ topilib, $x' \in E$, $|x - x'| < \delta_x$ uchun $|f(x) - f(x')| < \varepsilon_x$ o'rinnlidir. Bundan $f(x') < f(x) + \varepsilon_x = c$, ya'ni $f(x') < c$.

$$G = \bigcup \{(x - \delta_x, x + \delta_x) : x \in E(f > c)\}$$

ochiq to'plamdir. Demak, o'lchovli va bundan $E \cap G$ o'lchovlidir.

$E(f > c) = E \cap G$ ekanligini ko'rsatamiz. Haqiqatan, $x \in E(f > c)$ bo'lsa, u holda $x \in E$ va $f(x) > c$. Bundan $x \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \subset G$, ya'ni $x \in E \cap G$. Aksincha, $x \in E \cap G$ bo'lsin. U holda $x \in E$ va biror $x_0 \in E(f > c)$ uchun $x \in (x_0 - \delta_x, x_0 + \delta_x)$. Bundan $f(x) > c$, ya'ni $x \in E(f > c)$. Demak, $E(f > c)$ o'lchovli to'plam. f chegaralangan va o'lchovli ekanligidan, u Lebeg ma'nosida integrallanuvchidir.

Endi integrallarning tengligini ko'rsatamiz. $[a, b]$ oraliqni $[x_{i-1}, x_i]$ oraliqlarga bo'lamiz va har bir oraliqda 2.3.1-misolga asosan, Lebeg integralini baholaymiz:

$$m_i \Delta_i \leq (L) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) d\mu(x) \leq M_i \Delta_i.$$

Barcha i lar bo'yiclia yig'indi olsak, u holda

$$s \leq (L) \int_a^b f(x) d\mu(x) \leq S.$$

$\lambda = \max \Delta_i \rightarrow 0$ da s va S Darbu yig'indilari Riman integraliga intiladi. Demak,

$$(L) \int_a^b f(x) d\mu(x) = (R) \int_a^b f(x) dx.$$

2.3.9. μ to'g'ri chiziqdagi Lebeg o'lchovi bo'lsin. \mathbb{Q} rational sonlar to'plami bo'lsa, u holda

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{Q}}(x) d\mu(x)$$

integralni hisoblang.

Yechimi. Lebeg integrali additivligidan,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{Q}}(x) d\mu(x) &= \int_{\mathbb{Q}} \chi_{\mathbb{Q}}(x) d\mu(x) + \int_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} \chi_{\mathbb{Q}}(x) d\mu(x) = \\ &= \int_{\mathbb{Q}} 1 \cdot d\mu(x) + \int_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} 0 \cdot d\mu(x) = 1 \cdot \mu(\mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 = 0, \end{aligned}$$

ya'ni $\int \chi_{\mathbb{Q}}(x) d\mu(x) = 0$.

2.3.10. Agar $f(x) = (-1)^{|x|}$ va $A = [-3, 2)$ bo'lsa, u holda

$$\int_A f(x) d\mu(x), \quad \int_A |f(x)| d\mu(x), \quad \int_A f_+(x) d\mu(x), \quad \int_A f_-(x) d\mu(x)$$

integrallarni hisoblang.

Yechimi. $[-3, 2)$ oraliqni

$$[-3, 2) = [-3, -2) \cup [-2, -1) \cup [-1, 0) \cup [0, 1) \cup [1, 2) = \bigcup_{k=-3}^1 [k, k+1)$$

ko'rinishda yozsak, u holda har bir $x \in [k, k+1)$, $k \in \overline{-3, 1}$ uchun

$$f(x) = (-1)^k,$$

ya'ni

$$f(x) = \sum_{k=-3}^1 (-1)^k \chi_{[k, k+1)}(x)$$

ko'rinishdagi oddiy funksiya ekanligi ko'rindi. Lebeg integrali ta'rifidan,

$$\begin{aligned} \int_A f(x) d\mu(x) &= \sum_{k=-3}^1 (-1)^k \mu([k, k+1)) = \sum_{k=-3}^1 (-1)^k [(k+1) - k] = \\ &= \sum_{k=-3}^1 (-1)^k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 = -1, \end{aligned}$$

ya'ni $\int_A f(x) d\mu(x) = -1$.

$$\int_A |f(x)| d\mu(x) = \sum_{k=-3}^1 |(-1)^k| \mu([k, k+1)) = \sum_{k=-3}^1 1 = 5,$$

ya'ni $\int_A |f(x)| d\mu(x) = 5$. Endi

$$f_+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2} \quad \text{va} \quad f_-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2}$$

tengliklaridan

$$\int_A f_+(x) d\mu(x) = \frac{1}{2} \left(\int_A |f(x)| d\mu(x) + \int_A f(x) d\mu(x) \right) = \frac{1}{2}(5 - 1) = 2$$

va

$$\int_A f_-(x) d\mu(x) = \frac{1}{2} \left(\int_A |f(x)| d\mu(x) - \int_A f(x) d\mu(x) \right) = \frac{1}{2}(5 + 1) = 3.$$

2.3.11. $f(x)$ funksiya

$$f(x) = \begin{cases} 2^x, & \text{agar } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ \sin x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

kabi aniqlangan. Bu funksiya $[0, 1]$ segmentida Riman ma'nosida integrallanuvchimi? Lebeg ma'nosidachi? Agar integrallanuvchi bo'lsa uning integralini hisoblang.

Yechimi. Bu funksiya Riman ma'nosida integrallanuvchi emas. Ay'taylik, $\{\Delta x_k, k = \overline{1, n}\} - [0, 1]$ segmentning biror bo'limmasi bo'lsin.

Agar $\xi_k \in \Delta x_k$ sonlar ratsional bo'lsa, u holda Darbu yig'indisi

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \sin(\xi_k) \Delta x_k.$$

Bu holda Darbu yig'indilari $\int_0^1 \sin(x) dx = -\cos 1 - 1$ soniga yaqinlashadi.

Endi $\xi_k \in \Delta x_k$ sonlar irratsional bo'lsa, u holda Darbu yig'indisi

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n 2^{\xi_k} \Delta x_k.$$

Bu holda Darbu yig'indilari $\int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2}$ soniga yaqinlashadi.

$-\cos 1 - 1 \neq \frac{1}{\ln 2}$ bo'lganligidan, $f(x)$ funksiya Riman ma'nosida integrallanuvchi emas.

Endi A_1 orqali $[0, 1]$ to'plamida joylashgan barcha irratsional sonlari to'plamini, A_2 orqali esa shu segmentdagi barcha ratsional sonlar to'plamini belgilaymiz, ya'ni $A = [0, 1]$ va $A = A_1 \cup A_2$. Ratsional sonlari to'plami sanoqli bo'lganligidan, uning o'lchovi 0 ga teng, ya'ni $\mu(A_2) = 0$. U holda funksiyaning Lebeg integrali

$$\int_A f(x) d\mu = \int_{A_1} 2^x d\mu + \int_{A_2} \sin x d\mu = \int_0^1 2^x dx = 1/\ln 2.$$

Demak, funksiya Lebeg ma'nosida integrallanuvchi.

2.3.12. Agar $f(x)$ funksiya

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & \text{agar } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{x-1}, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

ko'rinishda berilgan bo'lsa, $\int_{[0,1]} f(x)d\mu$ ni hisoblang, bu yerda μ haqiqiy sonlar to'plamidagi Lebeg o'lchovi.

Yechimi. $f(x)$ funksiyasi \mathbb{R} da deyarli barcha joyda $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ funksiyasiga ekvivalent. U holda Lebeg integralining hossasiga ko'ra

$$\int_{[0,1]} f(x)d\mu = \int_{[0,1]} g(x)d\mu = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2.$$

2.3.13. Tengsizlikni isbotlang.

$$\frac{2}{\sqrt[e]{e}} \leq \int_{[-1,1]} e^{x^2+x} \chi_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}(x) d\mu \leq 2e^2,$$

bu yerda μ haqiqiy sonlar to'plamidagi Lebeg o'lchovi.

Yechimi. Dastlab \mathbb{R} ning deyarli hamma joyida $\chi_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}(x) = 1$ ekanligini aytib o'taylik. Shuning uchun

$$\frac{2}{\sqrt[e]{e}} \leq \int_{[-1,1]} e^{x^2+x} d\mu \leq 2e^2$$

tengsizligini isbotlash kifoya.

$[-1, 1]$ oralig'ida $e^{-1/4} \leq e^{x^2+x} \leq e^2$ ekanligi ravshan. $A = [-1, 1]$ to'plamining o'lchovi $\mu(A) = 1 - (-1) = 2$ ekanligidan, va 2.3.1-misoldan

$$\frac{2}{\sqrt[e]{e}} \leq \int_{[-1,1]} e^{x^2+x} d\mu \leq 2e^2$$

munosabatiga ega bo'lamiz.

2.3.14. $A = (0, 1]$ toplamida f funksiya berilgan bo'lib, u $A_k = \left(\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}\right]$ yarim intervalida $\frac{(-1)^k}{k^\alpha}$, $k \in \mathbb{N}$ qiymatini qabul qilsin. α ning qanday qiymatlarida bu funksiya $(0, 1]$ kesmada Lebeg ma'nosida integrallanuvchi bo'ladi?

Yechimi. f funksiya oddiy funksiya bo'lib, u sanoqli $\frac{(-1)^k}{k^\alpha}$, $k \in \mathbb{N}$ qiymatlarini qabul qiladi. A_k to'plamlari o'lchovli bo'lgani uchun $f(x)$

funksiyasi ham o'lchovli bo'ladi. Demak,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \mu(A_k)$$

qatori yaqinlashuvchi bo'lsa, $f(x)$ funksiyasi A da integrallanuvchi bo'ladi. Endi

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \mu(A_k) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^{\alpha+1}(k+1)} \end{aligned}$$

ekanligidan, qator $\alpha > -1$ bo'lgandagina yaqinlashuvchi bo'ladi.

2.3.15. Hisoblang:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} n \sin \frac{|x|}{n} (1+x^4)^{-1} d\mu.$$

Yechimi. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $f_n(x) = n \sin \frac{|x|}{n} (1+x^4)^{-1}$ funksiyani qaraylik. Ixtiyoriy $x \in \mathbb{R}$ uchun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin \frac{|x|}{n}}{1+x^4} = \frac{|x|}{1+x^4} = f(x).$$

Bundan tashiqari ixtiyoriy $x \in \mathbb{R}$ uchun

$$|f_n(x)| \leq \frac{|x|}{1+x^4} = g(x).$$

Nomanfiy $g(x)$ funksiya \mathbb{R} da integrallanuvchi. Bundan f_n ham \mathbb{R} da Lebeg ma'nosida integrallanuvchi va

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} n \sin \frac{|x|}{n} (1+x^4)^{-1} d\mu = \int_{\mathbb{R}} \frac{|x|}{1+x^4} d\mu = \text{arctgx}^2 \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

2.3.16. Aytaylik, $\{f_n(x)\}$ funksiya $A = [0, 1]$ da o'lchovli, nomanfiy, chegaralangan funksiyalar ketma-ketligi uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n(x) d\mu \rightarrow 0$ bo'lsin. U holda A to'plamida $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \rightarrow 0$ ekanligi kelib chiqadimi?

Yechimi. Ummunan aytganda, kelib chiqmaydi. Buni quyidagi mioddan ko'rsa bo'ladi.

Ixtiyoriy natural n soni yagona ravishda

$$n = 2^k + i, \quad k = 0, 1, 2, \dots; 0 \leq i < 2^{k-1}$$

shaklda yozilishini eslatib o'taylik. Endi shunday $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligini olaylik, ixtiyoriy $n = 2^k + i$ uchun

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \in [\frac{1}{2^{k+1}}, \frac{1}{2^k}], \\ 0, & \text{agar } x \notin [\frac{1}{2^{k+1}}, \frac{1}{2^k}]. \end{cases}$$

U holda $\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2^{k+1}}$. $n \rightarrow \infty$ da k ham cheksizlikka intilganidan,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0.$$

Lekin $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi $A = [0, 1]$ to'plamining hech bir nuqtasida nolga intilmaydi.

2.3.17. $\int_{(0,1)} f(x) d\mu$ Lebeg integralini hisoblang, bunda

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & \text{agar } x \in (0, 1) \setminus Q, \\ 6x + 7, & \text{agar } x \in (0, 1) \cap Q. \end{cases}$$

Yechimi. $g(x) = \frac{1}{x^2}$ funksiyasini qaraymiz. Funksiya aniqlanishiga ko'ra $f(x) \sim g(x)$. U holda

$$\int_{(0,1)} f(x) d\mu = \int_{(0,1)} g(x) d\mu$$

bo'ladi. Endi $g(x)$ funksiyasining integralini hisoblaymiz. $g(x)$ funksiya $(0, 1)$ da musbat va chegaralanmagan. $g(x)$ funksiyasi orqali quyidagi funksiyalarini tuzamiz:

$$[g(x)]_n = \begin{cases} n, & \text{agar } \frac{1}{x^2} > n, \\ \frac{1}{x^2}, & \text{agar } \frac{1}{x^2} \leq n \end{cases}$$

ya'ni

$$[g(x)]_n = \begin{cases} n, & \text{agar } 0 < x < \frac{1}{\sqrt{n}}, \\ \frac{1}{x^2}, & \text{agar } \frac{1}{\sqrt{n}} \leq x < 1. \end{cases}$$

$[g(x)]_n$ funksiyaning integralini hisoblaymiz. $[g(x)]_n$ funksiyasi $(0, 1)$ da uzluksiz, u holda Riman ma'nosida integrallanuvchi:

$$(L) \int_{(0,1)} [g(x)]_n d\mu = (R) \int_0^1 n dx + (R) \int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 \frac{1}{x^2} dx = 2\sqrt{n} - 1$$

Tarif bo'yicha

$$\int_{(0,1)} g(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2\sqrt{n} - 1) = \infty.$$

Demak, $g(x)$ funksiya Lebeg ma'noda integrallanuvchi emas, bundan esa unga ekvivalent funksiya $f(x)$ ham Lebeg ma'noda integrallanuvchi emasligi kelib chiqadi.

2.3.18. $(0, \infty)$ oraliqda $f(t) = e^{-|t|}$ funksiyaning Lebeg integralini hisoblang.

Yechimi. $n \leq t < n+1$ da $[t] = n$ bo'lganligidan, bu oraliqda $f(t) = e^{-n}$. Bundan

$$\begin{aligned} \int_{(0, \infty)} f(t) dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-n} dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n} = \frac{e}{e-1}. \end{aligned}$$

2.3.19. $(0, \infty)$ oraliqda

$$f(t) = \frac{1}{[t+1][t+2]}$$

funksiyaning Lebeg integralini hisoblang.

Yechimi. $n \leq t < n+1$ da

$$f(t) = \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Bundan

$$\int_{(0, \infty)} f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{(n+1)(n+2)} dt =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1.$$

2.3.20. $(0, \infty)$ oraliqda

$$f(t) = \frac{1}{[t]!}$$

funksiyaning Lebeg integralini hisoblang.

Yechimi. $n \leq t < n+1$ da

$$f(t) = \frac{1}{n!}.$$

Bundan

$$\begin{aligned} \int_{(0, \infty)} f(t) dt &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{n!} dt = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e. \end{aligned}$$

Mustaqil ish uchun masalalar

1 – 9 misollarda $\int_E f(x) dx$ Lebeg integralini hisoblang.

1.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [\frac{1}{16}, 1], \\ \frac{4}{x}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [1, \frac{5}{4}], \\ \sin^2(x), & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [\frac{1}{16}, \frac{5}{4}]$.

2.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)^3}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, 1], \\ 7x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, 1]$.

3.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+\sqrt{x}}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, 4], \\ \frac{2x-3}{x^2-3x+8}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [4, 5], \\ \sin(3+x^2), & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, 5]$.

4.

$$f(x) = \begin{cases} x \cos^2 x, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, \pi], \\ x \sin^2 x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, \pi]$.

5.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, 1], \\ \sin x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, 1]$.

6.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, \frac{1}{\sqrt{3}}], \\ \frac{x^4}{x^2 + 1}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}], \\ 7, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, \sqrt{3}]$.

7.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\arctgx}{1+x^2}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, \sqrt{3}], \\ -\frac{1}{x+2}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [\sqrt{3}, 2], \\ \cos^2 x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, 2]$.

8.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x \sqrt{1 + \operatorname{tg} x}}, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, \frac{\pi}{4}], \\ 8x^2 + 4, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, \frac{\pi}{4}]$.

9.

$$f(x) = \begin{cases} x \sin^2 x, & \text{agar } x \in \mathbb{I} \cap [0, \pi], \\ x \cos^2 x, & \text{agar } x \in \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bunda $E = [0, \pi]$.

III BOB

Metrik fazolar

3.1. Metrik fazolar

Haqiqiy sonlar orasidagi masofa tushunchasini ummullaşdırılish natijasida, zamonaviy matematikaning eng mutüm tushunchalatidan biri bo'lgan metrik fazo tushinchasi fransuz matematigi M. Fresle tononidan 1906 yilda kiritilgan. Quyida biz metrik fazolardagi asosiy tushunchalar bilan tanishamiz.

Ta'rif. X to'planning har bir x va y elementlari juftligiga nonanifiy $\rho(x, y)$ haqiqiy soni mos qo'yilgan bo'lib, quyidagi shartarni qanoatlansira, u holda ρ funksiyaga metrika deyiladi:

$$1. \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ (ayniylik aksiomasi);}$$

$$2. \rho(x, y) = \rho(y, x) \text{ (simmetriklik aksiomasi);}$$

$$3. \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \text{ (uchburchak aksiomasi).}$$

(X, ρ) juftligiga metrik fazo deyiladi.

1. Haqiqiy sonlar o'qida x va y sonlar orasidagi masofani $\rho(x, y) = |x - y|$ ko'rinishda aniqlasak, u holda ρ metrika bo'ladi.

2. n sondagi haqiqiy sonlarning $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tartiblanigan guruhlari to'plamida metrikani $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$ kabi kiritish mumkin. Bu to'plam n -o'lichovli arifmetik Evklid fazosi deyiladi va \mathbb{R}^n orqali belgilanadi.

3. ℓ_2 fazosi. Elementlari haqiqiy sonlarning $x = \{x_n\}$ ketma-ketliklardan iborat bo'lib, bu ketma-ketliklarning hadari $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty$ shartini qanoatlantiruvchi to'plamda metrikani $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}$ ko'rinishda kiritish mumkin. Bu metrik fazo ℓ_2 orqali belgilanadi.

4. $[a, b]$ segmentida aniqlangan barcha haqiqiy uzlitsiz funksiyalar to'plamida metrikani $\rho_1(x_1, x_2) = \rho_2(f(x_1), f(x_2))$ tengligi o'rini bolsa, u holda bu metrik fazolar o'zaro izometrik deb ataladi.

$$\rho(f, g) = \max_{a \leq t \leq b} |g(t) - f(t)|$$

ko'rinishda kiritish mumkin. Bu metrik fazo $C[a, b]$ orqali belgilanadi.

5. m fazosi. Hadhari chegaralangan haqiqiy sonlarning cheksiz $x = \{x_n\}$ ketma-ketliklari to'plamida masofani

$$\rho(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$$

ko'rinishda kirtsak, u holda bu to'plam metrik fazo bo'ladi. Bu metrik fazo m orqali belgilanadi.

(X, ρ) metrik fazoda biror $\{x_n\}$ ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Agar ixтирий $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday $n(\varepsilon)$ nomer topilib, $n > n(\varepsilon)$ tengsizligini qanoatlantiruvchi barcha n lar uchun $\rho(x_n, x) < \varepsilon$ tengsizligi o'rini bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketligi $x \in X$ elementiga *yaqinlashuvchi deyiladi* va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ yoki $x_n \xrightarrow{x}$ x kabi belgilanadi. x nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketligining *limiti* deb ataladi.

Agar $\{x_n\}$ ketma-ketlik limit muqtaga ega bo'lsa, u holda u yagona bo'ladi. Haqiqatan, agar $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x'$ bo'lsa, u holda

$$\rho(x, x') \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, x').$$

Bu tengsizlikning o'ng tononi $n \rightarrow \infty$ da nolga intildi. Brundan $\rho(x, x') = 0$, ya'ni $x = x'$.

Ta'rif. X metrik fazoda $\{x_n\}$ ketma-ketligi berilgan bo'lsin. Agar $\forall \varepsilon > 0$ soni uchun $n(\varepsilon)$ nomer topilib, $n, m > n(\varepsilon)$ tengsizliklarini qanoatlantiruvchi barcha n, m natural sonlari uchun $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ tengsizligi o'rini bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental deb ataladi.

Ta'rif. Agar metrik fazoning ixtiyoriy fundamental ketma-ketligi shu fazoga tegishli limitiga ega bo'lsa, u holda u to'la metrik fazo deb ataladi.

Yuqorida keltirilgan haqiqiy sonlar to'plamini. Ratsional sonlar to'plami esa, to'la emas metrik fazoga misol bo'ladi. Haqiqatan, $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ bo'lganda, $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental, ammuno ming limiti irrational e soniga teng. (X, ρ_1) va (Y, ρ_2) metrik fazolar bo'lsin. X va Y fazolar orasida o'zaro bir qizymatlari $f : X \rightarrow Y$ moslik o'matilgan bo'lib, ixtiyoriy $x_1, x_2 \in X$ elementlari uchun $\rho_1(x_1, x_2) = \rho_2(f(x_1), f(x_2))$ tengligi o'rini bo'lsa, u holda bu metrik fazolar o'zaro izometrik deb ataladi.

(X, ρ_1) va (Y, ρ_2) metrik fazolar berilganda, X va Y fazolar orasida yuqishuvchilikni saqlaydigan o'zaro bir qiymatli $f : X \rightarrow Y$ moslik o'matilgan bo'lsa (ya'ni $\rho_1(x_n, a) \rightarrow 0$ dan $\rho_2(f(x_n), f(a)) \rightarrow 0$ kelib

chicsa va aksincha), u holda bu metrik fazolar o'zaro *homeomorf* deyiladi.

X fazoda ρ_1 va ρ_2 metrikalar berilgan bo'lsin. Agar X fazoda ketma-ketlikning ρ_1 metrika bo'yicha yaqinlashishidan ρ_2 metrika bo'yicha yaqinlashishli va aksincha ρ_2 metrika bo'yicha yaqinlashishidan ρ_1 metrika bo'yicha yaqinlashishi kelib chisqa, u holda bu metrikalar o'zaro *ekvivalent* deb ataladi.

X metrik fazoda markazi a nuqtada, radiusi $r > 0$ bo'lgan $B(a, r)$ ochiq shar deb, $\rho(a, x) < r$ shartni qanoatlaniruchi barcha $x \in X$ elementlar to'plamiga aytildi. $B[a, r]$ yopiq shar $\rho(a, x) \leq r$ tengsizligi yordamida aniqlanadi. a muqtaning ε -atrofi deb $B(a, \varepsilon)$ ochiq sharga aytamiz.

X metrik fazoning biror E qism to'plani berilgan bo'lsin. Agar $x_0 \in X$ muqtaning ixtiyoriy atrofida E to'plamning kamida bir elementni mayjud bo'lsa, u holda x_0 nuqta E to'plamming *urinish* nuqtasi deb ataladi. E to'plamning barcha urinish nuqtalari to'plami E ning *yopilmasi* deb ataladi va $[E]$ ko'rinishda belgilanadi.

6. Sonlar o'qida (a, b) intervalning yopilmasi $[a, b]$ segmentdan iborat.

7. Ratsional sonlar to'plami \mathbb{Q} uchun $[\mathbb{Q}] = \mathbb{R}$ bo'ladi.

Agar $x_0 \in X$ nuqta o'zining biror atrofi bilan butunlay E to'plamga tegishli bo'lsa, u holda bu nuqta E ning *ichki nuqtasi* deb ataladi. E to'plamning barcha ichki nuqtajari to'plamning *ichi* deb ataladi va $\text{int}(E)$ ko'rinishda belgilanadi. Quyidagi munosabat o'rindir: $\text{int}(E) \subset E \subset [E]$.

Agar $x_0 \in X$ nuqtaning ixtiyoriy atrofida o'zidan, boshqa E to'plamning kamida bitta elementni mayjud bo'lsa, u holda bu nuqta E ning *limit* nuqtasi deb ataladi. E to'plamning barcha limit nuqtalari uning *hosila* to'plami deyiladi va E' orqali belgilanadi. E' ning hosila to'plamini E'' orqali belgilaymiz. Shunday qilib, E to'plamning yugori tartibili hosila to'plamlari aniqlanadi. (n -tartibili hosila to'plami $E^{(n)}$) ko'rinishda belgilanadi.

$x_0 \in E$ nuqtaning o'zidan tashqari E to'plamning birorta ham elementni bo'lmagan atrofi mayjud bolsa, u holda bu nuqta E ning *yakkalangan* nuqtasi deb ataladi.

Agar $x_0 \in X$ nuqtaning ixtiyoriy atrofida E to'plamga tegishli bo'lgan ham, tegishli bo'lmagan ham nuqtalar mayjud bo'lsa, u holda bu nuqta E to'plamning *chegaraviy* nuqtasi deb ataladi. E to'plamning barcha chegaraviy nuqtalari to'plami uning *chegarasi* deb ataladi va ∂E ko'rinishda belgilanadi.

Tarif. Agar $E = [E]$ tengligi o'rini bo'lsa, u holda E yopiq to'plum deyiladi.

Agar to'plam yopiq bo'lsa va yakkalangan nuqtaga ega bo'lmasa, u holda u *mukammal* deb ataladi.

Tarif. Agar $E = \text{int}(E)$ bo'lsa, u holda E o'chiq to'plum deyiladi.

O'chiq to'plamlarning quyidagi ayrim asosiy xossalarni keltiraniz:

- 1) chekli sondagi ochiq to'plamlarning kesishmasi ochiq to'plam bo'ladi;
- 2) ixtiyoriy sondagi ochiq to'plamlarning birlashmasi ochiq to'plam bo'ladi;

Yopiq va ochiq to'plamlar orasida, quyidagi bog'lanishlar mayjud:

- 1) ixtiyoriy ochiq to'plamning to'plamning yopiq to'plam bo'ladi;
- 2) ixtiyoriy yopiq to'plamning to'plamning yopiq to'plam bo'ladi.

Agar $E \subset X$ to'plamning har qanday nuqtasingning ixtiyoriy atrofida A to'planga tegishli nuqta topilsa, u holda E to'plami A to'plamda *zich* deb ataladi, ya'ni E to'plam A to'plamda zich bo'lishi uchun $A \subset [E]$ bo'lishi kerak. Agar $[E] = X$ bo'lsa, u holda E hamma yerdan *zich* deyiladi. Agar fazoning hamma yerdan zich sañoqli qism to'plami mayjud bo'lsa, u holda bu fazo *separabel* deb ataladi.

Agar X fazodagi ixtiyoriy ochiq shar $E \subset X$ to'plamga tegishli birorta ham elementni bo'lmagan boshqa bir ochiq sharni o'z ichiga oladigan bo'lsa, u holda E to'plam *hech bir yerdan zich emas* deb ataladi. E to'plamning hech bir yorda zich emasligi $\text{int}[E] = \emptyset$ tengligini anglatadi. Agar E to'plami sañoqlicha hech bir yerda zich emas to'plamlarning birlashmasida yotsa, u holda bu to'plam *birinchikategoriyali* to'plam deyiladi, ya'ni $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \text{int}[E_n] = \emptyset$. Birinchikategoriyali bo'lmagan to'plama *ikkinchikategoriyali* to'plam deyiladi. Ixtiyoriy bo'sh bo'lmagan ochiq to'plamostisi ikkinchi kategoriyali to'plam bo'lgan metrik fazoga *Ber fazosi* deyiladi.

Masalalar

3.1.1. Elementlari $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$ shartni qanoatlanitiruvchi haqiqiy sonlarning $x = \{x_n\}$ ketma-ketliklaridan iborat to'plamda masofani

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|$$

ko‘rinishda kirmsak, metrika aksiomalarining o‘rinli bo‘lishini tekshiring.

Yechimi. 1) $\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| = 0 \Leftrightarrow x_n - y_n = 0 (n = 1, 2, \dots) \Leftrightarrow x = y;$

$$2) \rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n - x_n| = \rho(y, x);$$

$$3) \rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - z_n + z_n - y_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n - z_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |z_n - y_n| = \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

Demak, metrikaning uch aksiomasi ham o‘rinli. Bu metrik fazo ℓ_1 orqali belgilanadi.

3.1.2. Elementlari $x = \{x_n\}$ ixtiyoriy cheksiz ketma-ketliklardan iborat bo‘lgan to‘plamda metrikani

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}$$

ko‘rinishda kiritish mumkinligini isbotlang.

Yechimi. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}$ qator yaqinlashuvchi, chunki n ning ixtiyoriy qiymatida

$$\frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|} < \frac{1}{2^n}$$

tengsizligi o‘rinli.

Uchburchak aksiomasini tekshirishdan avval, bir yordamchi tengsizlikni isbotlaymiz. Nomanfiy sonlar to‘plamida aniqlangan,

$$f(t) = \frac{t}{1+t}, \quad (f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0, \forall t > 0)$$

funksiya monoton o‘suvchi funksiya bo‘lgani uchun, $a \leq b$ bo‘lganda

$$\frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b}$$

tengsizligi o‘rinli bo‘ladi. Bundan ixtiyoriy $x = \{x_n\}$, $y = \{y_n\}$ va $z = \{z_n\}$ elementlari uchun $|x_n - y_n| \leq |x_n - z_n| + |z_n - y_n|$, ($n = 1, 2, \dots$) bo‘lganligidan,

$$\begin{aligned} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|} &\leq \frac{|x_n - z_n| + |z_n - y_n|}{1 + |x_n - z_n| + |z_n - y_n|} = \\ &= \frac{|x_n - z_n|}{1 + |x_n - z_n| + |z_n - y_n|} + \frac{|z_n - y_n|}{1 + |x_n - z_n| + |z_n - y_n|} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \frac{|x_n - z_n|}{1 + |x_n - z_n|} + \frac{|z_n - y_n|}{1 + |z_n - y_n|}$$

tengsizligiga ega bo'lamiz. Bu tengsizliklarni $\frac{1}{2^n}$ ga ko'paytirib, barcha n lar bo'yicha qo'shsak, uchburghak tengsizligiga ega bo'lamiz:

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

Bu metrik fazo s orqali belgilanadi.

3.1.3. Agar x va y haqiqiy sonlar orasida masofani $\rho(x, y) = \sin^2(x - y)$ ko'rinishda aniqlasak, u holda barcha haqiqiy sonlar to'plami metrik fazo bo'ladimi?

Yechimi. Aniqlangan masofa metrikaning birinchi shartini qanoatlantirmaydi. Haqiqatan, $x \neq y$ bo'lganda $\sin^2(x - y) = 0$ bo'lishi imumkin.

3.1.4. Agar haqiqiy sonlar orasida masofani $\rho(x, y) = |x - y|$ ko'rinishda aniqlasak, u holda bu oraliq metrika bo'ladimi?

Yechimi. Metrika bo'ladi. Haqiqatan,

- 1) $\rho(x, y) = |x - y| \geq 0$; $\rho(x, y) = |x - y| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = |x - y| = |-(y - x)| = |-1||y - x| = |y - x| = \rho(y, x)$;
- 3) $\rho(x, y) = |x - y| = |x - z + z - y| \leq |x - z| + |z - y| = \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

3.1.5. Agar haqiqiy sonlar orasidagi masofani $\rho(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ ko'rinishda aniqlasak, u holda bu masofa metrika bo'ladimi?

Yechimi. Metrika bo'ladi.

- 1) $\rho(x, y) = \sqrt{|x - y|} \geq 0$
 $\rho(x, y) = \sqrt{|x - y|} = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = \sqrt{|x - y|} = \sqrt{|y - x|} = \rho(y, x)$;
- 3) Ixtiyoriy musbat a va b haqiqiy sonlar uchun $\sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ tengsizligi o'rinali bo'lgani uchun

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &= \sqrt{|x - y|} = \sqrt{|x - z + z - y|} \leq \sqrt{|x - z| + |z - y|} \leq \\ &\leq \sqrt{|x - z|} + \sqrt{|z - y|} = \rho(x, z) + \rho(z, y). \end{aligned}$$

3.1.6. $[a, b]$ segmentda uzlucksiz bo'lgan barcha funksiyalar to'plamida masofani

$$\rho(\varphi, \psi) = \sqrt{\int_a^b (\varphi(t) - \psi(t))^2 dt}$$

ko'rinishda aniqlasak, u holda bu masofa metrika bo'ladimi?

Yechimi. Metrikarning 1) va 2) aksiomalari o'rini. 3) aksiomaning o'rini ekanligini ko'rsatishda Koshi — Bunyakovskiy tengsizligining integral shakli deb ataluvchi

$$\int_a^b \varphi(t)\psi(t) dt \leq \sqrt{\int_a^b (\varphi(t))^2 dt \int_a^b (\psi(t))^2 dt}$$

tengsizlikdan foydalamanamiz. Berilgan to'plamda ixtiyoriy φ, ψ funksiyalar uchun

$$\begin{aligned} \rho^2(\varphi, \psi) &= \int_a^b (\varphi(t) - \psi(t))^2 dt = \int_a^b (\varphi(t) - f(t) + f(t) - \psi(t))^2 dt = \\ &= \int_a^b (\varphi(t) - f(t))^2 dt + 2 \int_a^b (\varphi(t) - f(t))(f(t) - \psi(t)) dt + \int_a^b (f(t) - \psi(t))^2 dt \leq \\ &\leq \int_a^b (\varphi(t) - f(t))^2 dt + 2 \sqrt{\int_a^b (\varphi(t) - f(t))^2 dt \int_a^b (f(t) - \psi(t))^2 dt} + \\ &+ \int_a^b (f(t) - \psi(t))^2 dt = \left(\sqrt{\int_a^b (\varphi(t) - f(t))^2 dt} + \sqrt{\int_a^b (f(t) - \psi(t))^2 dt} \right)^2 = \\ &= (\rho(\varphi, f) + \rho(f, \psi))^2. \end{aligned}$$

Demak,

$$\rho(\varphi, \psi) \leq \rho(\varphi, f) + \rho(f, \psi).$$

3.1.7. $[a, b]$ segmentda uzluksiz bo'lgan funksiyalarning baracha juftliklaridan iborat $F[a, b]$ to'plamida (f_1, g_1) va (f_2, g_2) juftliklari orasida masofani

$$\rho((f_1, g_1)(f_2, g_2)) = \sup_{t \in [a, b]} (|f_1(t) - f_2(t)| + |g_1(t) - g_2(t)|)$$

ko'rinishda aniqlasak, u holda $F[a, b]$ metrik fazo bo'ladimi?

Yechimi. Metrikarning birinchi va ikkinchi aksiomalari o'rini. Uchinchi aksiomaning o'rini ekanligini ko'rsatamiz:

$$\rho((f_1, g_1), (f_2, g_2)) = \sup_{t \in [a, b]} (|f_1(t) - f_2(t)| + |g_1(t) - g_2(t)|) \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \sup_{t \in [a,b]} (|f_1(t) - f_3(t)| + |f_3(t) - f_2(t)| + |g_1(t) - g_3(t)| + |g_3(t) - g_2(t)|) \leq \\ &\leq \sup_{t \in [a,b]} (|f_1(t) - f_3(t)| + |g_1(t) - g_3(t)|) + \sup_{t \in [a,b]} (|f_3(t) - f_2(t)| + |g_3(t) - g_2(t)|) = \\ &= \rho((f_1, g_1), (f_3, g_3)) + \rho((f_3, g_3), (f_2, g_2)). \end{aligned}$$

3.1.8. *X metrik fazo to'la bo'lishi uchun, bu fazoda ixtiyoriy ichma-ich joylashgan va radiuslari nolga intiluvchi yopiq sharlar ketma-ketligi bo'sh bo'lмаган kesishmaga ega bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Zarurligi. *X* to'la metrik fazo va

$$B_1 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$$

ichma-ich joylashgan sharlar ketma-ketligi bo'lsin. B_n sharning radiusi va markazi mos ravishda r_n va a_n bo'lsin. $n \rightarrow \infty$ da $r_n \rightarrow 0$ bo'lib, $m > n$ bo'lganda $\rho(a_n, a_m) < r_n$ bo'lgani uchun $\{a_n\}$ ketma-ketlik fundamental, u holda X ning to'laligidan, uning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ bo'lsin, u holda $a \in [B_n]$. Shunday qilib, a har bir B_n sharning urinish nuqtasi bo'ladi. Bundan B_n yopiq shar bo'lganligi uchun $a \in B_n$ ($n = 1, 2, \dots$).

Yetarliligi. X da ixtiyoriy $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsin. U holda shunday n_1 nomer topilib, $n \geq n_1$ tengsizligini qanoatlantiruvchi barcha n lar uchun $\rho(x_n, x_{n_1}) < \frac{1}{2}$ tengsizligi o'rinni bo'ladi. Markazi x_{n_1} nuqtada bo'lib, radiusi 1 ga teng yopiq sharni olib, bu sharni B_1 orqali belgilaylik. Endi shunday n_2 nomerni $n \geq n_2$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha n lar uchun $\rho(x_n, x_{n_2}) < \frac{1}{2^2}$ tengsizlik o'rinnadanidan qilib tanlab olamiz. x_{n_2} nuqtani radiusi $1/2$ ga teng sharning markazi qilib olamiz va bu sharni B_2 orqali belgilaymiz. Shu jarayonni davom ettirsaq ichma-ich joylashgan B_k yopiq sharlar ketma-ketligiga ega bo'lamiz. Bunda B_k sharning radiusi $1/2^{k-1}$ ga teng bo'ldi. Bu sharlar ketma-ketligi shartga muvofiq umumiy nuqtaga ega. Uni x orqali belgilaylik. Ushbu x nuqta $\{x_{n_k}\}$ ketma-ketlikning limit nuqtasi bo'ladi. Agar fundamental ketma-ketlik x nuqtaga yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketlikka ega bo'lsa, u holda uning o'zi ham x ga yaqinlashadi.

3.1.9. X to'plamda metrikani

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \neq y, \\ 0, & \text{agar } x = y \end{cases}$$

ko'rinishda aniqlasak, u holda (X, ρ) to'la metrik fazo bo'ladimi?

Yechimi. X fazoda ixtiyoriy $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsin. U holda ixtiyoriy $0 < \varepsilon < 1$ soni uchun, shunday n_ε natural soni topilib, $n, m \geq n_\varepsilon$ tengsizligini qanoatlantiruvchi barcha natural sonlar uchun $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ tengsizligi o'rinni. Bundan berilgan ketma-ketlikning n_ε hadidan keyingi barcha hadlari o'zaro teng bo'ladi. Shuning uchun $\{x_n\}$ yaqinlashuvchi. Demak, (X, ρ) to'la metrik fazo.

3.1.10. ℓ_1 metrik fazoning to'la ekanligini isbotlang.

Yechimi. ℓ_1 fazoda $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsin, bunda $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots)$. Fundamental ketma-ketlikning ta'rifidan, $\forall \varepsilon > 0$ uchun n_ε natural soni topilib, $n, m \geq n_\varepsilon$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi n, m natural sonlari

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| < \varepsilon \quad (3.1)$$

tengsizlikni qanoatlantiradi. Ixtiyoriy j uchun

$$|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| < \varepsilon$$

bo'lgani uchun, har bir j da $\{x_j^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ sonli ketma-ketlik fundamental, ya'ni yaqinlashuvchi. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_j^{(n)} = a_j$ bo'lsim. $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \ell_1$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ekanligini ko'rsatamiz.

(3.1) tengsizlikdan ixtiyoriy k soni va $n, m \geq n_\varepsilon$ natural sonlari uchun

$$\sum_{i=1}^k |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| < \varepsilon$$

tengsizligining o'rinni ekanligi kelib chiqadi. Bu tengsizlikda dastlab $m \rightarrow \infty$ da, keyin $k \rightarrow \infty$ da limitga o'tib $n \geq n_\varepsilon$ bo'lganda

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)} - a_i| \leq \varepsilon \quad (3.2)$$

tengsizligiga ega bo'lamiz. $|a_i| \leq |x_i^{(n)} - a_i| + |x_i^{(n)}|$ bo'lgani uchun (3.2) tengsizlikdan va $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i^{(n)}|$ qatorning yaqinlashuvchiligidan $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|$ qatorning yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi, ya'ni $a \in \ell_1$. (3.2) tengsizlikdan $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ekanligi kelib chiqadi.

3.1.11. (Ber teoremasi). X to'la metrik fazoni hech qayerda zinch bo'lmagan to'plamlarning sanoqli sondagi birlashmasi ko'rinishda ifodalash mumkin emas. Isbotlang.

Yechimi. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$ bo'lsin, bunda har bir M_n hech qayerda zikh emas.

S_0 orqali radiusi 1 ga teng biror yopiq sharni belgilaylik. M_1 to'plami hech qayerda zikh bolmaganligidan, u S_0 to'plamida ham zikh emas. Shuning uchun radiusi $\frac{1}{2}$ dan kichik S_1 yopiq shar topilib, $S_1 \subset S_0$ va $S_1 \cap M_1 = \emptyset$ munosabatlar o'rinali boladi. M_2 to'plami S_1 to'plamida zikh bolmaganligidan S_1 to'plamning ichida yotuvchi radiusi $\frac{1}{3}$ dan kichik S_2 to'plami topilib, $S_2 \cap M_2 = \emptyset$ tengligi o'rinali boladi va hokazo. Ushbu jarayonni davom ettirsaq ichma-ich joylashgan va radiuslari $n \rightarrow \infty$ bo'lganda nolga intiluvchi $\{S_n\}$ yopiq sharlar ketma-ketligiga ega bo'lamiz. Bunda $S_n \cap M_n = \emptyset$ munosabati o'rinalidir. 3.1.8-misolda ko'rganimizdek $\bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$ kesishmaga qandaydir x nuqta tegishli bo'ladi.

Bu nuqta M_n to'plamlarning birortasiga tegishli emas. Demak, $x \notin \bigcup_n M_n$, ya'ni $X \neq \bigcup_n M_n$ ko'rinishdagi ziddiyatga kelamiz.

3.1.12. Metrik fazoda ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamning kesishmasi yopiq to'plam bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $F_{\alpha}, \alpha \in I$ (I indekslar to'plami) yopiq to'plam bo'lsin.

$$F = \bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$$

to'plamning yopiq ekanligini ko'rsataniiz.

Aytaylik, x nuqta F to'plamning urinish nuqtasi bo'lsin. U holda bu nuqtaning ixtiyoriy $B(x, \varepsilon)$ atrofida F to'plamning kamida bitta elementi mavjuddir. $F = \bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$ bo'lganligidan, $B(x, \varepsilon)$ sharda har bir F_{α} to'plamning ham kamida bitta elementi mavjuddir. Bundan x har bir F_{α} to'plamning urinish nuqtasi bo'ladi va F_{α} to'plamlar yopiq bo'lgani uchun $x \in F_{\alpha}$. Demak, $x \in F$, ya'ni F yopiq to'plam.

3.1.13. Metrik fazoda

$$\mathbf{C}(\text{int}(E)) = [\mathbf{CE}]$$

tengligi o'rinali ekanligini isbotlang.

Yechimi. Har bir $x \in \mathbf{C}(\text{int}(E))$ nuqta uchun $x \notin \text{int}(E)$ o'rinalidir. Bundan x elementning ixtiyoriy atrofi E to'plamida to'liq yotmasligi kelib chiqadi. U holda bu atroflarning har birida $\mathbf{C}(E)$ to'plamning kamida bitta elementi mavjud. Shuning uchun $x \in [\mathbf{C}(E)]$, ya'ni $\mathbf{C}(\text{int}(E)) \subset [\mathbf{CE}]$. $\text{int}(E) \subseteq E$ bo'lganligidan, $[\mathbf{CE}] \subseteq \mathbf{C}(\text{int}(E))$ munosabatning o'rinali ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\mathbf{C}(\text{int}(E)) = [\mathbf{CE}]$.

3.1.14. ℓ_2 metrik fazoning to'laligini isbotlang.

Yechimi. ℓ_2 fazodan olingan $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsin, bunda $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots)$.

Fundamental ketma-ketlikning ta'rifidan, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun shunday n_ε natural soni topilib, $n, m \geq n_\varepsilon$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi n, m natural sonlari uchun

$$\rho^2(x_n, x_m) = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon \quad (3.3)$$

tengsizlik o'rinni. Bundan har bir i soni uchun

$$|x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon,$$

bo'lganligidan, har bir i uchun $\{x_i^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ sonli ketma-ketlik fundamental. Bundan u yaqinlashuvchi bo'ladi. Bu ketma-ketlikning limitti a_i bilan belgilab, $a = (a_1, a_2, \dots, a_i, \dots)$ elementni hosil qilamiz. Agar $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < \infty$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$ munosabatlarning o'rnliligi ko'rsatilsa, ℓ_2 fazoning to'laligi isbot etilgan bo'ladi.

(3.3) tengsizlikni quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 = \sum_{k=1}^p |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 + \sum_{k=p+1}^{\infty} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon,$$

bu yerda p ixtiyoriy natural son. Bundan ixtiyoriy p uchun

$$\sum_{k=1}^p |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon,$$

yoki p bilan m ni tayinlab, n bo'yicha limitga o'tilsa, ushbu

$$\sum_{k=1}^p |a_k - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon$$

tengsizlik kelib chiqadi. Bu tengsizlik ixtiyoriy p uchun o'rinni; shuning uchun bunda p bo'yicha limitga o'tish mumkin, u holda

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k - x_k^{(m)}|^2 < \varepsilon. \quad (3.4)$$

Bundan va $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)}|^2 < \infty$ munosabatdan quyidagi tengsizlik kelib chiqadi:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 < \infty.$$

Demak, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in \ell_2$. So'ngra $\varepsilon > 0$ ixtiyoriy bo'lganligi uchun (3.4) dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$.

3.1.15. *m metrik fazoning to'laligini isbotlang.*

Yechimi. m fazodan olingan $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental bo'lsin, bunda $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots)$. $x_n \in m$ bo'lganligi tufayli shunday c_n ketma-ketligi mavjudki, uning uchun $|x_k^{(n)}| \leq c_n$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) o'rinali. Fundamental ketma-ketlikning ta'rifidan, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun n_ε natural soni topilib, $n, m \geq n_\varepsilon$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi n, m natural sonlari uchun

$$\rho(x_n, x_p) = \sup_k |x_k^{(n)} - x_k^{(p)}| < \varepsilon$$

tengsizlik o'rinali. Bundan

$$|x_k^{(n)} - x_k^{(p)}| < \varepsilon \quad (3.5)$$

munosabatning k ga misbatan tekis bajarilishi kelib chiqadi. Demak, ixtiyoriy k uchun $\{x_k^{(n)}\}$ sonli ketma-ketlik fundamental va yaqinlashuvchi. Bu ketma-ketlikning limitini a_k bilan belgilab, $a = (a_1, a_2, \dots, a_k, \dots)$ elementni hosil qillamiz. Endi ushbu $a \in m$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$ munosabatlarni isbotlaymiz.

(3.5) da p ga nisbatan limitga o'tilsa, barcha k lar uchun $n > n_\varepsilon$ bo'lganda o'rinali bo'lgan

$$|x_k^{(n)} - a_k| \leq \varepsilon \quad (3.6)$$

tengsizlik kelib chiqadi. Bundan

$$|a_k| \leq |x_k^{(n_\varepsilon+1)} - a_k| + |x_k^{(n_\varepsilon+1)}| < \varepsilon + c_{n_\varepsilon+1}$$

tengsizlikni barcha k lar uchun hosil qilish mumkm, ya'ni $a = (a_1, a_2, \dots, a_k, \dots) \in m$ munosabat kelib chiqadi. (3.5) dan $n \geq n_\varepsilon$ uchun

$$\rho(x_n, a) = \sup_k |x_{n_k} - a_k| < \varepsilon.$$

ε ixtiyoriy bo'lgani uchun, (3.6) dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$ munosabat kelib chiqadi.

3.1.16. Metrik fazoda ixtiyoriy yaqinlashuvchi ketma-ketlik fundamentalligini isbotlang.

Yechimi. Aytaylik, $\{x_n\}$ ketma-ketlik x nuqtaga yaqinlashsin. U holda ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun shunday n_ε natural soni topilib, barcha $n \geq n_\varepsilon$ uchun $\rho(x_n, x) < \varepsilon/2$ tengsizlik o'rini bo'ladi. Demak, $n, m \geq n_\varepsilon$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi n, m natural souлari uchun

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

munosabat o'rini. Bu esa $\{x_n\}$ ketma-ketlikning fundamentalligini ko'rsatadi.

3.1.17. X metrik fazoda ixtiyoriy M va N to'plamlar uchun

$$\text{int}(M \cap N) = \text{int}(M) \cap \text{int}(N)$$

munosabatning o'rini ekanligini isbotlang.

Yechimi. Ixtiyoriy $x \in \text{int}(M \cap N)$ nuqtani olaylik. U holda x nuqtaning $M \cap N$ to'plamda butunlay joylashgan $B(x, \varepsilon)$ atrofi mavjud, ya'ni $B(x, \varepsilon) \subset M \cap N$. Ravshanki $B(x, \varepsilon)$ atrof M va N to'plamlarning har birida butunlay joylashgan. Bundan $x \in \text{int}(M)$ va $x \in \text{int}(N)$, ya'ni $x \in \text{int}(M) \cap \text{int}(N)$. Demak, $\text{int}(M \cap N) \subset \text{int}(M) \cap \text{int}(N)$.

Agar $x \in \text{int}(M) \cap \text{int}(N)$ bo'lsa, u holda $x \in \text{int}(M)$ va $x \in \text{int}(N)$, ya'ni x nuqtaning M to'plamda butunlay joylashgan $B(x, \varepsilon_1)$ va N to'plamda butunlay joylashgan $B(x, \varepsilon_2)$ atroflari mavjud. Endi ε sonini $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ kabi olsak, u holda x nuqtaning $B(x, \varepsilon)$ atrofi $M \cap N$ to'plamda butunlay joylashgan bo'ladi, ya'ni $x \in \text{int}(M \cap N)$. Demak, $\text{int}(M) \cap \text{int}(N) \subset \text{int}(M \cap N)$.

3.1.18. ℓ_1 metrik fazodan olingan $x_n = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots)$ ketma-ketlik va $a = (a_1, a_2, \dots, a_k, \dots)$ element uchun $a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ bo'lsa, har doim $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$ munosabat o'rini limi?

Yechimi. Har doim o'rini emas. Misol uchun,

$$a = (0, 0, 0, \dots)$$

va

$$x_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^k}, \dots)$$

bo'lsa, u holda $n > k$ soni uchun $|x_k^{(n)} - a_k| = 0$. Bundan ixtiyoriy k uchun $a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ munosabat kelib chiqadi. Ammo ixtiyoriy n uchun

$$\rho(x_n, a) = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k^{(n)} - 0| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1,$$

ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$ munosabat o'rini emas.

3.1.19. Quyidagi tasdiqlar teng kuchlidir:

- (1) X Ber fazosi;
- (2) X ning sanoqli birinchi kategoriyali to'plamlari birlashmasi ichki nuqtaga ega emas;
- (3) X ning ochiq zinch to'plamlari sanoqli kesishmasi zinch;
- (4) X da birinchi kategoriyali to'plamning to'ldiruvchisi zichdir.

Yechimi. (1) \Rightarrow (2) Aytaylik, $E = \bigcup_n E_n$, bunda $E_n = [E_n]$, $\text{int } E_n = \emptyset$ bo'lsin. U holda E birinchi kategoriyali to'plamdir. Bundan $\text{int } E \subset E$, $\text{int } E$ ochiq va birinchi kategoriyali to'plamdir. X Ber fazosi bo'lganligidan, $\text{int } E$ bo'sh to'plamdir.

(2) \Rightarrow (3) Aytaylik, $E = \bigcap_n G_n$, bunda G_n ochiq to'plam va $[G_n] = X$ bo'lsim. U holda

$$X \setminus E = X \setminus \bigcap_n G_n = \bigcup_n (X \setminus G_n).$$

Shu bilan birga, $X \setminus G_n$ yopiq to'plam va $\text{int}(X \setminus G_n) = \emptyset$, chunki $[G_n] = X$. Bundan $\text{int}(X \setminus E) = \emptyset$. Oxirgi tenglik E to'plam to'ldiruvchisi ichi bo'sh to'plam, ya'ni E zinch to'plam ekanligini ko'rsatadi.

(3) \Rightarrow (4) Aytaylik, E birinchi kategoriyali to'plam bo'lsin, ya'ni $E = \bigcup_n E_n$, bunda $\text{int}[E_n] = \emptyset$. $E_n = [E_n]$ deb hisoblashimiz mumkin. U holda $G_n = X \setminus E_n$ ochiq va zinch to'plamdir. Shartga ko'ra

$$\bigcap_n G_n = \bigcup_n (X \setminus E_n)$$

zinch to'plamdir. Endi

$$X \setminus E = X \setminus \bigcup_n E_n = \bigcap_n X \setminus E_n = \bigcap_n G_n$$

ekanligidan, $X \setminus E$ ham zinch to'plamdir.

(4) \Rightarrow (1) Agar E to'plami ochiq va X da zinch bo'lsa, u holda $X \setminus E$ zinch to'plam emas. Bundan shartga ko'ra E ikkinchi kategoriyali to'plam bo'la olmaydi, Demak, E birinchi kategoriyali to'plam.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Haqiqiy sonlar to'plamida metrikani $\rho(x, y) = \text{arctg}|x - y|$ ko'rinishida aniqlash mumkinligini ko'rsating.

2. Ixtiyoriy to'plamda metrikani

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x = y, \\ 1, & \text{agar } x \neq y \end{cases}$$

ko'rinishda aniqlash mumkin ekanligini isbotlang.

3. Faraz qilaylik (X, ρ) metrik fazo bo'lsin. Agar $\forall x, y \in X$ uchun

$$\rho_1(x, y) = \rho(x, y) / [1 + \rho(x, y)],$$

$$\rho_2(x, y) = \ln[1 + \rho(x, y)]$$

bo'lsa, u holda (X, ρ_1) va (X, ρ_2) metrik fazolar ekanligini ko'rsating.

4. n sondagi haqiqiy sonlarning $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ tartiblangan guruuhlari to'plamida metrikani

$$a) \rho(x, y) = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|;$$

$$b) \rho(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |y_k - x_k|$$

ko'rinishlarda kiritishga bo'lishini ko'rsating.

5. Haqiqiy sonlarning $x = (x_1, x_2, \dots, x_n \dots)$ chegaralangan ketma-ketliklari to'plamida masofani $\rho(x, y) = \sup |y_k - x_k|$ ko'rinishda kritisak, bu to'plamning metrik fazo bo'lishini ko'rsating.

6. Agar $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$ bo'lsa, $\rho(x_n, y_n) \rightarrow \rho(x, y)$ ekanligini isbotlang.

7. Natural sonlar to'plamida metrikani quyidagicha aniqlaylik:

$$\rho(m, n) = \frac{|m - n|}{mn}, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

(\mathbb{N}, ρ) to'la bo'limgan metrik fazo ekanligini isbotlang.

8. Agar haqiqiy sonlar to'plami \mathbb{R} da x, y sonlari orasidagi masofani $\rho(x, y) = |x^3 - y^3|$ formulasi orqali kritisak, u holda u to'la metrik fazo tashkil qilishini isbotlang.

9. X to'plamda o'zaro ekvivalent bo'lgan ρ_1 va ρ_2 metrikalar berilgan. (X, ρ_1) fazoning to'la bo'lishidan (X, ρ_2) fazoning to'la bo'lishi kelib chiqadimi?

10. $[a, b]$ segmentda uzluksiz hosilaga ega bo'lgan barcha funksiyalar to'plamida metrikani

$$\rho(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f'(t) - g'(t)|$$

ko'rinishda kiritish mumkini?

11. Tengliklarni isbotlang:

- a) $\partial E = [E] \setminus \text{int}(E)$;
 b) $[[E]] = [E]$;
 c) $[E_1 \cup E_2] = [E_1] \cup [E_2]$.

12. Tekislikda chegaraviy nuqtalarga ega bo'lмаган тo'plamiga misol keltiring.

13. Ixtiyoriy тo'plamning hosila тo'plami yopiq тo'plam bo'lishini isbotlang.

14. Ixtiyoriy тo'plamning chegarasi yopiq тo'plam bo'lishini ko'rsating.

15. Ixtiyoriy тo'plamning ichi ochiq тo'plam bo'lishini ko'rsating.

16. Barcha nuqtalari yakkalangan sanoqsiz тo'plamga misol keltiring.

17. \mathbb{R} , \mathbb{R}^n , $C[a, b]$, ℓ_2 fazolarning separabel fazo bo'lishini ko'rsating.

18. m fazosining separabel fazo emasligini isbotlang.

19. \mathbb{R} , \mathbb{R}^n , $C[a, b]$ fazolarning to'laligini isbotlang.

20. To'la X fazoda zikh bo'lgan ochiq тo'plamlarning sanoqli sondagi kesishmasi X тo'plamda zikh to'plam bo'lishini isbotlang.

21. Hech qayerda zikh emas тo'plamning yopilmasi ham hech qayerda zikh emas тo'plam bo'lishini isbotlang.

22. Barcha ko'phadlar тo'plamining $C[0, 1]$ da zikh ekanligini ko'rsating.

3.2. Metrik fazolarda kompakt тo'plamlar

X metrik fazodagi K тo'plamning elementlaridan tuzilgan ixtiyoriy ketma-ketlikdan biror $x \in X$ elementiga yaqinlashuvchi qism ketma-ketlik ajratib olish mumkin bo'lsa, K тo'plam X da *nisbiy kompakt* deyiladi.

X metrik fazodagi yopiq nisbiy kompakt bo'lgan K тo'plam *kompakt* deyiladi. X metrik fazodagi K тo'plamning *diametri*

$$\text{diam } K = \sup_{x, y \in K} \rho(x, y)$$

chekli son bo'lsa, u holda K chegaralangan deb ataladi.

K va M тo'plamlar (X, ρ) metrik fazodan olingan va $\varepsilon > 0$ biror son bo'lsin. Agar K тo'plamdan olingan ixtiyoriy x element uchun M тo'plamda $\rho(x, y) < \varepsilon$ tengsizligini qanoatlantiruvchi y elementi mavjud bo'lsa, u holda M тo'plam K тo'plamiga nisbatan ε -to'r deb ataladi. Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun K тo'plam chekli ε -to'rga ega bo'lsa, u holda K тo'liq chegaralangan deyiladi.

Masalalar

3.2.1. *Har bir K kompakt metrik fazo to'liq chegaralangan bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. Faraz qilaylik K to'liq chegaralangan bo'lmasin. Bundan K da biror $\varepsilon > 0$ uchun chekli ε -to'r topilmasligi kelib chiqadi. K dan ixtiyoriy a_1 nuqta olamiz. U holda shunday $a_2 \in K$ nuqta topiladiki, $\rho(a_1, a_2) > \varepsilon$ bo'ladi, aks holda $\{a_1\}$ to'plam ε -to'r bo'lardi. K da shunday a_3 nuqta topiladiki,

$$\rho(a_1, a_3) > \varepsilon, \quad \rho(a_2, a_3) > \varepsilon$$

bo'ladi, aks holda $\{a_1, a_2\}$ to'plam ε -to'r bo'lardi.

Shunga o'xshash a_1, a_2, \dots, a_k nuqtalar uchun $a_{k+1} \in K$ topilib, $\rho(a_i, a_{k+1}) > \varepsilon$, $i = 1, k$ bo'ladi.

Bu tanlab olingan nuqtalar limit nuqtaga ega bo'lмаган $\{a_n\}$ cheksiz ketma-ketlikni beradi, chunki $\rho(a_i, a_j) > \varepsilon$, $i \neq j$. Bu esa K ning kompakt ekanligiga zid.

3.2.2. *Ixtiyoriy kompakt to'plamning to'la fazo bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. Bizga E kompakt to'plamda $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lzin. E kompakt bo'lgani uchun $\{x_n\}$ ketma-ketlik E da yaqinlashuvchi $\{x_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketlikka ega. $\{x_{n_k}\}$ ketma-ketlikning limitini a bilan belgilaylik. $\{x_n\}$ fundamental va $\{x_{n_k}\}$ yaqinlashuvchi bo'lgani uchun ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun $\exists n_\varepsilon$ soni topilib, $n, k > n_\varepsilon$ (Demak, $n_k > n_\varepsilon$) bo'lganda $\rho(x_n, x_{n_k}) < \frac{\varepsilon}{2}$ va $\rho(x_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2}$ tengsizliklari bajariladi. Natijada

$$\rho(x_n, a) \leq \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Bundan $\{x_n\}$ ketma-ketlikning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqib, E to'plamning to'la ekanligini ko'rsatadi.

3.2.3. (*Hausdorff teoremasi*). *R metrik fazo kompakt bo'lishi uchun uning to'la va to'liq chegaralangan bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Aytaylik, R kompakt bo'lzin. U holda to'liq chegaralanganlikning zaruriyligi 3.2.1-misoldan kelib chiqadi. To'la bo'lishi esa 3.2.2-misoldan ko'rindisi.

Endi R to'la va to'liq chegaralangan bo'lzin. Kompaktligini ko'rsatish uchun har bir $\{x_n\} \subset R$ ketma-ketlik hech bo'lмагanda bitta limit nuqtaga ega bo'lishini ko'rsatish yetarli.

R da 1-to'r hosil etuvchi nuqtalarning har biri atrofida radiusi 1 bo'lgan yopiq shar quramiz. Bu sharlar R ni to'liq qoplaydi hamda ularning soni chekli boladi, u holda ularning hech bo'limganda bittasi $\{x_n\}$ ning biror $x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}, \dots$ qismiy ketma-ketligini o'z ichiga oladi. Bu sharni B_1 orqali belgilaymiz.

B_1 sharda ham $\frac{1}{2}$ -to'r hosil etuvchi nuqtalar atrofida radiusi $\frac{1}{2}$ bo'lgan yopiq sharlarni qursak, ularning hech bo'limganda bittasi $\{x_n^{(1)}\}$ ketma-ketlikning $\{x_n^{(2)}\}$ qismiy ketma-ketligini o'z ichiga oladi. Bu sharni B_2 orqali belgilaymiz. Shu kabi markazi B_2 da radiusi $\frac{1}{4}$ bo'lib, $\{x_n^{(3)}\} \subset \{x_n^{(2)}\}$ ketma-ketlikni o'z ichiga oluvchi B_3 sharini olamiz va hokazo.

Endi markazi B_n sharning markazida, radiusi esa ikki marta katta bo'lgan A_n yopiq sharlarni qaraymiz. Ravshanki A_n sharlar ichma-ich joylashgan. R ning to'laligidan $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ kesishma bo'sh emas va u yagona x_0 nuqtadan iborat. Bu nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlik uchun limit nuqta bo'ladi, hamda uning atrofi biror B_k sharni o'z ichiga oladi, ya'ni $\{x_n\}$ ketma-ketlikning cheksiz $\{x_n^{(k)}\}$ qismiy ketma-ketligini o'z ichiga oladi. Bundan R kompaktdir.

3.2.4. Ixtiyoriy nisbiy kompakt to'plam chegaralangan bo'lishini isbotlang.

Yechimi. Agar $\text{diam } K = +\infty$ bo'lsa, u holda $\forall x_0 \in K$ nuqta uchun

$$\sup_{x \in K} \rho(x_0, x) = +\infty$$

bo'ladi. Haqiqatan, agar $\forall x \in K$ uchun $\rho(x_0, x) \leq M$ bo'lsa, u holda $\forall x, y \in K$ nuqtalari uchun

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, y) \leq 2M$$

tengsizlik o'rimli bo'lardi. Demak, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_0, x_n) = +\infty$ bo'ladigan $\{x_n\}$ ketma-ketligini topish mumkin. Natijada $\{x_n\}$ ketma-ketlikning ixtiyoriy $\{x_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketligi uchun ham $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_0, x_{n_k}) = +\infty$ bo'ladi. U holda $\{x_{n_k}\}$ fundamental bo'lmaydi, Demak, yaqinlashuvchi emas. Bundan K ning nisbiy kompakt emas ekanligi kelib chiqadi. Hosil bo'lgan ziddiyatdan K ning chegaralangan ekanligi kelib chiqadi.

3.2.5. To'plamning chegaralanganligidan, uning nisbiy kompakt bo'lishi kelib chiqadimi?

Yechimi. Umuman aytganda kelib chiqmaydi. Masalan ℓ_2 fazoda quyidagi

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots), \quad e_3 = (0, 0, 1, \dots), \dots$$

elementlardan iborat chegaralangan to'plamni olaylik. Bu to'plamning ixtiyoriy e_n va e_m elementlari orasidagi masofa $\rho(e_m, e_n) = \sqrt{2}$ ($m \neq n$). Demak, bu ketma-ketlikning ixtiyoriy qismiy ketma-ketligi yaqinlashuvchi emas. Shuning uchun qaralayotgan to'plam nisbiy kompakt emas.

3.2.6 *X metrik fazoda bo'sh emas $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$ kompakt to'plamlari berilgan bo'lsin. U holda $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ kesishmasi bo'sh emasligini, Shu bilan birga, agar $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam} A_n = 0$ bo'lsa, u holda $\bigcap_{n \geq 1} A_n$ kesishmaning yagona nuqtadan iborat bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. Har bir A_n to'plamdan a_n muqtasini olaylik. Bu nuqta-larning barchasi A_1 ga tegishli bo'ladi. A_1 kompakt to'plam bo'lgani uchun $\{a_n\}$ ketma-ketlikdan biror $a \in A_1$ nuqtaga yaqinlashuvchi $\{a_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketligini ajratib olish mumkin. $\{a_{n_k}\}$ ketma-ketlikning dastlabki $k - 1$ ta hadini olib tashlasak, $a_{n_k}, a_{n_{k+1}}, a_{n_{k+2}}, \dots$ ketma-ketligiga ega bo'lamiz. Bu ketma-ketlikning har bir hadi A_{n_k} to'plamga tegishli. Shu bilan birga, bu ketma-ketlik ham a nuqtaga yaqinlashuvchi bo'ladi. A_{n_k} yopiq bo'lgani uchun ixtiyoriy k uchun $a \in A_{n_k}$, Demak, $a \in \bigcap_{k \geq 1} A_{n_k} = \bigcap_{n \geq 1} A_n$. Natijada $\bigcap_{n \geq 1} A_n \neq 0$.

Agar $\text{diam} A_n \rightarrow 0$ bo'lsa, u holda har qanday boshqa $b \in \bigcap_{n \geq 1} A_n$ nuqtani olsak $\rho(a, b) \leq \text{diam} A_n$ tengsizligi barcha n lar uchun o'rini. Shuning uchun ham $\rho(a, b) = 0$, ya'ni $a = b$.

3.2.7. *$C[0, 1]$ fazoga tegishli, $|f(x)| \leq A$ (bu yerda A tayinlangan musbat son) tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha funksiyalar to'plamini E bilan belgilaylik. $C[0, 1]$ fazoda chegaralangan va yopiq bo'lgan E to'plami kompakt emasligini isbotlang.*

Yechimi. $C[0, 1]$ to'plamga tegishli

$$f_n(x) = A \sin 2^n \pi x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

funksiyalar ketma-ketligini olaylik. Bu ketma-ketlikning har bir hadi E to'plamga tegishli. Haqiqatan,

$$|f_n(x)| = |A \sin 2^n \pi x| = A |\sin 2^n \pi x| \leq A.$$

Bu ketma-ketlikning ixtiyoriy f_n va f_m (bu yerda $n < m$) hadlari orasidagi oraliqni baholaymiz:

$$\rho(f_n, f_m) = \max_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f_m(x)| \geq \left| f_n \left(\frac{1}{2^{n+1}} \right) - f_m \left(\frac{1}{2^{n+1}} \right) \right| =$$

$$= |A \sin \frac{\pi}{2} - A \sin 2^{m-n-1}\pi| = A,$$

ya'ni $\rho(f_n, f_m) \geq A$. Bu tengsizlikdan ko'rinadiki, qaralayotgan ketma-ketlikning ixtiyoriy qismiy ketma-ketligi yaqinlashuvchi bo'la olmaydi. Shuning uchun E to'plam $C[0, 1]$ fazoda kompakt emas.

3.2.8. ℓ_2 fazosida yopiq va chegaralangan, ammo kompakt bo'lмаган to'plamga misol keltiring.

Yechimi. ℓ_2 fazosiga tegishli

$$e_1 = (1, 0, 0, 0, \dots, 0, \dots)$$

$$e_2 = (0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$$

$$e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$$

.....

nuqtalardan iborat sanoqli E to'plamni olaylik. Bu to'plam chegaralangan va yopiq. Shu bilan birga, bu to'plamning ixtiyoriy har xil nuqtalari orasidagi masofa $\sqrt{2}$ ga teng. Shuning uchun $\{e_n\}$ ketma-ketlikning birorta ham qismiy ketma-ketligi fundamental bo'la olmaydi. Fundamental bo'lмаган ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lmaydi. Shuning uchun E to'plam kompakt emas.

3.2.9. Kompakt to'plamlarning chekli sondagi birlashmasi kompakt to'plam bo'lishini isbotlang.

Yechimi. Bizga A_1, A_2, \dots, A_k kompakt to'plamlar berilgan bo'lsin.

Hadlari $A = \bigcup_{i=1}^k A_i$ to'plamidan olingan ixtiyoriy $\{x_n\}$ ketma-ketligini qaraymiz. Bu ketma-ketlik hadlari soni cheksiz bo'lgani uchun A_1, A_2, \dots, A_k to'plamlarning kamida bittasi uning cheksiz sondagi hadlaridan iborat $\{x_{n_p}\}$ qismiy ketma-ketligini o'z ichiga oladi. U holda $\{x_{n_p}\}$ ketma-ketlik A to'plamda yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketlikka ega. Bu qism ketma-ketlik $\{x_n\}$ ketma-ketligi uchun ham qismiy bo'ladi. Bundan $\bigcup_{i=1}^k A_i$ to'plamning kompaktligi kehb chiqadi.

3.2.10. (Boltsano — Veyershtrass teoremasi). \mathbb{R}^n evklid fazosida ixtiyoriy chegaralangan to'plam nisbiy kompakt bo'lishini isbotlang.

Yechimi. E chegaralangan to'plam bo'lsa, u holda bu to'plam biror

$$[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

parallelepipedning ichida yotadi. Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ sonini olib har bir $[a_i, b_i]$ segmentni $a_i = x_i^{(1)} < x_i^{(2)} < \dots < x_i^{(p_i-1)} < x_i^{(p_i)} = b_i$ nuqtalar

yordamida shunday bo'laklarga bo'laylikki, natijada ikki qo'shni muqtalar orasidagi masofa $\frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$ sonidan kichik bo'lsin. \mathbb{R}^n fazoda quyidagi to'plamni olamiz:

$$M = \{x = (x_1^{(s_1)}, x_2^{(s_2)}, \dots, x_n^{(s_n)}): s_1 = 1, 2, \dots, p_1; \dots, s_n = 1, 2, \dots, p_n\}$$

bu yerda s_k ($k = 1, 2, \dots, n$) lar bir-biriga bog'liq emas. Shu to'plamning E to'plam uchun chekli ε -to'r bo'lishini ko'rsatamiz. E to'plamdan ixtiyoriy $x' = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ nuqta olaylik. E to'plam

$$[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

parallelepipedda joylashganligi uchun x' nuqta

$$[x_1^{(k_1)}, x_1^{(k_1+1)}] \times [x_2^{(k_2)}, x_2^{(k_2+1)}] \times \dots \times [x_n^{(k_n)}, x_n^{(k_n+1)}]$$

parallelepipedlarning biriga tegishli bo'ladi, bu yerda $k_j \in \{1, 2, \dots, p_j - 1\}$, $j = \overline{1, n}$. Bu parallelepipedlarning uchlari M to'plamning elementlaridan iborat bo'ladi. Shuning uchun s_k ($k = \overline{1, n}$) nomerlar ichidan s_k^0 ($k = \overline{1, n}$) nomerlar topilib,

$$\rho(x, x') = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^{s_k^0} - x_k)^2} < \sqrt{\underbrace{\frac{\varepsilon^2}{n} + \frac{\varepsilon^2}{n} + \dots + \frac{\varepsilon^2}{n}}_n} = \varepsilon$$

tengsizligi o'rini bo'ladi. Demak, M to'plam E uchun ε -to'r bo'ladi. U holda E to'liq chegaralangan. Natijada \mathbb{R}^n fazoning to'laligi va Xaus-dorf teoremasi bo'yicha E to'plam nisbiy kompakt bo'ladi.

3.2.11. \mathbb{R}^n evklid fazosida ixtiyoriy yopiq chegaralangan to'plam kompakt bo'lishini isbotlang.

Yechimi. Yuqorida isbotlangan Boltsano — Veyershtrass teoremasi bo'yicha \mathbb{R}^n evklid fazosida chegaralangan to'plam nisbiy kompakt bo'ladi. Nisbiy kompakt va yopiq bo'lgan to'plam ta'rif bo'yicha kompakt bo'ladi.

3.2.12. K kompakt to'plamni o'ziga o'tkazuvchi $f: K \rightarrow K$ akslantirish ixtiyoriy o'zaro teng bo'limgan $x, y \in K$ elementlar uchun $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ tengsizlikni qanoatlantirilsin. U holda $f(x) = x$ tenglikni qanoatlantiruvchi $x \in K$ elementning mavjudligini isbotlang.

Yechimi. $F(x) = \rho(x, f(x))$ ko'rinishda aniqlanuvchi $F: K \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyani olaylik. $x \in K$ element $f(x) = x$ tengligini qanotlantirishi uchun $F(x) = 0$ tengligining bajarilishi zarur va yetarli. Aksimcha faraz qilaylik, ya'ni $F(x) > 0$ bo'lsin. K to'plam kompakt bo'lgani uchun

$F(x)$ funksiyaning aniq quyisi chegarasi musbat son bo'lib, unga biror $x_0 \in K$ nuqtada erishadi. Masalaning sharti bo'yicha quyidagi munosabat o'rinni: $F(f(x_0)) = \rho(f(x_0), f(f(x_0))) < \rho(x_0, f(x_0)) = F(x_0)$. Bu ziddiyat bizning farazimizning noto'g'ri ekanligini anglatadi. U holda $f(x) = x$ tenglikni qanoatlantiruvchi $x \in K$ nuqta mavjud.

3.2.13. Kompakt metrik fazoni metrik fazoga uzlucksiz akslantirish tekis uzlucksiz bo'lishini isbotlang.

Yechimi. K metrik kompakt, M metrik fazo bo'lib, $F : K \rightarrow M$ akslantirishi uzlucksiz, lekin tekis uzlucksiz emas deb faraz qilaylik. U holda biror $\varepsilon > 0$ soni va har bir $n \in \mathbb{N}$ soni uchun K da x_n va x'_n nuqtalari topilib, $\rho_1(x_n, x'_n) < \frac{1}{n}$ va $\rho_2(F(x_n), F(x'_n)) \geq \varepsilon$ tengsizligi o'rinnlidir, bunda $\rho_1 - K$ da oraliq, $\rho_2 - M$ da oraliq. K ning kompaktligidan $\{x_n\}$ ketma-ketligidan biror $x \in K$ nuqtaga yaqinlashuvchi $\{x_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketligini olamiz. U holda $\{x'_{n_k}\}$ ketma-ketligi ham x ga yaqinlashadi, lekin har bir k uchun quyidagi tengsizliklarning biri bajariladi

$$\rho_2(F(x), F(x_{n_k})) \geq \varepsilon, \quad \rho_2(F(x), F(x'_{n_k})) \geq \varepsilon,$$

bu esa F akslantirishning x nuqtada uzlucksizligiga ziddir.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Agar E to'plam to'liq chegaralangan bo'lsa, u holda $[E]$ to'plami ham to'liq chegaralangan bo'lishini isbotlang.

2. Tekislikda koordinatalari butun sonlardan iborat nuqtalar to'plami qanday to'r hosil qiladi.

3. \mathbb{R}^n fazoda har qanday chegaralangan to'plam to'liq chegaralangan bo'lishini isbotlang.

4. ℓ_2 fazosidan olingan, quyida keltirilgan to'plamning to'liq chegaralanganligini isbotlang.

$$A = \{x = (a_1, a_2, \dots) : |a_1| \leq 1, |a_2| \leq \frac{1}{2}, \dots, |a_n| \leq \frac{1}{2^n}, \dots\}.$$

5. Agar X metrik fazo sanoqli-kompakt bo'lsa, u holda u to'liq chegaralangan bo'lishini isbotlang.

6. $[0, 1]$ segmentda joylashgan barcha ratsional sonlar to'plami to'liq chegaralangan bo'lib, kompakt emasligini isbotlang.

7. Kompakt to'plamning ixtiyoriy yopiq qisim to'plami kompakt ekanligini isbotlang.

8. X metrik fazoda nisbiy kompakt A va B to'plamlar berilgan bo'lsin. $\rho(x, y)$ sonlar (bunda $x \in A, y \in B$) chegaralangan sonli to'plam bo'lishini isbotlang.

9. Sanoqli sondagi kompaktlarning birlashmasi kompakt bo'ladimi?

10. Chekli sondagi nisbiy kompaktlarning birlashmasi nisbiy kompakt bo'lishini isbotlang.

11. Ixtiyoriy sondagi kompaktlarning kesishmasi kompakt bo'lishini isbotlang.

12. Ixtiyoriy sondagi nisbiy kompaktlarning kesishmasi nisbiy kompakt bo'lishini isbotlang.

13. Ixtiyoriy kompakt to'liq fazo bo'lishini isbotlang.

14. \mathbb{R}^n evklid fazosida ixtiyoriy yopiq chegaralangan to'plam kompakt bo'lishini isbotlang.

15. ℓ_2 fazodagi ixtiyoriy nisbiy kompakt to'plam shu fazoning hech qayerida zinch emasligini isbotlang.

16. ℓ_2 fazodagi ixtiyoriy nisbiy kompakt to'plam shu fazoning hech qayerida zinch emasligini isbotlang.

17. Sanoqli kompakt

$$E = \left\{ 0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

to'plami berilgan. Bu to'plamni

$$(1-\varepsilon, 1+\varepsilon), \left(\frac{1-\varepsilon}{2}, \frac{1+\varepsilon}{2} \right), \left(\frac{1-\varepsilon}{4}, \frac{1+\varepsilon}{4} \right), \dots, \left(\frac{1-\varepsilon}{2^n}, \frac{1+\varepsilon}{2^n} \right), \dots$$

va $(-\varepsilon, \varepsilon)$ intervallar sistemasi qoplaydi (bu yerda $0 < \varepsilon < 1$). Bu sistemadan E ni qoplaydigan chekli sistema ajrating.

3.3. Qisqartirib akslantirish prinsipi va uning tatlqlari

A akslantirish X metrik fazoni o'ziga o'tkazsin: $A : X \rightarrow X$. Agar $Ax_0 = x_0$ tengligi o'rinali bo'lsa, u holda x_0 muqta A akslantirishning $qo'zg'almas$ nuqtasi deb ataladi.

Ta'rif. (X, ρ) metrik fazo va $A : X \rightarrow X$ biror akslantirish bo'lsin.

Agar shunday α , $0 < \alpha < 1$ soni mavjud bo'lib, ixtiyoriy $x, y \in X$ nuqtalar uchun

$$\rho(Ax, Ay) \leq \alpha \rho(x, y) \quad (3.7)$$

tengsizligini bajarilsa, u holda A akslantirishni qisqartirib akslantirish deyiladi.

Masalalar

3.3.1. (*Qisqartirib akslantirish prinsipi*). X to'la metrik fazoning har bir A qisqartirib akslantirishi yagona $qo'zg'almas$ nuqtaga ega.

Yechimi. X metrik fazodan ixтиориy u_0 muqtani olib, quyidagi isbotlang.

$$u_1 = Au_0,$$

$$u_2 = Au_1 = A^2u_0,$$

$$u_3 = Au_2 = A^3u_0,$$

$$\dots$$

$$u_k = Au_{k-1} = A^ku_0,$$

$$\dots$$

$$u_n = Au_{n-1} = A^nu_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+1} = Au_n = A^{n+1}u_0,$$

$$\dots$$

$$u_{n+p} = Au_{n+p-1} = A^{n+p}u_0,$$

$$\dots$$

$$\rho(u, v) = \rho(Au, Av) \leq \alpha \rho(u, v)$$

ya'ni

$$\rho(u, v)(1 - \alpha) \leq 0.$$

Bu tengsizlikdan $\rho(u, v) = 0$ ekanligi kelib chiqadi, ya'ni $u = v$.

3.3.2. *f(x) sonlar o'qida aniqlangan funksiya bo'lib, har bir $x \in \mathbb{R}$ nuqtada hosilaga ega va $|f'(x)| \leq k$ tengsizligi o'rinni bo'lsin (bunda k birdan kichik tayinlangan son). U holda $x = f(x)$ tenglama yagona yechimga ega ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. Matematik analiz kursidagi Lagranj teoremasiga asosan har bir $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ nuqtalar uchun

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(c)(x_1 - x_2)$$

tenglikni qanoatlantirivchi $c \in (x_1, x_2)$ soni mavjud bo'ladi. U holda $|f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|$ tengsizligi o'rinni, $0 < k < 1$ bo'lgani uchun f qisqartirib akslantirish bo'ladi. U holda qisqartirib akslantirish prinsipiga asosan $x = f(x)$ tenglama yagona yechimga ega.

3.3.3.

$$y(x_0) = y_0 \quad (3.8)$$

boshlang'ich shart bilan

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (3.9)$$

differensial tenglama berilgan. Tenglamaning o'ng tomonidagi $f(x, y)$ funksiya tekislikdagi (x_0, y_0) nuqtani o'z ichiga olgan ba'zi G sohada aniqlangan, uzluksiz va

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq k|y_1 - y_2|$$

Lipshits shartini qanoatlantirsin, ($k = \text{const}$). (3.9) tenglama ba'zi $[x_0 - c, x_0 + c]$ segmentda (3.8) boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yagona $y = \psi(x)$ yechimga ega ekanligini isbotlang.

Yechimi. (3.9) tenglamani (3.8) sharti bajarilganda quyidagi integral tenglama ko'rnishda yozish mumkin :

$$\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \psi(t)) dt. \quad (3.10)$$

$f(x, y)$ funksiya G da uzluksiz bo'lgani uchun (x_0, y_0) nuqtani o'z ichiga olgan biror $G' \subset G$ sohada chegaralangan bo'ladi, ya'ni $|f(x, y)| \leq d$.

Endi c sonini quyidagi shartlarni qanoatltiradigan etib saylab olamiz:

- agar $|x_0 - x| \leq c$, $|y - y_0| \leq c \cdot d$ bo'lsa, u holda $(x, y) \in G$.
- $kc < 1$.

$[x_0 - c, x_0 + c]$ segmentda aniqlangan va $|\psi(x) - y_0| \leq cd$ tengsizligini qanoatltiruvchi $\{\psi\}$ uzluksiz funksiyalar sistemasini F bilan belgilaymiz va bu sistemada metrikani

$$\rho(\psi_1, \psi_2) = \max_{x_0 - c \leq x \leq x_0 + c} |\psi_1(x) - \psi_2(x)|$$

ko'rinishda kiritamiz. F metrik fazo $C[x_0 - c, x_0 + c]$ to'la fazoning yopiq qism fazosi bo'lgani uchun u ham to'la bo'ladi.

$$\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \quad (3.11)$$

tengligi bilan aniqlangan $\varphi \rightarrow \psi$ akslantirishida $x \in [x_0 - c, x_0 + c]$ bo'lsin. U holda bu akslantirish F ni o'ziga qisqartirib akslantiradi. Haqiqatan, $\varphi \in F$ va $x \in [x_0 - c, x_0 + c]$ bo'lsin. U holda

$$|\psi(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \right| \leq cd$$

mumosabati o'rinali bo'ladi. Demak, (3.11) akslantirish F fazoni o'ziga akslantiradi. Shu bilan birga,

$$\begin{aligned} |\psi_1(x) - \psi_2(x)| &\leq \int_{x_0}^x |f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t))| dt \geq \\ &\geq kc \max_{x_0 - c \leq t \leq x_0 + c} |\varphi_1(t) - \varphi_2(t)| = kc\rho(\varphi_1, \varphi_2) \end{aligned}$$

Bu yerda $0 < kc < 1$ bo'lgani uchun (3.10) akslantirishning qisqartirib akslantirish ekanligi kelib chiqadi. Demak, qisqartirib akslantirish principiga asosan (3.9) tenglama F fazoda (3.8) boshlang'ich shartini qanoatltiruvchi yagona yechimga ega.

3.3.4 $f(x) = 4x - 4x^2$ funksiya $[0; 1]$ kesmani o'ziga akslantirishini tekshiring. Bu akslantirish qisqartiruvchi boladimi?

Yechimi. $f(x) = 4x(1-x)$ bolganligidan x element $[0; 1]$ segmentga tegishli bo'lganda $f(x) \geq 0$ tengsizligi, $f(x) - 1 = -(2x-1)^2 \leq 0$ bo'lganligidan, esa $f(x) \leq 1$ tengsizligi o'rinali bo'ladi. Demak, f funksiyasi $[0; 1]$ segmentni o'ziga akslantiradi.

$x_1 = 0$ va $x_2 = \frac{1}{2}$ nuqtalarda $f(x_1) = 0$, $f(x_2) = 1$ tengliklari o'rnildir. Bunda

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) = 1 > \frac{1}{2} = \rho(x_1, x_2).$$

Bu esa f akslantirish qisqartiruvchi euasligini bildiradi.

3.3.5 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ akslantirish $[1; \infty]$ nurda qisqartiruvchi boladimi?

Yechimi.

$$\begin{aligned} \rho(f(x_1), f(x_2)) &= |f(x_1) - f(x_2)| = \\ &= |(x_1 - x_2) + \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right)| = |x_1 - x_2| \cdot \left(1 - \frac{1}{x_1 x_2}\right). \end{aligned}$$

tengligi va $x_1 x_2 \geq 1$ tengsizligidan

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) \leq \rho(x_1, x_2)$$

tengsizligiga ega bo'lamiz. Bu tengsizlik berilgan akslantirish qisqartiruvchi ekanligini anglatmaydi. Qisqartiruvchi akslantirish bo'lishi uchun $\rho(f(x_1), f(x_2)) \leq \alpha \rho(x_1, x_2)$ tengsizligi o'rni bolishi kerak, bunda $0 < \alpha < 1$. Bizing holda α sonini saylab olish mumkin emas, chunki $1 - \frac{1}{x_1 x_2}$ ifodasi $x_1 x_2$ ko'paytananing yetarlichcha katta qiymatlarida birga xohlagancha yaqin bo'ladi.

3.3.6 X to'la metrik fazosida A va B qisqartiruvchi akslan-

tirishlar berilgan bo'lsin:

$$\rho(Ax, Ay) \leq \alpha_A \rho(x, y), \quad \rho(Bx, By) \leq \alpha_B \rho(x, y).$$

Agar barcha $x \in X$ elementlar uchun $\rho(Ax, Bx) < \varepsilon$ (bunday A va B akslantirishlar ε -yaqin deyladi) tengsizligi o'rni bo'lsa, u holda bu akslantirishlar qo'zg'almas nuqta-

lang,

bunda

$\alpha = \max(\alpha_A, \alpha_B) < 1$.

Yechimi. x' nuqta A ning qo'zg'almas nuqta bo'sin. B qisqartiruvchi akslantirishning y' qo'zg'almas nuqtasini $y_k = B^k x'$, ($k = 0, 1, \dots$) ketma-ketlikning limiti sifatida qaraymiz. U holda

$$\begin{aligned} \rho(x', Bx') &\leq \rho(x', y_1) + \rho(y_1, y_2) + \dots + \rho(y_{k-1}, y_k) \leq \\ &\leq \rho(x', Bx')(1 + \alpha_B + \dots + \alpha_B^{k-1}) \leq \frac{\rho(x', Bx')}{1 - \alpha_B}, \end{aligned}$$

bundan $k \rightarrow \infty$ bo'lganda

$$\rho(x', y') \leq \frac{\rho(x', Bx')}{1 - \alpha_B} = \frac{\rho(Ax', Bx')}{1 - \alpha_B} < \frac{\varepsilon}{1 - \alpha},$$

3.3.7. $2, 2 + \frac{1}{2}, 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}, \dots, kabi aniqlangan$ $\{x_n\}$ ketma-ketligining yaqinlashuvchi ekanlagini isbotlang va uning limitini toping.

Yechimi. $\{x_n\}$ ketma-ketlikni $x_1 = 2$, $x_n = 2 + \frac{1}{x_{n-1}}$ ($n \geq 2$) ko'rinishida rekurent aniqlash mumkin bo'lganligidan,

$$x_n = 2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x_{n-2}}} \quad (n \geq 3)$$

tengligi va $x_1 \leq \frac{5}{2}$, $x_2 \leq \frac{5}{2}$ tengsizliklaridan $x_n \leq \frac{5}{2}$ ($\forall n \geq 1$) munosabatining o'rni ekanligi kelib chiqadi. Shu bilan birlga, $x_n \geq 2$ ($n \geq 1$). $[2; \frac{5}{2}]$ segmentini o'ziga o'tkazadigan $f(t) = 2 + \frac{1}{t}$ akslantirishini qaraymiz.

$$\rho(f(x), f(y)) = |f(y) - f(x)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| \leq \frac{1}{4} |x - y| = \frac{1}{4} \rho(x, y)$$

ifodadan f akslantirish qisqartiruvchi ekanligi ko'rinadi. U holda uning yagona x' qo'zg'almas niqtasi mavjud bolib, $x' = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ bo'ladi, bunda $x_n = f(x_{n-1}) = 2 + \frac{1}{x_{n-1}}$ ($n \geq 2$), $x_1 = 2$. $x' = 2 + \frac{1}{x'}$ tenglamani yechib, $x' = 1 + \sqrt{2}$ sonini topamiz. Bu berilgan ketma-ketlikning limiti bo'ladi.

3.3.8. $x_i = \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} x_m + a_i$ ($i = 1, 2, \dots$) cheksiz chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini qaraylik. Quyidalarни tekshiring:

a) $\alpha = \sup_i \sum_{m=1}^{\infty} |a_{im}| < 1$ va $\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| < +\infty$ shartlari bajarlunga, u yagona $x' = (x'_1, x'_2, \dots)$ yechimga ega bo'ladi, bunda $\sum_{i=1}^{\infty} |x'_i| < +\infty$;

b) agar $\beta = \sup_i \sum_{m=1}^{\infty} |a_{im}| < 1$ va $\sup_i |a_i| < +\infty$ bo'lsa, u holda berilgan sistemning $x' = (x'_1, x'_2, \dots)$ yagona yechimi bo'tib, $\sup_i |x'_i| < +\infty$ bajariladi.

Yechimi. a) $\rho(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|$, bunda $x = (x_i)$, $y = (y_i)$ metrika bilan berilgan ℓ_1 fazosida $Ax = y = (y_i)$ operatorini qaraymiz, bunda $y_i = \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} x_m + a_i$ ($i = 1, 2, \dots$).

U holda har bir $z = (z_i) \in \ell_1$ uchun

$$\begin{aligned}\rho(Ax, Az) &= \sum_{i=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} x_m + a_i - \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} z_m - a_i \right| = \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} (x_m - z_m) \right| \leq \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a_{im}| |x_m - z_m| \leq \alpha \rho(x, z),\end{aligned}$$

ya'ni A operatori ℓ_1 fazosini o'ziga qisqartirib akslantiradi. Endi qisqartirib akslantirish prinsipini qo'llansak, qo'yilgan savolga javob bo'ladi.

b) $\rho(x, y) = \sup_i |x_i - y_i|$ metrika bilan berilgan barcha chegaralangan ketina-ketliklarning m fazosida $Ax = y = (y_i)$ operatorini qaraymiz, bunda $y_i = \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} x_m + a_i$ ($i = 1, 2, \dots$). U holda

$$\rho(Ax, Az) = \sup_i \left| \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} x_m - \sum_{m=1}^{\infty} a_{im} z_m \right| \leq \beta \rho(x, y),$$

ya'ni A operatori m fazosini o'ziga qisqartirib akslantiradi. Endi qisqartirib akslantirish prinsipini qo'llansak, qo'yilgan savolga javob bo'ladi.

3.3.9. $A : f(x) \rightarrow \frac{1}{2} \int_0^1 xt f(t) dt + \frac{5}{6}x$ akslantirishning $C[0, 1]$ fazosida qisqartiruvchi ekanligini ko'rsating va uning qo'zg'almas f^* nuqtasini toping.

Yechimi. Berilgan akslantirish qisqartiruvchi ekanligi quyidagi boshlasdan kelib chiqadi:

$$|Af_1 - Af_2| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 xt [f_1(t) - f_2(t)] dt \right| \leq \frac{1}{2} \max_{t \in [0, 1]} |f_1(t) - f_2(t)| = \frac{1}{2} \rho(f_1, f_2).$$

$f_0(x) = 0$ deb olamiz. U holda

$$f_1(x) = Af_0(x) = \frac{5}{6}x;$$

$$f_2(x) = Af_1(x) = \frac{1}{2} \int_0^1 xt \cdot \frac{5}{6} t dt + \frac{5}{6}x = \left(\frac{5}{6^2} + \frac{5}{6} \right)x;$$

$$f_3(x) = Af_2(x) = \left(\frac{5}{6^3} + \frac{5}{6^2} + \frac{5}{6} \right)x;$$

$$f_n(x) = Af_{n-1}(x) = \left(\frac{5}{6^n} + \frac{5}{6^{n-1}} + \dots + \frac{5}{6^2} + \frac{5}{6} \right) x;$$

.....

Shuning uchun $f^*(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x$, ya'ni bu funksiya $C[0, 1]$ fazosida $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^1 xt f(t) dt + \frac{5}{6}x$ integral tenglamaning yagona yechimi bo'ladi.

3.3.10. Agar $f(x)$ funksiya haqiqiy sonlar o'qida uzluksiz differensiallanuvchi bo'lib, ushbu

$$0 < c \leq f'(x) \leq d < \infty$$

sharti o'rinli bo'lsa, u holda $f(x) = 0$ tenglama yagona yechimga egaligini isbotlang.

Yechimi. Ax = $x - \frac{1}{d}f(x)$ akslantirishning sonlar o'qini o'ziga qisqartirib o'tkazishimi ko'rsataylik: $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y$ uchun

$$\begin{aligned} |Ax - Ay| &= \left| x - y - \frac{1}{d}(f(x) - f(y)) \right| = \\ &= \left| 1 - \frac{1}{d} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| |x - y| = \left| 1 - \frac{f'(\xi)}{d} \right| |x - y| \leq \\ &\leq \left| 1 - \frac{c}{d} \right| |x - y|, \end{aligned}$$

bu yerda $\xi \in (x, y)$. Demak,

$$|Ax - Ay| \leq \left| 1 - \frac{c}{d} \right| |x - y|.$$

$0 \leq \left| 1 - \frac{c}{d} \right| < 1$ bo'lganligidan, $y = Ax$ qisqartirib akslantirish bo'ladi. U holda

$$x_0 - \frac{1}{d}f(x_0) = x_0$$

tenglikni, ya'ni $f(x_0) = 0$ tenglikni qanoatlantiruvchi yagona x_0 mavjuddir.

3.3.11. Aytaylik, $f(x, y)$ funksiya $G = \{(x, y) : a \leq x \leq b, -\infty < y < +\infty\}$ sohada x bo'yicha uzluksiz va y bo'yicha musbat, chegaralangan hosilaga ega bo'lsin: $0 < m \leq f'_y \leq M$. U holda $f(x, y) = 0$ tenglama $[a, b]$ kesmada yagona uzluksiz yechimga ega.

Yechimi. $C[a, b]$ fazoni o'z-o'ziga aks ettiruvchi $Ay = y - \frac{1}{M}f(x, y)$ akslantirishni qaraymiz. Bu akslantirishning qisqartirib akslantirish

ekanligini ko'rsatamiz. Agar y_1 va y_2 funksiyalar $C[a, b]$ fazoning elementlari bo'lsa, u holda

$$\begin{aligned} |Ay_1 - Ay_2| &= \left| \left(y_1 - \frac{1}{M} f'(x, y_1) \right) - \left(y_2 - \frac{1}{M} f'(x, y_2) \right) \right| = \\ &= \left| \left(y_2 - y_1 \right) - \frac{1}{M} f'_y(x, y_1 + \theta(y_1 - y_2))(y_1 - y_2) \right| \leq \end{aligned}$$

$$\leq \left| 1 - \frac{1}{M} \right| |y_1 - y_2| = \alpha |y_1 - y_2|,$$

ya'ni

$$\rho(Ay_1, Ay_2) \leq \alpha \rho(y_1, y_2),$$

bunda $0 < \alpha < 1$.

Demak, qisqartirib akslantirish prinsipidan, ixyiyoriy $y_0 \in C[a, b]$ nchun

$$y_1 = Ay_0, y_2 = Ay_1, \dots$$

ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'ladi va $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ funksiya $f(x, y) = 0$ tenglamaning yagona uzluksiz yechimi bo'ladi.

3.3.12. \mathbb{R} da

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + x - \arctg x$$

qisqartirib akslantirish bo'ladimi?

Yechimi. Faraz qilaylik, $x, y \in \mathbb{R}$ uchun

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$$

bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |(x - y) - (\arctg x - \arctg y)| \leq \alpha |x - y|. \\ \text{Bu tengsizlikda } y &= x + 1 \text{ deb olsak, u holda} \end{aligned}$$

$$|1 + \arctg(x + 1) - \arctg x| \leq \alpha.$$

Endi $x \rightarrow +\infty$ da $\arctg(x + 1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\arctg x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ekanligidan, $1 \leq \alpha$. Demak, bu akslantirish qisqartirib akslantirish emas.

Mustaqil ish uchun masalalar

- X to'ja metrik fazo bo'lib, $T : X \rightarrow X$ uzuksiz akslantirishning binor T^m darajasi qisqartirib akslantirish bo'lsin, ya'ni:

$$\rho(T^m x, T^m y) \leq \alpha \rho(x, y), \quad 0 < \alpha < 1.$$

U holda T yagona qo'zg'almas nuqtaga ega bo'lishini ko'rsating.

- $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ segmentiga $[0, 1]$ segmentiga o'zaro bir qiymatli uzuksiz akslantirish bo'lsin. U holda f ning kamida bitta qo'zg'almas nuqtasi mayjudligini isbotlang.

- Cheksiz tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin:

$$y_i = \sum_{k=1}^{\infty} c_{ik} x_k + b_i \quad (i = 1, 2, \dots),$$

bu yerda $\sum_{i,k} c_{ik}^2 < 1$, $\sum_i b_i^2 < +\infty$. Bu sistemaning ℓ_2 fazosida yagona yechimiga ega ekanligini isbotlang.

- $[1, \infty)$ yarim intervalda $f(x) \Rightarrow \frac{1}{2} \ln x$ funksiyan qaraylik. Intervoriy $x_1 \in [1; +\infty)$, $x_2 \in [1; +\infty)$ nuqtalari uchun

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(c)(x_2 - x_1)| \leq \frac{1}{2} |x_2 - x_1|$$

tengsizligi orinlidir (bu yerda $c \in (x_1, x_2)$). Ammo bu funksiya qo'zg'almas nuqtaga ega emas. Bundan qisqartirib akslantirish principlesiga ziddiyat kelib chiqmaydimi?

- Aytaylik, $f(x) \in C[a, b]$ bo'lsin. U holda

$$y + \frac{1}{2} \sin x + f(x) = 0$$

tenglama yagona $y = y(x) \in C[a, b]$ yechimga egaligini isbotlang.

- Aytaylik, $f(x) \in C[a, b]$ bo'lsin. U holda

$$y + \frac{1}{2} \cos x + f(x) = 0$$

tenglama yagona $y = y(x) \in C[a, b]$ yechimga egaligini isbotlang.

IV BOB

Normalangan fazolar

4.1. Chiziqli fazolar va chiziqli funksionallar

Biror M to'plamini berilgan bo'lsin. Agar $M \times M$ to'plamining ixtiyoriy R_φ qismi to'plamini olsak, u holda M to'plaminda φ *binar munosabat* berilgan deb ataladi. Boshqacha aytganda, agar (a, b) jutlik R_φ to'plamiga tegishli bo'lsa, u holda a element b elementiga *binar munosabata* deb ataladi va $a\varphi b$ ko'rinishda belgilanadi.

1. Ayniylik munosabati \in binar munosabatga misol bo'ladi. Haxiqatan, agar $a\in b \Leftrightarrow a = b$ deb olsak, u holda

$$R_\in = \{(a, a) : a \in M\} \subset M \times M.$$

R_\in to'plamini odatda $M \times M$ to'plamining *diagonalni* deyiladi hamda Δ ko'rinishda belgilanadi.

2. M to'plaminda berilgan har bir φ ekvivalentlik munosabati binar munosabat bo'ladi. Boshqacha aytganda, ekvivalentlik munosabati refleksivlik, simmetriya va tranzitivlik shartlarini qanoatlantiruvchi binar munosabat.

Biror E to'plamida $E \times E$ to'plamining har bir (x, y) elementiga E to'plamda x va y elementlarning yig'indisi deb ataluvchi va $x + y$ ko'rinishda belgilanuvchi E to'plamning elementmini mos qo'yuvchi binar munosabat berilgan bo'lib, bu munosabat quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\forall x, y, z \in E \text{ uchun}$$

1. $x + y = y + x$ (yig'indining kommutativligi);
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$ (yig'indining assotsiativligi);
3. E to'plaminda shunday θ element mayjud bo'lib, $\forall x \in E$ uchun $x + \theta = x$ tengligi orinli (θ not deb ataladi);
4. ixтиори $x \in E$ uchun shunday $-x \in E$ element mayjud bo'lib $x + (-x) = \theta$ tengligi orinli ($-x$ element x ga *qarama-qarshii element* deb ataladi).

Shu bilan birga, \mathbb{K} maydonidan olingan ixтиори α son va ixтиори $x \in E$ element uchun $\alpha x \in E$ (x elementning α songa ko'paytmasi) element aniqlangan bo'lib, quyidagi shartlar bajarilsin:

$$\forall \alpha, \beta \in K \quad \forall x, y \in E \text{ uchun:}$$

$$5. \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x;$$

$$6. \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y;$$

$$7. (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x;$$

$$8. 1 \cdot x = x.$$

Ushbu shartlarning barchasini qanoatlantiruvchi E to'plamini \mathbb{K} maydoni ustida *chiziqli yoki vektor fazo* deb ataladi. Chiziqli fazo elementlarni vektorlar yoki muqtalalar deb ataymiz. Agar $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (\mathbb{R} barcha haqiqiy sonlar maydoni) yoki $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (\mathbb{C} barcha kompleks sonlar maydoni) bo'lsa, u holda E , mos ravishida, *haqiqiy yoki kompleks chiziqli fazo* deb ataladi.

3. \mathbb{R} to'plami sonlarni qo'shish va ko'paytirish amallariga nisbatan chiziqli fazo bo'ladi.

4. \mathbb{R}^n fazoda qo'shish va songa ko'paytirish amallarini

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

ko'rinishda aniqlasak, bu to'plam chiziqli fazo boladi. Bu fazo *o'lchanli arifmetik fazo* deyiladi.

Ta'rif. X va Y lar \mathbb{K} ustida chiziqli fazolar bo'lsin. O'zaro bir qiyamli $\Phi : X \rightarrow Y$ akslantirish shartlarni qanoatlantirsing, u holda X va Y fazolar o'zaro izomorf fazolar deyiladi.

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y), \quad x, y \in X;$$

$$\Phi(\alpha x) = \alpha\Phi(x), \quad x, y \in X, \alpha \in \mathbb{K}$$

shartlarni qanoatlantirsing, u holda X va Y fazolar o'zaro izomorf fazolar qoida orqali o'matilishi mumkin.

Misol uchun, n o'lchanli \mathbb{R}^n haqiqiy arifmetik fazosi bilan darajalari $n - 1$ dan katta bolmagan barcha haqiqiy ko'effitsientli ko'phadlar fazosi izomorf fazolar bo'ladi, bunda izomorfizm

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \mapsto a_1 + a_2 t + \dots + a_n t^{n-1}$$

tengligi o'rinni bo'lsa, u holda x_1, x_2, \dots, x_n elementlari berilganda, kamida bit-tasi noldan farqli bo'lgan a_1, a_2, \dots, a_n sonlari mayjud bo'lib,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$$

tengligi o'rinni bo'lsa, u holda x_1, x_2, \dots, x_n lar chiziqli bog'liq elementlari deyiladi. Agar $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ tengligidan $a_1 = \alpha_2 = \dots =$

$\alpha_n = 0$ tengligi kelib chiqsa, u holda x_1, x_2, \dots, x_n elementlar chiziqli erkli elementtar deb ataladi.

L chiziqli fazo elementlarining x, y, \dots , cheksiz sistemasining ixtiyoriv chekli qism sistemasi chiziqli erkli bo'lsa, u holda berilgan sistema chiziqli erki deb ataladi.

Agar L fazosida n sondagi chiziqli erkli elementlar topilib, $n + 1$ sondagi ixtiyoriv elementlari chiziqli bog'liq bo'lsa, u holda L fazosi n -o'lichamli deyiladi. Agar L da ixtiyoriv sondagi chiziqli erkli elementlarni topish mumkin bo'lsa, u holda L cheksiz o'lichamli fazo deb ataladi. n -o'lichamli L fazoning n sondagi ixtiyoriv chiziqli erkli elementlarining sistemmasini, bu fazoning *bazisi* deb ataladi.

L' to'plam L chiziqli fazoning qism to'plami bo'lsin. Agar ixtiyoriv $x, y \in L'$ va ixtiyoriv $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ sonlar uchun $\alpha x + \beta y \in L'$ bo'lsa, u holda L' to'plam L ning *qism fazosi* deb ataladi.

L chiziqli fazo bo'lib, θ uning nol elementni bo'lsin. Faqtat nol elementdan iborat $\{\theta\}$ to'plam L ning eng kichik qism fazosi bo'ladı. Bu fazoni *nol qism fazo* deb ataymiz. Shu bilan birga, L ni ham o'zining qism fazosi sifatida qarash mumkin. Bu ikki qism fazolar L ning *xosmas* qism fazolari deyiladi, boshqa qism fazolar *xos* deb ataladi.

Qism fazolarning xohlagan sistemasining kesishmasi qism fazo bo'ldi. Haqiqatan, $\{A_\gamma : \gamma \in I\}$ (I ixtiyoriv to'plam) sistema L chiziqli fazosining qism fazolari sistemasi bo'lsin. Ixtiyoriv $x, y \in \bigcap_\gamma A_\gamma$ elementlar va ixtiyoriv α, β sonlar uchun $\alpha x + \beta y \in A_\gamma$, $\forall \gamma \in I$ munosabati o'rinni. U holda $\alpha x + \beta y \in \bigcap_\gamma A_\gamma$ munosabati ham o'rinni, ya'ni $\bigcap_\gamma A_\gamma$ to'plam qism fazo bo'ldi.

L chiziqli fazoda bирор bo'sh bo'lмаган S to'plam berilgan bo'lsin. S to'plamni o'z ichiga olgan eng kichik qism fazo, S to'plamning *chiziqli gobig'i* deyiladi va u odatda $\mathcal{L}(S)$ ko'rinishda belgilanadi. $\mathcal{L}(S)$ fazosi S ni o'z ichiga oluvchi barcha qism fazolarining kesishmasidan iborat bo'ldi. Boshqacha aytganda, $\mathcal{L}(S)$ fazosi quyidagi ko'rimishdag elementlardan iborat:

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i$$

bunda $\alpha_i \in \mathbb{K}$, $a_i \in S$, $1 \leq i \leq n$, $n \in \mathbb{N}$.

5. L chiziqli fazo bo'lib, x uning noldan farqli elementni bo'lsin. $\{\lambda x : \lambda \in \mathbb{K}\}$ elementlar to'plami bir o'lichamli qism fazo bo'ladı. Agar L ning o'lichamli bordan katta bo'lsa, u holda $\{\lambda x : \lambda \in \mathbb{K}\} \neq L$. Agar L ning o'lichamli bordan katta bo'lsa, u holda $\{\lambda x : \lambda \in \mathbb{K}\} = L$.

ko'rinishda belgilasak, u holda bu to'plam $C[a, b]$ ning qism fazosi bo'ladı.

7. $\ell_2, c_0, c, m, \mathbb{R}^\infty$ to'plamlarning barchasi chiziqli fazo bo'lsin. Agar biri o'zidan keyingisining qism fazosi bo'ladı.

L chiziqli fazo bo'lib, L' uning biror qism fazosi bo'lsin. Agar $x, y \in L$ elementlarning ayrimasi L' fazosiga tegishli bo'lsa, u holda bu elementlarni *equivalent* deb ataymiz. Ekvivalentlik munosabat referlesiv, simmetrik va trausitiv bo'lgani uchum, u L ni o'zaro kesishmaydigan sinflarga ajratadi. Bunday sinflar to'plami L ning L' bo'yicha faktor fazosi deb ataladi va L/L' ko'rinishda belgilanadi. ξ va η sinflar L/L' faktor fazoning elementlari, hamda $x \in \xi$ va $y \in \eta$ bo'lsin. ξ va η sinflarning yig'indisi deb, $x + y$ elementini o'z ichiga oluvchi ν sinflaga ayladi; ξ sinfi va α son ko'paytmasi deb, αx elementmini o'z ichiga oluvchi sinfiga aytamiz. Bu amallar natijasi x va y lar o'rniiga xohlagan boshqa $x' \in \xi$ va $y' \in \eta$ elementlarni olganda ham o'zgarmaydi. Shunday qilib, L/L' faktor fazosida qo'shilish va skalyar songa ko'paytirish amallari aniqlanadi. Bu amallar chiziqli fazo barcha shartlarni qanoatlantiradi. Shu sababli, har bir L/L' faktor fazo chiziqli fazo bo'ladı.

Agar L chiziqli fazo n -o'lichamli bo'lib, uning L' qism fazosi k -o'lichamli bo'lsa, u holda L/L' faktor fazosining o'lichami $n - k$ ga teng.

L chiziqli fazo bo'lib, L' uning biror qism fazosi bo'lsin. L/L' faktor fazoning o'lichami L' fazoning L fazodagi *koo'lichami* deb ataladi.

Agar $L' \subset L$ fuzo cheki koo'lichanga ega bo'lsa, u holda L da shunday x_1, x_2, \dots, x_n elementlarni saylab olish mumkin bo'lib, ixtiyoriy $x \in L$ elementni yagona usulda

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n + y$$

ko'rinishda yozish mumkin, bunda $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $y \in L'$.

Haqiqatan, Aytaylik, L/L' faktor fazoning o'lichami n ga teng bo'lsin. Bu faktor fazodan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ basis olib, har bir ξ_k sinfdan x_k element olamiz. x nuqta L ning ixtiyoriy elementi bo'lib, bu elementni o'z ichiga oluvchi sinfiga ξ orqali belgilaylik. U holda

$$\xi = \alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \dots + \alpha_n \xi_n.$$

$x \in \xi$ bo'lganligi sababli $x - (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \in L'$. Unda L' ning shunday y elementni mayjud bo'lib,

$$x - (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = y$$

tengligi o'rini bo'ladi. Natijada

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n + y$$

tengligi kelib chiqadi. Bu yozuvning yagonaligi L' qism fazoning L/L' faktori fazosi uchun nol element bo'lishidan kelib chiqadi.

L chiziqli fazoda aniqlangan g sonli funksiya funksional deb ataladi. Agar barcha $x, y \in L$ elementlar uchun $g(x+y) = g(x) + g(y)$ tengligi o'rini bo'lsa, u holda g additiv deyiladi. Xohlagan α son va barcha $x \in L$ uchun $g(\alpha x) = \alpha g(x)$ tengligi o'rini bo'lsa, u holda g ni bir jinsli deb ataymiz.

Kompleks chiziqli fazoda aniqlangan g funksonal xohlagan α son uchun $g(\alpha x) = \bar{\alpha}g(x)$ tenghkni qanoatlantirsa, u holda *qo'shma bir jinsli* deb ataladi.

Additiv va bir jinsli funksionalni *chiziqli* deb ataladi. Boshqacha aytganda, L chiziqli fazoda aniqlangan $g(x)$ funksional xohlagan $x, y \in L$ elementlar va α, β sonlar uchun $g(\alpha x + \beta y) = \alpha g(x) + \beta g(y)$ tengligini qanoatlantirsa, u holda chiziqli deb ataladi.

8. $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tayinlangan vektor bo'lsa, u holda

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$$

ko'rinishda aniqlangan akslantirish \mathbb{R}^n da chiziqli funksional bo'ladi. Haqiqatan, xohlagan

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$$

elementlar va xohlagan α, β sonlar uchun

$$f(\alpha x + \beta y) = \sum_{i=1}^n a_i (\alpha x_i + \beta y_i) = \alpha \sum_{i=1}^n a_i x_i + \beta \sum_{i=1}^n a_i y_i = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

9. $C[a, b]$ fazosida chiziqli funksional sifatida

$$f(x) = \int_a^b x(t) dt$$

integralimi qarash imumkin. Bu funksionalning chiziqli ekanligi integralning xossalardan kelib chiqadi.

10. k tayinlangan natural son bo'lsin. ℓ_2 har bir $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ elementi uchun $f_k(x) = x_k$ deb olsak, bu funksional chiziqli bo'ladi. Haqiqatan, xohlagan

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in \ell_2$$

elementlar va xohlagan α, β sonlar uchun

$$f_k(\alpha x + \beta y) = \alpha x_k + \beta y_k = \alpha f(x) + \beta f(y)$$

tengligi o'rini.

L chiziqli fazoning H xos qism fazosi uchun shunday $x_0 \in L$ element topilib, $L = \mathcal{L}(H, x_0)$ tengligi o'rimli bo'lsa, bunda $\mathcal{L}(H, x_0) = H$ to'plam va x_0 elementning chiziqli qobig'i, u holda H giperqism fazo deb ataladi. L chiziqli fazodagi

$$x + H \quad (x \in L, \quad H - qism fazo)$$

ko'rinishdagi to'plamga gipertekislik deb ataymiz.

$H = g^{-1}(0)$ giperqism fazo g funksionalning yadrosi deb ataladi va ker g ko'rinishda belgilanadi.

L haqiqiy chiziqli fazoning biror L_0 qism fazosida f_0 chiziqli funksionali berilgan bo'lsin. Agar L fazosida aniqlangan f funksionali uchun $x \in L_0$ bo'lganda $f(x) = f_0(x)$ tengligi o'rini bo'lsa, u holda f funksionali f_0 funksionalning davomi deb ataladi.

L chiziqli fazosida aniqlangan p funksional berilgan bo'lib, barcha $x, y \in L$ elementlar va barcha $\alpha \in [0, 1]$ sonlari uchun

$$p(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha p(x) + (1 - \alpha)p(y)$$

tengsizligi o'rini bo'lsa p funksionali qavariq deb ataladi. Agar xohlagan $x \in L$ elementlar va barcha $\alpha > 0$ sonlari uchun $p(\alpha x) = \alpha p(x)$ tengligi o'rini bo'lsa, p funksional musbat bir jinsli deyiladi. Musbat bir jinsli qavariq funksionalni bir jinsli qavariq deb ataymiz.

L chiziqli fazo, $A \subset E$ qavariq to'plam va $x \in A$ bo'lsin. Agar $x = \frac{1}{2}(y + z)$, $y, z \in A$ tengligidan, $x = y = z$ kelib chiqsa, u holda x nuqta A to'plamning ekstremal nuqtasi deyiladi. A to'plamning barcha ekstremal nuqtalari to'plami ext A kabi belgilanadi va u to'plamning ekstremal chegarasi deyiladi. Masalan, $[0, 1]$ kesma uchun ext $[0, 1] = \{0, 1\}$.

Masalalar

4.1.1. Ixtiyoriy L chiziqli fazoning nol elementi yagona ekanligini isbotlang.

Yechimi. L chiziqli fazoning ikkita θ_1 va θ_2 nol elementlari mavjud bo'lsin. U holda nol element ta'rifi va qo'shish amalining kommutativligidan,

$$\theta_1 = \theta_1 + \theta_2 = \theta_2 + \theta_1 = \theta_2.$$

Demak, $\theta_1 = \theta_2$, ya'ni nol elementi yagona bo'ladi.

4.1.2. Ixtiyoriy L chiziqli fazoda har bir elementga qarama-qarshi element yagona ekanligini isbotlang.

Yechimi. Aytaylik, x' va x'' elementlar x elementiga qarama-qarshi elementlar bo'lsin. U holda

$$x' = x' + 0 = x' + (x + x'') = (x' + x) + x'' = 0 + x'' = x'',$$

ya'ni $x' = x''$.

4.1.3. Agar L chiziqli fazoning noldan farqli x elementi uchun $\lambda x = \mu x$ tengligi o'rinch bo'lsa, u holda λ va μ sonlarning o'zaro teng ekanligini isbotlang.

Yechimi. $\lambda x = \mu x$ tengligining ikki tomoniga $-\mu x$ elementini qo'shsak $(\lambda - \mu)x = 0$ tengligi kelib chiqadi. Agar $\lambda \neq \mu$ bo'lsa, u holda chiziqli fazo ta'rifida 5-aksiomadan $x = (\lambda - \mu)^{-1}[(\lambda - \mu)x] = 0$ tengligiga ega bo'lamiz. Bu ziddiyatdan $\lambda = \mu$ tengligi kelib chiqadi.

4.1.4. Agar L chiziqli fazoning x, y elementlari va noldan farqli λ soni uchun $\lambda x = \lambda y$ tengligi o'rinch bo'lsa, u holda x va y elementlarning o'zaro teng bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $\lambda x = \lambda y$ tengligining ikki tomoniga $-\lambda y$ elementini qo'shsak $\lambda(x - y) = 0$ tengligiga ega bo'lamiz. $\lambda \neq 0$ bo'lgani uchun $x - y = \lambda^{-1}[\lambda(x - y)] = 0$, ya'ni $x = y$.

4.1.5. Barcha haqiqiy koeffisientli ko'phadlar fazosi $P[X]$ da

$$1, t, t^2, \dots, t^n, \dots$$

sistema chiziqli erkli ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sonlari uchun har bir $t \in \mathbb{R}$ da

$$a_0t + a_1t + \dots + a_nt^n = 0$$

bo'lsin. Oxirgi tenglikdan n marta hosila olsak, u holda $n!a_n = 0$, ya'ni $a_n = 0$ kelib chiqadi. Bundan

$$a_0t + a_1t + \dots + a_{n-1}t^{n-1} = 0.$$

Xuddi shunday bu tenglikdan $n - 1$ marta hosila olsak, u holda $(n - 1)!a_{n-1} = 0$, ya'ni $a_{n-1} = 0$ kelib chiqadi. Bu jarayonni davom ettirsak, $a_n = a_{n-1} = \dots = a_1 = a_0 = 0$ ga ega bo'lamiz. Bundan

$$1, t, t^2, \dots, t^n, \dots$$

sistema chiziqli erkli ekanligini ko'rinadi.

4.1.6. Agar $E = C[0, 1]$ va $F = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$ bo'lsa, u holda E/F faktor fazoni toping.

Yechimi. $1(t) = 1, t \in [0, 1]$ birlik funksiyani olaylik. U holda $f \in C[0, 1]$ uchun $g = f - c1 \in F$ bo'ladi, bunda $c = f(0)$. Bundan har bir $f \in C[0, 1]$ yagona ravishda

$$f = g + c1, g \in F, c \in \mathbb{R}$$

ko'rinishda yoziladi. Bundan E/F faktor fazo $\{c1 : c \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}$ fazoga izomorfdir.

4.1.7. Haqiqiy sonlar maydonida aniqlangan va t o'zgaruvchiga bog'liq barcha ko'phadlar chiziqli fazosida $t^2 + 1, t^2 + t, 1$ vektorlar sistemasining chiziqli qobig'i qanday bo'ladi?

Yechimi. Xohlagan α, β, γ haqiqiy sonlari uchun

$$\alpha(t^2 + 1) + \beta(t^2 + t) + \gamma = (\alpha + \beta)t^2 + \beta t + \alpha + \gamma$$

tenligi o'rinali bo'lgani uchun berilgan sistemaning chiziqli qobig'i haqiqiy koefitsientli barcha kvadrat uchhadllarning chiziqli fazosidan iborat bo'ladi.

4.1.8. H to'plam \mathbb{K} maydon ustidagi L chiziqli fazoning giperqism fazosi bo'lib, $x_1 \in L/H$ bo'lsin. U holda L ning xohlagan x elementi

$$x = \lambda x_1 + h, \quad (\lambda \in \mathbb{K}, \quad h \in H)$$

ko'rinishda yagona usulda yozilishini isbotlang.

Yechimi. H giperqism fazo bo'lgani uchun $\mathcal{L}(H, x_0) = L$ tenglikni qanoatlantiruvchi $x_0 \in L$ elementi mavjud. Shu sababli $x_1 \in L/H$ elementni

$$x_1 = \lambda_0 x_0 + \lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 + \dots + \lambda_n h_n, \quad (h_1, h_2, \dots, h_n \in H)$$

ko'rinishda yozish mumkin. $\lambda_1 h_1 + \lambda_2 h_2 + \dots + \lambda_n h_n = h_0$ belgilashni kiritamiz. U holda $x_1 = \lambda_0 x_0 + h_0$. Bu tenglikdan x_0 ni topamiz:

$$x_0 = \frac{x_1 - h_0}{\lambda_0}.$$

$x_1 \notin H$ bo'lgani uchun $x_0 \neq 0$.

Xohlagan $x \in L$ element uchun shunday $\alpha \in \mathbb{K}$ soni va $h_1 \in H$ elementi topilib, $x = \alpha x_0 + h_1$ tengligi o'rinali bo'ladi. Bu tenglikni almashtiramiz:

$$x = \alpha x_0 + h = \alpha \frac{x_1 - h_0}{\lambda_0} + h = \frac{\alpha}{\lambda_0} x_1 + (h_1 - \frac{\alpha}{\lambda_0} h_0).$$

$\frac{\alpha}{\lambda_0} = \lambda$ va $h_1 = \frac{\alpha}{\lambda_0} h_0 = h$ belgilashlarini kiritamiz. U holda

$$x = \lambda x_1 + h \quad (4.1)$$

Endi x elementni (4.1) ko'rnishda yagona ravishda yozish mumkin ekanligini ko'rsatamiz. Aytaylik, $x = \alpha x_1 + h = \beta x_1 + g$ ($h, g \in H$) bo'lsin. U holda $(\alpha - \beta)x_1 = g - h$. $g - h \in H$ bo'lgani uchun $(\alpha - \beta)x_1 \in H$. Bu munosabat faqat $\alpha = \beta$ bo'lgandagina o'rinni, chunki $x_1 \notin H$. Natijada $g = h$ tengligiga ham ega bo'lamiz.

4.1.9. L chiziqli fazoda g chiziqli funksional berilgan bo'lib, $g \neq 0$ bo'lsin. U holda quyidagilarni isbotlang:

- 1) $H = f^{-1}(0)$ to'plami giper qism fazo bo'ladi;
- 2) xohlagan $\lambda \in \mathbb{K}$ soni uchun $f^{-1}(\lambda) = x_\lambda + H$ tengligi o'rinni, bunda $f(x_\lambda) = \lambda$.

Yechimi. 1) $f \neq 0$ bo'lgani uchun $f(x_0) \neq 0$ bo'ladigan $x_0 \in L$ elementi mavjud. $f(x_0) = \lambda_0$ bo'lsin. L dan xohlagan x element olib, uni ushbu

$$x = \frac{f(x)}{\lambda_0} x_0 + \left(x - \frac{f(x)}{\lambda_0} x_0 \right)$$

ko'rnishda yozib olaylik.

$$f \left(x - \frac{f(x)}{\lambda_0} x_0 \right) = f(x) - f(x) \frac{f(x_0)}{\lambda_0} = 0$$

tengligi o'rinni bo'lgani uchun $x - \frac{f(x)}{\lambda_0} x_0 \in H$ bo'ladi. Bu elementni h orqali belgilaymiz:

$$h = x - \frac{f(x)}{\lambda_0} x_0.$$

U holda

$$x = \frac{f(x)}{\lambda_0} + h.$$

Bu tenglikdan H ning giper qism fazo ekanligi kelib chiqadi.

2) Agar $x_\lambda = \frac{\lambda}{\lambda_0} x_0$ bo'lsa, u holda

$$f(x_\lambda) = f \left(\frac{\lambda}{\lambda_0} x_0 \right) = \lambda \frac{f(x_0)}{\lambda_0} = \lambda,$$

ya'ni $f(x_\lambda) = \lambda$ tengligini qanoatlantiruvchi x_λ elementlari mavjud ekan. Aytaylik, x_λ element $f(x_\lambda) = \lambda$ tengligini qanoatlantiruvchi ixtiyoriy element bo'lsin. Agar $y \in f^{-1}(\lambda)$ bo'lsa, u holda $f(y) = \lambda$ bo'ladi. y elementini $y = x_\lambda + (y - x_\lambda)$ ko'rnishida yozib olsak, $f(y - x_\lambda) = 0$ bo'lishidan, $y - x_\lambda \in H$ ekanligi kelib chiqadi. Shu sababli $y \in x_\lambda + H$.

Aksincha, agar $z \in x_\lambda + H$ bo'lsa, u holda $z = x_\lambda + h$ ($h \in H$). Bundan $f(z) = \lambda$ va $z \in f^{-1}(\lambda)$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $f^{-1}(\lambda) = x_\lambda + H$.

4.1.10. (Xan — Banax teoremasi). *L chiziqli fazosida aniqlangan bir jinsli qavariq p funksionali va L ning L_0 qism fazosi berilgan bo'lsin. Agar L_0 fazosida aniqlangan f_0 funksionali uchun*

$$f_0(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in L_0) \quad (4.2)$$

tengsizligi o'rinni bo'lsa, u holda f_0 funksionalni barcha L da $f(x) \leq p(x)$ tengsizligini qanoatlantiruvchi f funksionaligacha davom ettirish mumkinligini isbotlang.

Yechimi. $L_0 \neq L$ bo'lsin. $L \setminus L_0$ to'plamidan biror z nuqtasini olib,

$$L' = \{tz + x : t \in \mathbb{R}, x \in L_0\}$$

qism fazosini qaraylik. L ning bu chiziqli qism fazosi L_0 fazosining elementar kengaymasi deb ataladi. f_0 funksionalni (4.2) shartni buzmagan holda L_0 fazosidan L' fazosiga davom ettirish mumkinligini ko'rsatamiz.

Agar izlanayotgan f_0 funksionalning L' dagi davomi f' bo'lsa, u holda

$$f'(tz + x) = tf'(z) + f_0(x)$$

tengligi o'rinni bo'ladi. $f'(z) = c$ belgilashni kiritamiz. U holda

$$f'(tz + x) = tc + f_0(x).$$

Endi c sonini (4.2) shart o'rinni bo'ladigan qilib saylab olamiz, ya'ni $x \in L_0$ elementi va barcha t haqiqiy sonlar uchun $f_0(x) + tc \leq p(x + tz)$ tengsizligi o'rinni. Bu tengsizlik $t > 0$ bo'lganda

$$f_0\left(\frac{x}{t}\right) + c \leq p\left(\frac{x}{t} + z\right)$$

yoki

$$c \leq p\left(\frac{x}{t} + z\right) - f_0\left(\frac{x}{t}\right)$$

tengsizligiga, $t < 0$ bo'lganda esa

$$f_0\left(\frac{x}{t}\right) + c \geq -p\left(-\frac{x}{t} - z\right),$$

yoki

$$c \geq -p\left(-\frac{x}{t} - z\right) - f_0\left(\frac{x}{t}\right)$$

tengsizligiga teng kuchi. Bu tengsizliklari qanoatlanadiragan c soni mavjud ekanligini ko'rsatamiz. L_0 fazosidan ixtiyoriy y', y'' elementlar olamiz. $y'' - y' \in L_0$ bo'lgani uchun

$$\begin{aligned} f_0(y'') - f_0(y') &= f_0(y'' - y') \leq p(y'' - y') = \\ &= p((y'' + z) - (y' + z)) \leq p(y'' + z) + p(-y' - z), \end{aligned}$$

ya'ni

$$p(y'' + z) - f_0(y'') \geq -p(-y' - z) - f_0(y')$$

tengsizligiga ega bo'lamiz. y', y'' muq'talar L_0 fazosidan olingan ixtiyoriy elementlar bo'lganligidan,

$$\begin{aligned} c'' &= \inf_{y''} (f_0(y'') + p(y'' + z)) \geq \sup_{y'} (f_0(y') - p(-y' - z)) = c'. \end{aligned}$$

$c'' \geq c \geq c'$ qo'sh tengsizlikni qanoatlanadiragan c sonini tanlab, L' fazosida $f'(tz + x) = tc + f_0(x)$ korinishda f' funksionalni aniqlaymiz. Bu funksional chiziqli va f_0 ning L' dagi davomi. Endi L' da (4.2) munosabatining o'rinni ekanligini ko'rsatamiz. $t > 0$ bo'lganda

$$\begin{aligned} f'(tz + x) &= tc + f_0(x) \leq tc'' + f_0(x) \leq \\ &\leq t \left(-f_0\left(\frac{x}{t}\right) + p\left(z + \frac{x}{t}\right) \right) + f_0(x) = \\ &= -f_0(x) + p(tz + x) + f_0(x) = p(tz + x). \end{aligned}$$

$t < 0$ bo'lganda

$$\begin{aligned} f'(tz + x) &= tc + f_0(x) \leq tc' + f_0(x) \leq \\ &\leq t \left(-f_0\left(\frac{x}{t}\right) - p\left(-z - \frac{x}{t}\right) \right) + f_0(x) = \\ &= -f_0(x) + p(tz + x) + f_0(x) = p(tz + x). \end{aligned}$$

Demak, agar f_0 funksional $L_0 \subset L$ qism fazoda aniqlangan va (4.2) shartni qanoatlanitsa, u holda shu shartni qanoatlanitigan holda L_0 fazoning L' elementlar kengaymasiga davom ettirish mumkin ekanligini ko'rsatdik.

Agar L fazosida chiziqli qobig'i shu fazoning o'ziga teng sanoqli $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ to'plamini tanlab olish mumkin bo'lsa, u holda yuqoridaq usul bilan f_0 funksionalni (4.2) shartni saqlagan holda quyidagi fazolarga ketma-ket davom ettiramiz:

$$L^{(1)} = \{L_0, x_1\}, \quad L^{(2)} = \{L^{(1)}, x_2\}, \dots,$$

bu yerda $L^{(k+1)}$ to'plami L ning $L^{(k)}$ fazoda va x_{k+1} elementni o'z ichiga oluvchi eng kichik qism fazosidan iborat. Natijada, L ning har bir elementi buor $L^{(k)}$ fazosiga tegishli bo'lshidan, berilgan f_0 funksional L_0 dan L ga (4.2) shartni buzmagan holda davom ettiriladi. Endi yuqorida aytilgan sanoqli to'plamni tanlab olish mumkin bo'linagan, ya'ni umumiy holda qaraymiz. Berilgan f_0 funksionalning (4.2) shartni qanoatlanitiruvchi barcha davonlari to'plamini \mathcal{F} orqali belgilaylik.

Agar f_1 va f_2 funksionalllar \mathcal{F} to'plamiga tegishli bo'lib, f_1 aniqlangan qism fazo f_2 aniqlangan qism fazoda yotsa va f_2 funksional f_1 funksionalning (4.2) shartni qanoatlanitiruvchi davomi bo'lsa, u holda $f_1 \leq f_2$ munosabatini yozamiz. Bu munosabat \mathcal{F} to'plamida qisman tartibini aniqlaydi. \mathcal{F}_0 orqali \mathcal{F} to'plamining ixtiyoriy chiziqli tartiblangan qism fazosini belglaymiz. \mathcal{F}_0 to'plamiga tegishli barcha funksionallar aniqlanish sohalarning birlashmasida aniqlangan va bu funksionallarning har biri bilan shu funksionallarning aniqlanish sohasida ustmashtushadigan funksional \mathcal{F}_0 to'plamining yuqori chegarasi bo'ladı. Demak, \mathcal{F} to'plamining ixtiyoriy chiziqli tartiblangan qism to'plamini yuqori chegaraga ega. U holda Sonn lemmasi bo'yicha \mathcal{F} to'plamida maksimal f element mavjud bo'лади. Shu f funksional biz izlayotgan funksional bo'лади. Haqiqatan, bu funksional f_0 funksionalning (4.2) shartni qanoatlanitiradigan davomi va uning aniqlanish sohasi L fazosidan iborat. Sababi, agar f funksionalning aniqlanish sohasi L fazosining biror L_1 xos qism fazosidan iborat bo'lsa, u holda uni yuqorida aytigan usul bilan $L_2 \subset L$ fazosiga davom ettirish mumkin bo'лади. Bu f funksionalning maksimal ekanligiga ziddir.

4.1.11. α ning qanday qiyomatida $x = (1, 2, 3)$, $y = (1, 1, 0)$ va $z = (\alpha, 1, 1)$ vektorlar chiziqli bog'liq bo'laadi?

Yechimi. a, b, c sonlari uchun $ax + by + cz = 0$ bo'lsin. U holda

$$\begin{cases} a + b + c\alpha = 0 \\ 2a + b + c = 0 \\ 3a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + c(1 - \alpha) = 0 \\ 3a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = -3a \\ a - 3a(1 - \alpha) = 0 \Rightarrow a(3\alpha - 2) = 0. \end{cases}$$

Chiziqli bog'liq bo'lganligi uchun $a \neq 0$ deylik. U holda

$$3\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{2}{3}.$$

4.1.12. $C[0, \pi]$ fazoda $1, \cos t, \cos^2 t$ funksiyalar chiziqli erkli, $1, \cos 2t, \cos^2 t$ funksiyalari esa chiziqli bog'liq ekanligini ko'rsating.

Yechimi. 1) $1, \cos t, \cos^2 t$ funksiyalar chiziqli erkli bo'ladi. Haqiqatan,

$$\alpha + \beta \cos t + \gamma \cos^2 t = 0$$

bo'lsin. Agar $t = \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, u holda $\alpha = 0$ kelib chiqadi, va $\beta \cos t + \gamma \cos^2 t = 0$ bo'lib, $\beta + \gamma \cos t = 0$ tengligiga ega bo'lamiz. Yana $t = \frac{\pi}{2}$ qiymatida $\beta = 0$ kelib chiqib, $\gamma \cos t = 0$, bundan $\gamma = 0$ kelib chiqadi. Natijada

$$\alpha + \beta \cos t + \gamma \cos^2 t = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

2) $1, \cos 2t, \cos^2 t$ funksiyalari chiziqli bog'liq, chunki bu

$$\cos^2 t = \frac{1}{2} (1 + \cos 2t)$$

munosabatidan kelib chiqadi.

4.1.13. E chiziqli fazo va $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ chizqli funksional bo'lsin. U holda bu funksionalning yadrosi

$$\ker f = \{x \in E : f(x) = 0\}$$

to'plami E ning qism fazosi ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $x, y \in \ker f$ bo'lsin. U holda

$$f(x + y) = f(x) + f(y) = 0 + 0 = 0,$$

ya'ni $\ker f$ qo'shish amaliga nisbatan yopiq.

Endi $x \in \ker f$, $\lambda \in \mathbb{K}$ bo'lsin. U holda

$$f(\lambda x) = \lambda f(x) = \lambda 0 = 0,$$

ya'ni $\ker f$ songa ko'paytirish amaliga nisbatan ham yopiq. Demak, $\ker f$ qism fazo ekan.

4.1.14. c_0 fazoning birlik sharining ekstremal nuqtalari mavjud emasligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $A = \{x = (x_n) \in c_0 : \|x\| \leq 1\}$ bu fazoming birlik shari va $x \in A$ bo'lsin. U holda $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, bundan shunday m soni topilib, $|x_m| < 1/3$.

$$y_n = \begin{cases} x_n, & \text{agar } n \neq m, \\ x_n - \frac{1}{3}, & \text{agar } n = m \end{cases}$$

va

$$z_n = \begin{cases} x_n, & \text{agar } n \neq m, \\ x_n + \frac{1}{3}, & \text{agar } n = m \end{cases}$$

nuqtalar uchun

$$x = \frac{1}{2}(y + z), y \neq z$$

bo'lganligidan, x ekstremal nuqta emas.

4.1.15. *c fazoning birlik sharining ekstremal nuqtalarini toping.*

Yechimi. Aytaylik, $A = \{x = (x_n) \in c : \|x\| \leq 1\}$ bu fazoning birlik shari va $x \in A$ bo'lsin. Faraz qilaylik, shunday m soni topilib, $|x_m| < 1$ bo'lsin. U holda shuniday $\varepsilon > 0$ soni mavjudki, $-1 + \varepsilon < x_m < 1 - \varepsilon$.

$$y_n = \begin{cases} x_n, & \text{agar } n \neq m, \\ x_n - \varepsilon, & \text{agar } n = m \end{cases}$$

va

$$z_n = \begin{cases} x_n, & \text{agar } n \neq m, \\ x_n + \varepsilon, & \text{agar } n = m \end{cases}$$

nuqtalar uchun

$$x = \frac{1}{2}(y + z), y \neq z$$

bo'lganligidan, x ekstremal nuqta emas. Demak, agar $x \in A$ ekstremal nuqta bo'lsa, u holda barcha n sonlari uchun $|x_n| = 1$, ya'ni $x_n = \pm 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ mavjud bo'lganligidan, biror k nomyerdan boshlab,

$$x_n = 1 \quad \text{yoki} \quad x_n = -1. \quad (5.3)$$

Endi bu shartni qanoatlantiruvchi har bir nuqta ekstremal nuqta ekanligini ko'rsatamiz.

Aytaylik, $x \in A$ nuqtasi (5.3) shartni qanoatlantiradi va biror $y, z \in A$ uchun

$$x = \frac{1}{2}(y + z).$$

U holda so'ngi tenglikdan $y_n + z_n = \pm 2$ kelib chiqadi. Endi $|y_n|, |z_n| \leq 1$ ekanligini e'tiborga olsak, u holda $y_n = z_n = \pm 1$. Bundan $x = y = z$.

Demak, *c* fazoning birlik sharining ekstremal nuqtalari quyidagi ko'rinishdagi nuqtalardir: $x = (x_n) \in A$,

$$x_n = \begin{cases} \pm 1, & \text{agar } n < k, \\ 1, & \text{agar } n \geq k \end{cases}$$

va

$$x_n = \begin{cases} \pm 1, & \text{agar } n < k, \\ -1, & \text{agar } n \geq k, \end{cases}$$

bunda $k \in \mathbb{N}$.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. L chiziqli fazoning biror x va y elementlaridan iborat qism to'planning chiziqli qobig'i qanday bo'ladi?

2. Qanday chiziqli fazoda har qanday chiziqli qobiq fazoning o'zi bilan ustina-ust tushadi?

3. Agar chiziqli fazoning biror elementini shu fazoning e_1, e_2, \dots, e_n elementlarining chiziqli kombinatsiyasi orqali yagona usulda ifodalash mumkin bolsa, u holda e_1, e_2, \dots, e_n vektorlar chiziqli erkli bo'lishini isbotlang.

4. Agar e_1, e_2, \dots, e_n vektorlar chiziqli erkli bo'lsa, u holda bu sistemaning chiziqli qobig'iga tegishli ixtiyoriy elementni e_1, e_2, \dots, e_n vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi orqali yagona usulda yozish mumkin ekanligini isbotlang.

5. Har qanday chekli o'lchamli chiziqli fazo o'zining chekli sondagi vektorlarning chiziqli qobig'idan iborat ekanligini isbotlang.

6. Agar e_1, e_2, \dots, e_n vektorlar sistemasi \mathbb{K} maydon ustidagi L chiziqli fazoning bazisi bolsa, u holda L ning xohlagan x elementini

$$x = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k, \quad \alpha_k \in \mathbb{K}, \quad k = \overline{1, n}$$

ko'rinishda yozish yagona bo'lishini isbotlang.

7. Haqiqiy sonlar maydoni ustidagi haqiqiy koefitsientli barcha ko'phadilar fazosi cheksiz o'lchamli chiziqli fazo ekanligini isbotlang.

8. Ratsional sonlar maydoni ustida ratsional sonlar chiziqli fazoning o'lehami qanday?

9. Ratsional sonlar maydoni ustida kompleks sonlar chiziqli fazosida chiziqli erkli vektorlar sistemasini tuzing.

10. n -o'lchamli kompleks chiziqli fazoni haqiqiy chiziqli fazo sifatida qarasak, uming o'lchami qanday bo'ladi?

11. \mathbb{R}^n chiziqli fazoda ushlbu

$$S = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 = a_2\}$$

to'planning qism fazo ekanligini isbotlang. Bu fazoning o'lchamini toping.

$$2) \quad g(x_0) = \lambda.$$

12. \mathbb{R}^n fazoda birinchchi koordinatasi nolga teng bo'lgan nuqtalardan iborat qism fazoni S_0 orqali belgilasak, \mathbb{R}^n / S_0 faktor fazosini toping.

13. $C[-1, 1]$ fazoda berilgan quydagi funksionalarning chiziqli ekanligini isbotlang. Bu funksionalarning yadrosi haqida qanday fikr dasiz?

- a) $f(x) = \frac{1}{3}(x(-1) + x(1));$
- b) $f(x) = 2(x(1) - x(0));$
- c) $f(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k x(t_k)$, bunda $\alpha_k \in \mathbb{R}$, $k = \overline{1, n}$ va $t_1, t_2, \dots, t_n \in [-1, 1];$
- d) $f_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\varepsilon}[x(\varepsilon) + x(-\varepsilon) - 2x(0)], \quad \varepsilon \in [-1, 1];$

$$e) f(x) = \int_{-1}^1 x(t) dt;$$

$$f) f(x) = \int_{-1}^1 x(t) dt - x(0);$$

$$g) f(x) = \int_0^1 x(t) dt - \int_0^1 x(t) dt$$

$$h) f(x) = \int_{-1}^1 x(t) dt - \frac{1}{2n+1} \sum_{k=-n}^n x(\frac{k}{n}).$$

14. Quydagi funksionalarning chiziqli ekanligini isbotlang:

$$a) f(x) = \int_{-1}^1 tx(x) dt, \quad x \in C[-1, 1];$$

$$b) f(x) = \int_{-1}^1 tx(t) dt, \quad x \in C_2[-1, 1];$$

$$c) f(x) = \int_0^1 t^{-\frac{1}{2}} x(t) dt, \quad x \in C_2[0, 1];$$

$$d) f(x) = x_1 + x_2 \quad x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell_2;$$

$$e) f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k}, \quad x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell_2;$$

$$f) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{k}) x_k, \quad x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell_1;$$

$$g) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k+1} x_k, \quad x = (x_1, x_2, \dots) \in c_0;$$

$$h) f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \quad x = (x_1, x_2, \dots) \in c.$$

15. L chiziqli fazoming H giperqism fazosi berilgan bo'ssin. $x_0 \notin H$ element va $\lambda \neq 0$ son uchun quydagi ikki shartni qanoatlantiruvchi yagona g funksionali mavjud ekanligini ko'rsating:

$$1) \quad \ker g = H;$$

$$2) \quad g(x_0) = \lambda.$$

16. L chiziqli fazoda h va g chiziqli funksionalar berilgan bo'lib, $\ker h = \ker g$ bolsa, u holda $g = \alpha h$ tenglikni qanoatlantiruvchi $\alpha \in \mathbb{K}$

soni mavjuid ekanligini ko'rsating.

17. L chiziqli fazoda aniqlangan g chiziqli funksional berilgan bo'lsin. $L/\ker g$ faktor fazoning o'lchamini toping.

18. L chiziqli fazoda f, f_1, f_2, \dots, f_n chiziqli funksionallar berilgan bo'lsin. Agar $f_1(x) = f_2(x) = \dots = f_n(x) = 0$ bo'lishidan $f(x) = 0$ ekanligi kelib chiqsa, u holda a_1, a_2, \dots, a_n sonlari topilib, barcha $x \in L$ uchun $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x)$ tengligi o'rinchli bo'lishini isbotlang.

4.2. Normalangan fazolar

\mathbb{K} maydon ustidagi X chiziqli fazoning har bir x elementiga nomanifiy $\|x\|$ haqiqiy soni mos qo'yilgan bo'lib, bu moslik quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0;$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in X;$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, x, y \in X.$

U holda X fazoni *normalangan fazo* deb ataymiz. $\|x\|$ soni esa x elementning *normasi* deb ataladi.

Agar $\rho(x, y)$ bilan $\|x - y\|$ sonini belgilasak, u holda $\rho(x, y)$ metrika boladi. Haqiqatan,

- 1) $\rho(x, y) = \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x = y;$
- 2) $\rho(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \|y - x\| = \rho(y, x);$
- 3) $\rho(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = \rho(x, z) + \rho(z, y).$

Demak, ixtiyoriy normalangan fazo metrik fazo bo'ladi. Shuning uchun metrik fazolarda kiritilgan tushunchalarga normalangan fazolarda ham ta'rif berishga bo'ladi.

Aytaylik, X normalangan fazo va $x_0 \in X$ bo'lsin. Metrik fazolardagi kabi markazi x_0 nuqtada va radiusi $r > 0$ ga teng ochiq (yopiq) shar deb

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \quad (B[x_0, r] = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq r\})$$

to'plamga, markazi x_0 nuqtada va radiusi $r > 0$ ga teng *sfera* deb $S(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| = r\}$ to'plamga aytildi.

x_0 nuqtaning $\varepsilon > 0$ atrofi deb $B(x_0, \varepsilon)$ ochiq sharga aytamiz va uni $O_\varepsilon(x_0)$ kabi belgilaymiz. Atrof tushunchasi kiritilgandan keyin urinish, limit, yakkalangan nuqtalar; ketma-ketlikning yaqinlashuvchiligi, fundamental ketma-ketlik, to'plamning yopilmasi, to'plamning ichi, ochiq

to'plam, yopiq to'plam tushunchalariga metrik fazolardagi kabi ta'rif beriladi.

To'la normalangan fazo Banax fazosi deb ataladi.

Ta'rif. X Banax fazosi va $Y \subset X$ bo'lsin. Agar $[Y] = X$ bo'lsa, u holda X fazo Y fazoning to'ldiruvchisi deb ataladi.

L normalangan fazoning L_0 chiziqli qism fazosi yopiq bo'lsa, u holda L_0 to'plamni L fazoning *qism fazosi* deb ataymiz.

$\{x_\alpha\}$ sistemani o'z ichiga oluvchi eng kichik yopiq qism fazo, shu sistemaning *chiziqli qobig'i* deb ataladi va $\mathcal{L}(\{x_\alpha\})$ ko'rinishda belgilanadi. Agar $\mathcal{L}(\{x_\alpha\}) = L$ bo'lsa, u holda $\{x_\alpha\}$ sistema to'la deyiladi.

Masalalar

4.2.1. \mathbb{R} haqiqiy sonlar fazosida normani $\|x\| = |x|$ ko'rinishda kiritish mumkinligini ko'rsating.

Yechimi. Norma aksiomalarini tekshiramiz.

- 1) $\|x\| = |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- 2) $\|\lambda x\| = |\lambda x| = |\lambda||x| = |\lambda|\|x\|$;
- 3) $\|x + y\| = |x + y| \leq |x| + |y| = \|x\| + \|y\|$.

4.2.2. \mathbb{R}^n fazoda normani

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

ko'rinishda kiritish mumkinligini isbotlang.

Yechimi.

- 1) $\|x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
- 2) $\|\lambda x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (\lambda x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n \lambda^2 x_k^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{k=1}^n x_k^2} = |\lambda|\|x\|$;
- 3) Ixtiyoriy $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ elementlar uchun

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 \sum_{k=1}^n y_k^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (x_k y_i - y_k x_i)^2$$

tengligi o'rinali. Bu tenglikdan Koshi — Bunyakovskiy tengsizligi kelib chiqadi:

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \sum_{k=1}^n y_k^2.$$

Bu tengsizlikdan foydalansak,

$$\begin{aligned}
 \|x + y\|^2 &= \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n x_k y_k + \sum_{k=1}^n y_k^2 \leq \\
 &\leq \sum_{k=1}^n x_k^2 + 2 \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} + \sum_{k=1}^n y_k^2 = \\
 &= \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} \right)^2 = (\|x\| + \|y\|)^2
 \end{aligned}$$

munosabatiga ega bo'lamiz. Natijada,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

4.2.3. $C[a, b]$ fazosida normani

$$\|f\| = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)|$$

ko'rinishda kiritib, norma aksiomalarining bajarilshini tek-shiring.

Yechimi.

- 1) $\|f\| = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)| = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0;$
- 2) $\|\lambda f\| = \max_{a \leq t \leq b} |\lambda f(t)| = \max_{a \leq t \leq b} \{|\lambda| |f(t)|\} = |\lambda| \|f\|;$
- 3) Ixtiyoriy $f, g \in C[a, b]$ funksiyalar uchun

$$\begin{aligned}
 |(f + g)(t)| &= |f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \\
 &\leq \max_{a \leq t \leq b} |f(t)| + \max_{a \leq t \leq b} |g(t)| = \|f\| + \|g\|
 \end{aligned}$$

Natijada, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ tengsizlikka ega bo'lamiz.

4.2.4. X normalangan fazo bo'lib, M uning bo'sh bo'laman qism fazosi bo'lsin. $P = X/M$ faktor fazoda normani

$$\|\xi\| = \inf_{x \in \xi} \|x\|$$

ko'rinishda kiritish mumkinligini isbotlang.

Yechimi. 1) Agar $\xi_0 = M$ (ya'mi $\xi_0 - P$ ning nol elementi) bo'lsa, u holda $0 \in \xi_0$ (bu yerda $0 - X$ ning nol elementi). Shuning uchun $\|\xi_0\| = 0$. Aksincha, agar $\|\xi\| = \inf_{x \in \xi} \|x\| = 0$ bo'lsa, u holda ξ sinfdasi soniga yaqinlashuvchi ketma-ketlik mavjud bo'ladi. M yopiq bo'lgani uchun ξ sinf yopiq. Shuning uchun $0 \in \xi$, ya'ni $\xi = M$.

- 2) Ixtiyoriy $\alpha \in \mathbb{K}, x \in \mathbb{R}$ uchun

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$$

tengligi o'rini. Bu tenglikning ikki tomonidan ham $x \in \xi$ bo'yicha quyi chegara olib, quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$\|\alpha\xi\| = |\alpha| \cdot \|\xi\|$$

3) $\xi, \eta \in P$ bo'lib, $x \in \xi$ va $y \in \eta$ bo'lsin. U holda

$$\|\xi + \eta\| \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

tengsizligi bajariladi. Bu tengsizlikning o'ng tomonidan $x \in \xi$, $y \in \eta$ bo'yicha quyi chegara olib,

$$\|\xi + \eta\| \leq \|\xi\| + \|\eta\|$$

munosabatiga ega bo'lamiz.

4.2.5. $B(x_0, r)$ ochiq sharning ochiq to'plam ekanligini isbotlang.

Yechimi. $B(x_0, r)$ ochiq shardan ixtiyoriy x' nuqta olib, $B(x', \varepsilon) \subset B(x_0, r)$ munosabatni qanoatlantiruvchi $\varepsilon > 0$ sonning mavjudligini ko'rsatamiz. $\varepsilon = r - \|x' - x_0\|$ bo'lsin. $x' \in B(x_0, r)$ bo'lgani uchun $\|x' - x_0\| < r$. Shuning uchun $\varepsilon = r - \|x' - x_0\| > 0$. $B(x', \varepsilon)$ atrofdan ixtiyoriy x'' nuqta olaylik. U holda

$$\|x'' - x'\| < \varepsilon \Rightarrow \|x'' - x'\| < r - \|x' - x_0\| \Rightarrow \|x' - x_0\| + \|x'' - x'\| < r.$$

Bundan

$$\|x'' - x_0\| = \|x'' - x' + x' - x_0\| \leq \|x'' - x'\| + \|x' - x_0\| < r,$$

ya'ni

$$x'' \in B(x_0, r) \Rightarrow B(x', \varepsilon) \subset B(x_0, r).$$

4.2.6. $B[x_0, r]$ yopiq sharning yopiq to'plam ekanligini isbotlang.

Yechimi. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $B[x_0, r]$ yopiq shar yopiq to'plam bo'lmasin. U holda

$$[B[x_0, r]] \neq B[x_0, r] \Rightarrow [B[x_0, r]] \setminus B[x_0, r] \neq \emptyset.$$

$B[x_0, r] \setminus B[x_0, r]$ to'plamning ixtiyoriy x' nuqtasini olamiz. $x' \notin B[x_0, r]$ bo'lgani uchun $\|x' - x_0\| > r$ tengsizligi o'rini. $\varepsilon = \|x' - x_0\| - r$ bo'lgan x' nuqtaning $B(x', \varepsilon)$ atrofidan ixtiyoriy x'' nuqta olamiz. U holda

$$\|x'' - x'\| < \varepsilon \Rightarrow \|x'' - x'\| < \|x' - x_0\| - r \Rightarrow \|x' - x_0\| - \|x'' - x'\| > r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r < \|x' - x_0\| - \|x'' - x'\| \leq \|x'' - x_0\| \Rightarrow x'' \notin B[x_0, r] \Rightarrow x' \notin [B[x_0, r]].$$

Bu ziddiyat farazimizning noto‘g‘riligini anglatadi. Demak, $B[x_0, r]$ yopiq shar yopiq to‘plam bo‘ladi.

4.2.7. Agar $B[a, r] \subset B[b, R] \subset X$, $X \neq \{0\}$, bo‘lsa, u holda $\|a - b\| \leq R - r$ tengsizligini isbotlang.

Yechimi. 1-hol. $a = b$ bo‘lsin. $X \neq \{0\}$ ekanligidan, shunday $x_0 \in X$ mavjudki, $\|x_0 - a\| = r$ bo‘ladi. U holda $B[a, r] \subset B[a, R]$ bo‘lgani uchun $\|x_0 - a\| \leq R$ tengsizligi o‘rinli. Bundan

$$r = \|x_0 - a\| = \|x_0 - a\| \leq R,$$

$$\text{ya’ni } R - r \geq 0 = \|a - b\|.$$

2-hol. $a \neq b$ bo‘lsin. X fazoda

$$x = \frac{\|a - b\| + r}{\|a - b\|}a - \frac{r}{\|a - b\|}b$$

ko‘rinishdagi elementini olsak, $\|x - a\| = r$ tengligi o‘rinli bo‘ladi. Haqiqatan,

$$\|x - a\| = \left\| \frac{\|a - b\| + r}{\|a - b\|}a - \frac{r}{\|a - b\|}b - a \right\| = \frac{r}{\|a - b\|}\|a - b\| = r.$$

Bundan $x \in B[b, R]$. Demak, $\|x - b\| \leq R$, ya’ni

$$\begin{aligned} R &\geq \|x - b\| = \left\| \frac{\|a - b\| + r}{\|a - b\|}a - \frac{r}{\|a - b\|}b - b \right\| = \\ &= \frac{\|a - b\| + r}{\|a - b\|}\|a - b\| = \|a - b\| + r. \end{aligned}$$

Demak, $R - r \geq \|a - b\|$.

4.2.8. X normalangan fazoning ixtiyoriy x va y elementlari uchun $\|x\| \leq \max\{\|x + y\|, \|x - y\|\}$ tengsizligini isbotlang.

Yechimi.

$$\begin{aligned} \|x\| &\leq \|x\| + \frac{\|x - y\| - \|x + y\|}{2} = \\ &= \frac{\|2x\| + \|x - y\| - \|x + y\|}{2} = \\ &= \frac{\|x + y + x - y\| + \|x - y\| - \|x + y\|}{2} \leq \\ &\leq \frac{\|x + y\| + \|x - y\| + \|x - y\| - \|x + y\|}{2} = \\ &= \max\{\|x + y\|, \|x - y\|\}. \end{aligned}$$

4.2.9. X normalangan fazo bo'lib, $x_n, x, y_n, y \in X$, $n \in \mathbb{N}$, bo'lsa, quyidagilarni isbotlang:

- agar $x_n \rightarrow x$, $\lambda_n \rightarrow \lambda$ ($\lambda_n, \lambda \in \mathbb{K}$) bo'lsa, u holda $\lambda_n x_n \rightarrow \lambda x$;
- agar $x_n \rightarrow x$ bo'lsa, u holda $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$;
- agar $x_n \rightarrow x$ va $\|x_n - y_n\| \rightarrow 0$ bo'lsa, u holda $y_n \rightarrow x$;
- agar $x_n \rightarrow x$ bo'lsa, u holda $\|x_n - y\| \rightarrow \|x - y\|$;
- agar $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$ bo'lsa, u holda $\|x_n - y_n\| \rightarrow \|x - y\|$.

Yechimi. a)

$$\begin{aligned} \|\lambda_n x_n - \lambda x\| &= \|\lambda_n x_n - \lambda x_n + \lambda x_n - \lambda x\| \leq \\ &\leq \|\lambda_n x_n - \lambda x_n\| + \|\lambda x_n - \lambda x\| = \\ &= |\lambda_n - \lambda| \|x_n\| + |\lambda| \|x_n - x\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Demak, $\|\lambda_n x_n - \lambda x\| \rightarrow 0$, shuning uchun $\lambda_n x_n \rightarrow \lambda x$.

b) Normaning xossalardan foydalanib quyidagi tengsizliklarni yoza olainiz:

$$\|x_n\| - \|x\| \leq \|x_n - x\|$$

va

$$\|x\| - \|x_n\| \leq \|x - x_n\| = \|x_n - x\|.$$

Bu tengsizliklardan esa

$$-\|x_n - x\| \leq \|x_n\| - \|x\| \leq \|x_n - x\|$$

qo'sh tengsizliklariga ega bo'lamiz. Natijada

$$\|x_n\| - \|x\| \leq \|x_n - x\|.$$

$\|x_n - x\| \rightarrow 0$ bo'lgani uchun $\|x_n\| - \|x\| \rightarrow 0$, ya'ni $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

c)

$$\begin{aligned} \|y_n - x\| &= \|y_n - x_n + x_n - x\| \leq \\ &\leq \|y_n - x_n\| + \|x_n - x\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Shuning uchun $\|y_n - x\| \rightarrow 0$, ya'ni $y_n \rightarrow x$.

d) Normaning xossalardan quyidagi tengsizliklar kelib chiqadi:

$$\|x_n - y\| - \|x - y\| \leq \|x_n - y - x + y\| = \|x_n - x\|$$

va

$$\|x - y\| - \|x_n - y\| \leq \|x - y - x_n + y\| = \|x - x_n\| = \|x_n - x\|.$$

Natijada

$$-\|x_n - x\| \leq \|x_n - y\| - \|x - y\| \leq \|x_n - x\|$$

qo'sh tengsizlikka ega bo'lamiz, ya'ni

$$\|x_n - y\| - \|x - y\| \leq \|x_n - x\|.$$

$\|x_n - x\| \rightarrow 0$ bo'lgani uchun $\|x_n - y\| - \|x - y\| \rightarrow 0$. Bundan esa $\|x_n - y\| \rightarrow \|x - y\|$ ekanligi kelib chiqadi.

e) Normaning xossalardan quyidagi larga ega bo'lamiz:

$$\|x_n - y_n\| - \|x - y\| \leq \|x_n - y_n - x + y\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$$

va

$$\|x - y\| - \|x_n - y_n\| \leq \|x - y - x_n + y_n\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|.$$

Natijada

$$-(\|x_n - x\| + \|y_n - y\|) \leq \|x_n - y_n\| - \|x - y\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$$

qo'sh tengsizligiga ega bo'lamiz, ya'ni

$$\|x_n - y_n\| - \|x - y\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|.$$

$\|x_n - x\| \rightarrow 0$ va $\|y_n - y\| \rightarrow 0$ bo'lgani uchun, $\|x_n - y_n\| \rightarrow \|x - y\|$.

4.2.10. X normalangan fazoning A qism to'plami chegaralangan bo'lishi uchun diam $A < \infty$ bo'lishi zarur va yetarkili-gini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. A to'plam chegaralangan bo'lsa, $A \subset B(a, r)$ munosabati o'rinci bo'ladigan $B(a, r)$ shar mavjud bo'ladi. U holda

$$\text{diam } A = \sup_{x, y \in A} \|x - y\| \leq \sup_{x, y \in B(a, r)} \|x - y\| = 2r,$$

ya'ni $\text{diam } A < \infty$.

Yetariligi. $\text{diam } A = R < \infty$ bo'lsin. U holda ixtiyoriy $x \in A$ va tayinlangan $a \in A$ elementlari uchun $\|x - a\| \leq R$. Shuning uchun $A \subset B(a, R)$ munosabati o'rinci bo'ladi.

4.2.11. $A \subset X$ to'plamning barcha limit nuqtalari to'plamini A' orqali belgilaymiz. A' to'plamning yopiq ekanligini isbotlang.

Yechimi. $A' \subset [A']$ ekanligi limit nuqta ta'rifidan bevosita kelib chiqadi. $[A'] \subset A'$ ekanligini ko'rsatamiz. $x \in [A']$ b o'lsin. U holda x nuqtaning ixtiyoriy $B(x, \varepsilon)$ atrofida A' to'plamning kamida bitta y nuqtasi mavjud bo'ladi. Endi $\varepsilon_1 = \varepsilon - \|x' - y\|$ bo'lsin. y nuqtaning $B(y, \varepsilon_1)$ atrofi $B(x, \varepsilon)$ atrofining ichida yotadi. Haqiqatan, $z \in B(y, \varepsilon_1)$ bo'lsin. U holda $\|z - y\| < \varepsilon - \|y - x\|$ tengsizligi o'rinci bo'ladi. Natijada

$$\|z - x\| = \|z - y + y - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \varepsilon,$$

ya'ni $z \in B(x, \varepsilon)$.

$$B(y, \varepsilon_1) \subset B(x, r), \quad y \in A'$$

bo'lgani uchun, bu nuqtaning $B(y, \varepsilon_1)$ atrofida A to'plamning cheksiz ko'p elementlari topiladi. U holda $B(x, \varepsilon)$ atrofda A to'plamning cheksiz ko'p elementlari mavjud, ya'ni $x \in A'$. Shuning uchun $[A'] \subset A'$. Natijada $A' = [A']$ tengligi o'rinnli.

4.2.12. Quyidagi hollarda norma aksiomalari bajarilishini tekshiring:

a) $x = (x_k)_{k=1}^m$ ($x_k \in \mathbb{R}$) qatorlar fazosi \mathbb{R}^m da

$$\|x\| = \max_{1 \leq k \leq m} |x_k|.$$

Bu fazo \mathbb{R}_{∞}^m ko'rinishda belgilanadi.

b) $x = (x_k)_{k=1}^m$ qatorlar fazosida

$$\|x\| = \sum_{k=1}^m |x_k|.$$

Bu fazo \mathbb{R}_1^m ko'rinishda belgilanadi;

c) $x = (x_k)_{k=1}^m$ ($x_k \in \mathbb{R}$) ustunlar fazosida

$$\|x\| = \left[\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}}, \quad (p > 1).$$

Bu fazo \mathbb{R}_p^m ko'rinishda belgilanadi.

d) $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| < \infty$ shartni qanoatlantiruvchi $x = (x_1, x_2, \dots)$ ketma-ketliklar fazosida

$$\|x\| = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|.$$

Bu fazo ℓ_1 ko'rinishda belgilanadi;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 < \infty$ shartni qanoatlantiruvchi $x = (x_1, x_2, \dots)$ ($x_k \in \mathbb{R}$) ketma-ketliklar fazosida

$$\|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Bu fazo ℓ_2 ko'rinishda belgilanadi;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty$, ($p > 1$) shartni qanoatlan tiruvchi $x = (x_1, x_2, \dots)$, ($x_k \in \mathbb{R}$) ketma-ketliklar fazosida

$$\|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}}.$$

Bu fazo ℓ_p ko'rinishda belgilanadi;

g) $x = (x_1, x_2, \dots)$, ($x_k \in \mathbb{R}$) chegaralangan ketma-ketliklar fazosida

$$\|x\| = \sup_k |x_k|.$$

Bu fazo m ko'rinishda belgilanadi;

Yechimi.

a) 1) $\|x\| = \max_{1 \leq k \leq m} |x_k| \geq 0$,

$$\|x\| = \max_{1 \leq k \leq m} |x_k| = 0 \Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = \dots = |x_m| = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

2)

$$\|\lambda x\| = \max_{1 \leq k \leq m} |\lambda x_k| = \max_{1 \leq k \leq m} \{|\lambda||x_k|\} = |\lambda| \max_{1 \leq k \leq m} |x_k| = |\lambda|\|x\|.$$

3) Ixtiyoriy $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ uchun $|x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k|$ tengsizligi o'rnini bo'lganligidan, quyidagiga ega bo'lamic:

$$\|x + y\| = \max_{1 \leq k \leq m} |x_k + y_k| \leq \max_{1 \leq k \leq m} (|x_k| + |y_k|) \leq$$

$$\leq \max_{1 \leq k \leq m} |x_k| + \max_{1 \leq k \leq m} |y_k| = \|x\| + \|y\|$$

b) 1) $\|x\| = \sum_{k=1}^m |x_k| \geq 0$;

$$\|x\| = \sum_{k=1}^m |x_k| = 0 \Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = \dots = |x_m| = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

2)

$$\|\lambda x\| = \sum_{k=1}^m |\lambda x_k| = |\lambda| \sum_{k=1}^m |x_k| = |\lambda|\|x\|.$$

3)

$$\begin{aligned}\|x + y\| &= \sum_{k=1}^m |x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^m (|x_k| + |y_k|) = \\ &= \sum_{k=1}^m |x_k| + \sum_{k=1}^m |y_k| = \|x\| + \|y\|.\end{aligned}$$

c) 1) $\|x\| = \left[\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} \geq 0;$

$$\begin{aligned}\|x\| &= \left[\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sum_{k=1}^m |x_k|^p &= 0 \Leftrightarrow |x_1|^p = |x_2|^p = \dots = |x_m|^p = 0 \Leftrightarrow\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = \dots = |x_m| = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

2)

$$\begin{aligned}\|\lambda x\| &= \left[\sum_{k=1}^m |\lambda x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} = \sum_{k=1}^m (|\lambda|^p |x_k|^p)^{\frac{1}{p}} = \\ &= (|\lambda|^p \sum_{k=1}^m |x_k|^p)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|x\|.\end{aligned}$$

3) Uchinchi shartni tekshirishda Helder tengsizligidan foydalanamiz:

$$\sum_{k=1}^m |a_k b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^m |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^m |b_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad (4.3)$$

bu yerda $p > 1$ va $q > 1$ sonlari quyidagi shartni qanoatlantiradi:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \quad (4.4)$$

Endi ushbu tengsizlikning isbotini keltiramiz.

Agar (4.3) tengsizligi $a = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ va $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ elementlari uchun bajarilsa, u holda u αa va βb elementlari uchun ham o'rinni bo'ladi (bu yerda α va β lar ixtiyoriy sonlar), ya'ni bu tengsizlik bir jinsli. Shuning uchun ham uni

$$\sum_{k=1}^m |a_k|^p = \sum_{k=1}^m |b_k|^q = 1 \quad (4.5)$$


bo'lgan holda isbotlash yetarli. Natijada

$$\sum_{k=1}^m |a_k b_k| \leq 1 \quad (4.6)$$

tengsizlikni isbotlash lozim bo'ladi.

(ξ, η) tekisligida $\eta = \xi^{p-1}$ ($\xi > 0$), yoki bu tenglamaning o'zgacha shakli bo'lgan $\xi = \eta^{q-1}$ tenglama bilan berilgan egi chiziqni olamiz:

(7-rasm).



7-rasm

Rasmdan ko'rinish turganidek, a va b larning ixtiyoriy musbat qiymatlarida $S_1 + S_2 \geq ab$ tengsizligi o'rini bo'ladi. Aniq integraldan foydalanib, S_1 va S_2 yuzalarini hisoblaylik:

$$S_1 = \int_a^b \xi^{p-1} d\xi = \frac{a^p}{p},$$

$$S_2 = \int_a^b \eta^{q-1} d\eta = \frac{b^q}{q}.$$

Natijada $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ tengsizligiga ega bo'lamiz. Bu tengsizlikdagi aning orniga $|a_k|$ ni, b ning orniga $|b_k|$ ni qo'yamiz:

$$|a_k b_k| \leq \frac{|a_k|^p}{p} + \frac{|b_k|^q}{q} \quad (k = 1, m).$$

So'nggi tengsizliklarni hadma-had qo'shib, ya'ni k bo'yicha yig'sak, quyidagi ega bo'lamiz:

$$\sum_{k=1}^m |a_k b_k| \leq \sum_{k=1}^m \frac{|a_k|^p}{p} + \sum_{k=1}^m \frac{|b_k|^q}{q}. \quad (4.4)$$

Natijada, (4.4) va (4.5) munosabatlardan

$$\sum_{k=1}^m |a_k b_k| \leq 1$$

tengsizlikning o'rini ekanligi kelib chiqadi. Shu bilan (4.3) tengsizligi isbotlandi.

Endi normaning uchinchi shartini tekshiramiz. Buning uchun quyidagi tenglikni qaraymiz:

$$(|a| + |b|)^p = (|a| + |b|)^{p-1}|a| + (|a| + |b|)^{p-1}|b|.$$

Bu tenglikda a ni a_k bilan, b ni b_k bilan almashtirib, k soni 1 dan m gacha o'zgarganda hadma-had qo'shib,

$$\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^p = \sum_{k=1}^m ((|a_k| + |b_k|)^{p-1}(|a_k| + |b_k|)) =$$

$$= \sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{p-1}|a_k| + \sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{p-1}|b_k| \quad (4.7)$$

tengliga ega bo'lamiz. Helder tengsizligidan foydalanib,

$$\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{p-1}|a_k| \leq \left(\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{k=1}^m |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

va

$$\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{p-1}|b_k| \leq \left(\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum_{k=1}^m |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

tengsizliklarni yozamiz. Natijada, $(p-1)q = p$ tengligi va (4.7) dan

$$\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^p \leq \left(\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^p \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{k=1}^m |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^m |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right)$$

tengsizlik kelib chiqadi. Bu tengsizlikning ikki tononini ham

$$\left(\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

ifodaga bo'lsak:

$$\left(\sum_{k=1}^m (|a_k| + |b_k|)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^m |a_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^m |b_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

tengsizligiga ega bo'lamiz, ya'ni

$$\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|.$$

$$\text{d) } 1) \|x\| = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \geq 0,$$

$$\|x\| = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| = 0 \Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = \dots = |x_n| = \dots = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$2) \|\lambda x\| = \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda x_k| = |\lambda| \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| = |\lambda| \|x\|;$$

$$3) |x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k| \text{ tengsizligi, } \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \text{ va } \sum_{k=1}^{\infty} |y_k| \text{ qatorlarning yaqinlashishidan } \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k| \text{ qatorning yaqinlashuvchiligi kelib chiqadi.}$$

Natijada,

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_k + y_k| \leq \sum_{n=1}^{\infty} (|x_k| + |y_k|) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} |x_k| + \sum_{n=1}^{\infty} |y_k| = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

$$\text{e) } 1) \|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \right]^{\frac{1}{2}} \geq 0,$$

$$\|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \right]^{\frac{1}{p}} = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = \dots = 0 \Leftrightarrow x = 0;$

$$2) \|\lambda x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda x_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \left[\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \right]^{\frac{1}{2}} = |\lambda| \|x\|;$$

$$3) (x_k + y_k)^2 \leq 2(x_k^2 + y_k^2) \text{ tengsizligi hamda } \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \text{ va } \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 \text{ qator-$$

larning yaqinlashishidan $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k + y_k)^2$ qatorning ham yaqinlashuvchi elanligi kelib chiqadi. Shu bilan birga, ixtiyoriy n uchun

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}$$

tengsizligi o'rini. Bu tengsizlikning ikki tononidan ham $n \rightarrow \infty$ da limitiga o'tib quyidagi larga ega bo'lamiz:

$$\|x + y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} y_k^2} = \|x\| + \|y\|.$$

$$\text{f) } 1) \|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} \geq 0,$$

$$\|x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = \dots = 0 \Leftrightarrow x = 0;$$

$$2) \|\lambda x\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \left[\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|x\|.$$

3) Ixtiyoriy n uchun

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Minkovskiy tengsizligi o'rini, $\sum_{k=1}^n |x_k|^p$ va $\sum_{k=1}^n |y_k|^p$ qatorlarning yaqinlashuvchiligidan hamda yuqoridaq Minkovskiy tengsizligining ikki tononidan $n \rightarrow \infty$ da limit olib topamiz:

$$\|x + y\| = \left[\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p \right]^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \|x\| + \|y\|.$$

$$g) 1) \|x\| = \sup_k |x_k| \geq 0,$$

$$\begin{aligned} \|x\| = 0 &\Leftrightarrow |x_1| = |x_2| = \dots = |x_n| = \dots = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = \dots = 0 \Leftrightarrow x = 0. \end{aligned}$$

$$2) \|\lambda x\| = \sup_k \|\lambda x_k\| = |\lambda| \sup_k |x_k| = |\lambda| \|x\|;$$

3)

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sup_k |x_k + y_k| \leq \sup_k (|x_k| + |y_k|) \leq \\ &\leq \sup_k |x_k| + \sup_k |y_k| = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

4.2.13. *C[0, 1] fazosida $x_n(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{n+2}}{n+2}$ ketma-ketligining yaqinlashuvchi ekanligini isbotlang.*

Yechimi. $x_n(t)$ funksiya [0, 1] segmentda eng katta qiymatiga t=1 da erishadi:

$$\max_{a \leq t \leq b} x_n(t) = \frac{1}{(n+1)(n+2)},$$

ya'ni

$$\|x_n(t)\| = \max_{a \leq t \leq b} |x_n(t)| = \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

Natijada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(t)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 0.$$

Demak, berilgan ketma-ketlik yaqinlashuvchi.

4.2.14. *m va ℓ_1 fazolarga tegishli bo'lib, m da yaqinlashuvchi va ℓ_1 da uzoqlashuvchi bo'lgan*

$$x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots)$$

ketma-ketlikka misol keltiring.

Yechimi.

$$x^{(n)} = \left(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{2^n}, \frac{1}{2^n + 1}, \frac{1}{2^n + 2}, \dots, \frac{1}{2^n + 2^n}, 0, 0, \dots \right)$$

ketma-ketlikni qaraylik. $\sup_m |x_m^{(n)}| = \frac{1}{2^n + 1} < 1 < \infty$. Demak, $x^{(n)} \in m$. Shuningdek,

$$\sum_{m=1}^{\infty} |x_m^{(n)}| = \frac{1}{2^n + 1} + \frac{1}{2^n + 2} + \dots + \frac{1}{2^n + 2^n} <$$

$$< \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n}{2^n} = 1.$$

Demak, $x^{(n)} \in \ell_1$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^{(n)}\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_m |x_m^{(n)}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n + 1} = 0,$$

ya'ni, qaralayotgan ketma-ketlik m da 0 ga yaqinlashuvchi. Lekin bu ketma-ketlikning ℓ_1 da yaqimlashuvchi emas, chunki

$$\sum_{m=1}^{\infty} |x_m^{(n)}| \geq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n}{2^n} = 1.$$

4.2.15. *A va B A < B tengsizligini qanoatlantiruvchi sonlar bo'lsin. U holda*

$$E = \{f(x) : f(x) \in C[0, 1], \quad A < f(x) < B\}$$

to'plamning C[0, 1] fazosida ochiq ekanligini isbotlang.

Yechimi. E to'plamdan ixtiyoriy φ element olaylik. Segmentda uzlusiz funksiyaning xossasi bo'yicha φ funksiya $[0, 1]$ segmentda o'zining eng katta va eng kichik qiymatlariga erishadi:

$$\sup_{x \in [0, 1]} \varphi(x) = \beta = \varphi(x'), \quad \inf_{x \in [0, 1]} \varphi(x) = \alpha = \varphi(x''),$$

bunda $x', x'' \in [0, 1]$.

Shartga ko'ra ixtiyoriy $x \in [0, 1]$ uchun $A < \varphi(x) < B$ bo'ladi va $\alpha > A$ va $\beta < B$ tengsizliklari o'rinni. $\alpha - A$ va $\beta - B$ sonlarning kichigini ε orqali belgilaymiz. U holda barcha $x \in [0, 1]$ sonlar uchun $|\varphi(x) - (x)| < \varepsilon$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi $\psi(x)$ funksiyalar E to'plamga tegishli bo'ladi. Shuningdek $\varphi - \psi$ funksiyaning uzlusizligidan $\|\varphi(x) - \psi(x)\| < \varepsilon$ tengsizligiga ega bo'lamiz. Bu esa $\psi(x)$ funksiyalar $\varphi(x)$ funksiyaning ε atrofini tashkil etishini ko'rsatadi. Natijada, φ funksiya E dan olingan ixtiyoriy element bo'lgani uchun, E ning ochiq to'plam ekanligi kelib chiqadi.

4.2.16. *Normalangan fazoda qavariq to'plamning yopilmasi ham qavariq bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. X normalangan fazoda qavariq M to'plam berilsin. $[M]$ to'plamidan ixtiyoriy x, y nuqtalarni olganda, barcha $\alpha \in [0, 1]$ sonlar uchun $\alpha x + (1 - \alpha)y \in [M]$ ekanligini ko'rsatishimiz kerak. $x, y \in M$ bo'lganlididan, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun $\|x - u\| < \varepsilon$ va $\|y - v\| < \varepsilon$ tengsizliklarni qanoatlantiruvchi $u, v \in M$ elementlar mavjud bo'ladi.

M qavariq to‘plam bo‘lganligidan, har bir $\alpha \in [0, 1]$ uchun $\alpha u + (1 - \alpha)v \in M$. Natijada,

$$\begin{aligned} & \|\alpha x + (1 - \alpha)y - (\alpha u + (1 - \alpha)v)\| \leq \\ & \leq \alpha \|x - u\| + (1 - \alpha) \|y - v\| < \alpha \varepsilon + (1 - \alpha) \varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

Demak, $\alpha x + (1 - \alpha)y$ nuqtaning ixtiyoriy ε atrofida M to‘plamning kamida bir elementi mavjud ekan. Shuning uchun $\alpha x + (1 - \alpha)y \in [M]$, ya’ni $[M]$ qavariq to‘plam.

4.2.17. *Normalangan fazoda $B(x_0, r)$ sharning qavariq ekanligini isbotlang.*

Yechimi. $B(x_0, r)$ shardan ixtiyoriy x, y elementlarni olaylik. U holda $\|x - x_0\| < r$ va $\|y - x_0\| < r$ tengsizliklari o‘rinli bo‘ladi. Natijada har bir $\alpha \in [0, 1]$ uchun

$$\begin{aligned} & \|\alpha x + (1 - \alpha)y - x_0\| = \|\alpha x + (1 - \alpha)y - \alpha x_0 - (1 - \alpha)x_0\| \leq \\ & \leq \alpha \|x - x_0\| + (1 - \alpha) \|y - x_0\| < \alpha r + (1 - \alpha)r = r. \end{aligned}$$

Demak, $\alpha x + (1 - \alpha)y \in B(x_0, r)$, ya’ni $B(x_0, r)$ qavariq to‘plam.

4.2.18. *Normalangan fazoda $B[x_0, r]$ sharning qavariq ekanligini isbotlang.*

Yechimi. $B[x_0, r]$ shardan ixtiyoriy x, y elementlarni olaylik. U holda $\|x - x_0\| \leq r$ va $\|y - x_0\| \leq r$ tengsizliklari o‘rinli. Natijada har bir $\alpha \in [0, 1]$ uchun

$$\begin{aligned} & \|\alpha x + (1 - \alpha)y - x_0\| = \|\alpha x + (1 - \alpha)y - \alpha x_0 - (1 - \alpha)x_0\| \leq \\ & \leq \alpha \|x - x_0\| + (1 - \alpha) \|y - x_0\| \leq \alpha r + (1 - \alpha)r = r. \end{aligned}$$

Demak, $\alpha x + (1 - \alpha)y \in B[x_0, r]$, ya’ni $B[x_0, r]$ qavariq to‘plam.

4.2.19. *Normalangan fazoda $S(x_0, r)$ sfera qavariq to‘plam bo‘ladimi?*

Yechimi. $S(x_0, r)$ sferadan ixtiyoriy x element olamiz. U holda $y = 2x_0 - x$ nuqta ham shu sferaga tegishli bo‘ladi. Haqiqatan,

$$\|x_0 - (2x_0 - x)\| = \|x_0 - x\| = r.$$

Endi x va y elementlarni tutashtiruvchi segmentdan $\frac{1}{2}(x + y)$ nuqtani olamiz. Natijada

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(2x_0 - x) = x_0$$

va

$$\|x_0 - x_0\| = 0 < r$$

bo‘lgani uchun quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \notin S(x_0, r),$$

Demak, $S(x_0, r)$ sfera qavariq to‘plain emas.

4.2.20. *C[0, 1] fazoda darajasi k ga teng barcha ko‘phadlarning $P_k[0, 1]$ to‘plami qavariq bo‘ladimi?*

Yechimi.

$$P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_0$$

va

$$Q_k(x) = -a_k x^k + b_{k-1} x^{k-1} + \dots + b_0$$

ko‘phadlarni olaylik.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}P_k(x) + \frac{1}{2}Q_k(x) = \\ & = \frac{1}{2}(a_{k-1} + b_{k-1})x^{k-1} + \frac{1}{2}(a_{k-2} + b_{k-2})x^{k-2} + \dots + \frac{1}{2}(a_0 + b_0) \end{aligned}$$

ko‘phadning darajasi $k - 1$ ga teng, ya’ni $P[0, 1]$ qavariq to‘plam emas.

4.2.21. *C[0, 1] fazosida $\int_0^1 |x(t)| dt \leq 1$ tengsizlikni qanoat-lantiruvchi C uzluksiz funksiyalar to‘plami qavariq boladimi?*

Yechimi. C to‘plamdan ixtiyoriy $x(t)$ va $y(t)$ funksiyalarni olaylik. U holda barcha $\alpha \in [0, 1]$ sonlari uchun quyidagi munosabat o‘rinli:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 |\alpha x(t) + (1 - \alpha)y(t)| dt \leq \int_0^1 (|x(t)| + (1 - \alpha)|y(t)|) dt = \\ & = \alpha \int_0^1 |x(t)| dt + (1 - \alpha) \int_0^1 |y(t)| dt \leq \alpha + 1 - \alpha = 1. \end{aligned}$$

Deinak, C qavariq to‘plam.

4.2.22. *ℓ_2 fazosida*

$$A = \{x \in \ell_2 : x = (x_1, x_2, \dots), |x_n| < 2^{-n+1}, n \in \mathbb{N}\}$$

parallelepipedning qavariq to‘plam ekanligini isbotlang.

Yechimi. A to‘plamdan ixtiyoriy x, y elementlar olaylik. U holda har bir $\alpha \in [0, 1]$ uchun

$$|\alpha x_n + (1 - \alpha)y_n| \leq \alpha|x_n| + (1 - \alpha)|y_n| < \alpha 2^{-n+1} + (1 - \alpha)2^{-n+1} = 2^{-n+1}$$

bo‘ladi va shuning uchun $\alpha x + (1 - \alpha)y \in A$. Demak, A qavariq to‘plam.

4.2.23. $C[a, b]$ fazosining separabel fazo ekanligini isbotlang.

Yechimi. $C[a, b]$ fazosida zich bo'lgan sanoqli qism to'plam mavjudligini ko'rsatamiz.

Har bir n natural soni uchun $[a, b]$ kesimani

$$x_0^{(n)} = a, \quad x_1^{(n)} = a + \frac{b-a}{n}, \quad x_2^{(n)} = a + 2\frac{b-a}{n}, \dots, \quad x_n^{(n)} = b$$

nuqtalar yordamida n bo'laklarga bo'lamiz. Ixtiyoriy

$$a_0^{(n)}, a_1^{(n)}, \dots, a_n^{(n)}$$

ratsional sonlar uchun

$$\varphi(x) = a_{i-1}^{(n)} + \frac{x - x_{i-1}^{(n)}}{x_i^{(n)} - x_{i-1}^{(n)}}(a_i^{(n)} - a_{i-1}^{(n)}), \quad x \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}], \quad i = \overline{1, n} \quad (4.8)$$

bo'lakli-chiziqli funksiyani quramiz. Har bir n uchun (4.8) ko'rinishdagi barcha funksiyalar to'plamini A_n orqali belgilaymiz. Har bir A_n sanoqli ekanligidan, $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ birlashmasi ham sanoqlidir.

Bu A to'plamining $C[a, b]$ da zich ekanligini ko'rsatamiz. $C[a, b]$ ga tegishli har bir f funksiya $[a, b]$ da tekis uzlusiz bo'lganligi uchun $\forall \varepsilon > 0$ uchun $\exists \delta > 0$ soni topilib, $|x' - x''| < \delta$ tengsizligini qanoatlantiruvchi barcha $x', x'' \in [a, b]$ nuqtalarda

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{5}$$

tengsizligi o'rinli bo'ladi. Har bir $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ uchun

$$|f(x_i^{(n)}) - a_i^{(n)}| < \frac{\varepsilon}{5}$$

tengsizligini qanoatlantiruvchi

$$a_0^{(n)}, a_1^{(n)}, \dots, a_n^{(n)}$$

ratsional sonlar olib, (4.8) ko'rinishdagi φ funksiyasini qaraylik. Ixtiyoriy $x \in [a, b]$ uchun shunday $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ topilib, $x \in [x_{i-1}^{(n)}, x_i^{(n)}]$ bo'ladi. U liolda quyidagilar o'rinli:

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x_{i-1}^{(n)})| &\leq |\varphi(x_i^{(n)}) - \varphi(x_{i-1}^{(n)})| \leq \\ &\leq |\varphi(x_i^{(n)}) - f(x_i^{(n)}) + f(x_i^{(n)}) - f(x_{i-1}^{(n)}) + f(x_{i-1}^{(n)}) - \varphi(x_{i-1}^{(n)})| \leq \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq |\varphi(x_i^{(n)}) - f(x_i^{(n)})| + |f(x_i^{(n)}) - f(x_{i-1}^{(n)})| + |f(x_{i-1}^{(n)}) - \varphi(x_{i-1}^{(n)})| = \\ &= |a_i^{(n)} - f(x_i^{(n)})| + |f(x_i^{(n)}) - f(x_{i-1}^{(n)})| + |f(x_{i-1}^{(n)}) - a_{i-1}^{(n)}| < \\ &< \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} = \frac{3\varepsilon}{5}. \end{aligned}$$

Natijada,

$$|\varphi(x) - f(x)| \leq |\varphi(x) - \varphi(x_{i-1}^{(n)})| +$$

$$+ |\varphi(x_{i-1}^{(n)}) - f(x_{i-1}^{(n)})| + |f(x_{i-1}^{(n)}) - f(x)| < \frac{3\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} + \frac{\varepsilon}{5} = \varepsilon.$$

Shunday qilib, $\|\varphi - f\| < \varepsilon$, ya'ni f funksiyining ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ atrofida A to'plamning kamida bitta φ elementi mavjud. f funksiya $C[a, b]$ ga tegishli bo'lган ixtiyoriy element bo'lгани учун $[A] = C[a, b]$ bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek A sanoqli to'plam. Shuning учун $C[a, b]$ fazosi separabel bo'ladi.

4.2.24. X normalangan fazoda $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketligining biror $\{x_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketligi yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketligining yaqinlashuvchi bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $\{x_n\}$ fundamental ketma-ketlik bo'lгани sababli, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni учун shunday n'_ε soni topilib, $n, n_k \geq n'_\varepsilon$ tengsizligini qanoatlantiruvchi natural sonlari учун $\|x_n - x_{n_k}\| < \frac{\varepsilon}{2}$ tengsizligi o'rинli bo'ladi. Shartga muvofiq $\{x_{n_k}\}$ qismiy ketma-ketlik yaqinlashuvchi va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ bo'lsin. U holda $\varepsilon > 0$ soni учун shunday n''_ε natural soni mavjud bo'lib, $n_k \geq n''_\varepsilon$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlar учун $\|x_{n_k} - a\| < \varepsilon/2$ tengsizligi o'rинli bo'ladi. $\max(n'_\varepsilon, n''_\varepsilon) = n_\varepsilon$ bo'lsin. U holda $n, n_k \geq n_\varepsilon$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar учун quyidagi munosabat o'rинли

$$\begin{aligned} \|x_n - a\| &= \|x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a\| \leq \\ &\leq \|x_n - x_{n_k}\| + \|x_{n_k} - a\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Demak, $\{x_n\}$ ketma-ketlik yaqinlashuvchi va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

4.2.25. X normalangan fazoda $\{x_n\}$ ketma-ketligi учун $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_{n+1} - x_n\|$ qatori yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketlikning fundamental ketma-ketlik ekanligini isbotlang.

Yechimi. $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_{n+1} - x_n\|$ qator yaqinlashuvchi bo'lganligi sababli, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday n_{ε} natural soni mavjud bo'lib, $n > n_{\varepsilon}$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha natural sonlari va ixtiyoriy $p \in \mathbb{N}$ soni uchun quyidagi tengsizlik o'rinni

$$\|x_{n+1} - x_n\| + \|x_{n+2} - x_{n+1}\| + \dots + \|x_{n+p} - x_{n+p-1}\| < \varepsilon.$$

Bundan esa,

$$\begin{aligned} \|x_{n+p} - x_n\| &= \\ &= \|x_{n+p} - x_{n+p-1} + x_{n+p-1} - x_{n+p-2} + x_{n+p-2} - \dots - x_n\| \leq \\ &\leq \|x_{n+1} - x_n\| + \|x_{n+2} - x_{n+1}\| + \dots + \|x_{n+p} - x_{n+p-1}\| < \varepsilon \end{aligned}$$

ekanligi kelib chiqadi. Demak, berilgan ketma-ketlik fundamental.

4.2.26. $\{x_n\}$ va $\{y_n\}$ X normalangan fazoda fundamental ketma-ketliklar bo'lsin. U holda $\lambda_n = \|x_n - y_n\|$, $n = 1, 2, \dots$ ketma-ketlikning yaqinlashuvchi ekanligini isbotlang.

Yechimi. $\{x_n\}$ va $\{y_n\}$ fundamental ketma-ketliklar bo'lganligi sababli, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday n_{ε} soni mavjud bo'lib $n \geq n_{\varepsilon}$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha n natural sonlar va ixtiyoriy $p \in \mathbb{N}$ soni uchun $\|x_{n+p} - x_n\| < \frac{\varepsilon}{2}$ va $\|y_{n+p} - y_n\| < \frac{\varepsilon}{2}$ tengsizliklari o'rinni. Natijada quyidagi tengsizlikka ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} |\lambda_{n+p} - \lambda_n| &= ||\|x_{n+p} - y_{n+p}\| - \|x_n - y_n\|| \leq \\ &\leq \|x_{n+p} - y_{n+p} - x_n + y_n\| \leq \|x_{n+p} - x_n\| + \|y_{n+p} - y_n\| < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Demak, $\{\lambda_n\}$ fundamental ketma-ketlik. \mathbb{R} haqiqiy sonlar to'plami to'laligidan $\{\lambda_n\}$ ketma-ketlikning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi.

4.2.27. \mathbb{R} da norma aksiomalarini tekshiring $\|x\| = |\arctg x|$.

Yechimi. Normaning ikkinchi aksiomasi o'rinni emas. Haqiqatan, agar $x = \sqrt{3}$, $\lambda = \frac{1}{3}$ bo'lsa, u holda

$$\|\lambda x\| = \arctg \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\pi}{6},$$

lekin

$$|\lambda| \|x\| = \frac{1}{3} \arctg \sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{9},$$

ya'ni $\|\lambda x\| \neq |\lambda| \|x\|$.

4.2.28. \mathbb{R}^n , $n \geq 2$, fazosida $\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}$, $0 < p < 1$ bo'lsa, normaning shartini bajarilmasligini ko'rsating.

Yechimi. Normaning uchinchi sharti o'rini emas. Haqiqatan, $x = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0\right) \in \mathbb{R}^n$ va $y = \left(0, \frac{1}{2}, 0, \dots, 0\right) \in \mathbb{R}^n$ vektorlarni olaylik. $x \neq y$ bo'lgani bilan, lekin ixtiyoriy $0 < p < 1$ va $\|x\|_p + \|y\|_p = 1$ uchun $\|x\|_p = \|y\|_p = \frac{1}{2}$. Lekin

$$\|x + y\|_p = \left\| \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots, 0 \right) \right\|_p = \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} \right)^{\frac{1}{p}} = 2^{\frac{1}{p}-1}.$$

Natijada $\|x + y\|_p > \|x\|_p + \|y\|_p$.

4.2.29. *C [a, b] fazoda norma aksiomalarini tekshiring, bunda*

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq \frac{a+b}{2}} |x(t)|.$$

Yechimi. Normaning birinchi sharti bajarilmaydi. Haqiqatan,

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{agar } t \in [a, \frac{a+b}{2}], \\ t - \frac{a+b}{2}, & \text{agar } t \in [\frac{a+b}{2}, b] \end{cases}$$

elementi uchun $\|x\| = 0$, lekin $x \neq 0$.

4.2.30. *Normalangan L₁[0, 1] fazoda*

$$x_n(t) = \begin{cases} e^{-\frac{t}{n}}, & \text{agar } t \in \mathbb{I} \cap [0, 1], \\ 0, & \text{agar } t \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \end{cases}$$

ketma-ketligining yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsating.

Yechimi.

$$\begin{aligned} \|x_n - 1\| &= \int_0^1 |x_n(t) - 1| dt = \int_0^1 (1 - e^{-\frac{t}{n}}) dt = \\ &= 1 - \int_0^1 e^{-\frac{t}{n}} dt = 1 - \frac{e^{-\frac{t}{n}} - 1}{-\frac{1}{n}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Mustaqil ish uchun masalalar

1. X normalangan fazoda $\{x_n\}$ ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Agar shunday c soni mavjud bo'lib, barcha $n \in \mathbb{N}$ uchun $\|x_n\| \leq c$ tengsizligi bajarilsa, u holda $\|x_n\|$ ketma-ketlik chegaralangan deb ataladi. X fazoda ixtiyoriy yaqinlashuvchi ketma-ketlikning chegaralanganligini isbotlang.

2. $\forall x, y \in X$ elementleri uchun quyidagilarni isbotlang:

- a) $\|x + y\| \geq \|x\| - \|y\|$;
- b) $\|x\| \leq \max\{\|x + y\|, \|x - y\|\}$.

3. Norma aksiomalarını tekshiring: $[a, b]$ segmentda barcha chegaralangan funktsiyalar fazosi $M[a, b]$ da

$$\|x\| = \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|.$$

4. $C[0, 1]$ fazosida quyidagi ketma-ketliklarni yaqinlashuvchilikká tekshiring:

- a) $x_n(t) = t^n - t^{n+1}$,
b) $y_n(t) = t^n - t^{n+1}$.

5. M normalangan fazoning qism fazosi bo'lsın. Agar L to'la bo'lsa, $P = L/M$ faktor fazoning ham to'la bo'lishini isbotlang.

6. X chiziqli fazosida $\|\cdot\|_1$ va $\|\cdot\|_2$ normalar berilgan bo'lsin. Agar sinunday $a, b > 0$ sonlar mayjud bo'lib, ixtiyoriy $x \in X$ uchun

$$a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$$

tengsizligi o'rinnli bo'lsa, u holda $\|\cdot\|_1$ va $\|\cdot\|_2$ normalar ekvivalent deb ataladi. Chekli o'lchanli X fazodagi ixtiyoriy ikki norma ekvivalent bo'lishini isbotlang.

7. X normalangan fazoda $x \neq 0$, $y \neq 0$ elementlar uchun $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ tenglik faqalgina $y = \lambda x$ ($\lambda > 0$) bo'lgan holda o'rinnli bo'lsa, u holda X qat'iy normalangan fazo deb ataladi. $\ell_1, \ell_2, m, C[0, 1]$ fazolarning qaysi biri q'a'tiy normalangan fazo bo'ladи.

8. Agar A va B to'plamlar X fazosining qavariq qism to'plamlari bo'lsa $A \cap B$ va

$$A + B = \{x : x = y + z, y \in A, z \in B\}$$

to'plamlari ham qavariq to'plam bo'lishini isbotlang.

9. Normalangan fazoda ixtiyoriy fundamental ketma-ketlikning chegaralanganligini isbotlang.

10. $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}_\infty^m, \mathbb{R}_1^m, \mathbb{R}_p^m, \ell_1, \ell_2, \ell_p, m, c_0$ fazolarning orasida Banax fazosi borni?

12. Ixtiyoriy chekli o'lchanli normalangan fazoning Banax fazosi bo'lishini isbotlang.

13. Banax fazosining qism fazosi Banax fazosi bo'lishini isbotlang.

14. Ixtiyoriy normalangan fazo yangona to'diruvchiga ega ekanligini isbotlang.

4.3. Evklid va Hilbert fazoları

Haqiqiy L chiziqli fazosining $\{x, y\}$ juft elementlarida aniqlangan, $\langle x, y \rangle$ korinishda belgilanuvchi va quyidagi to'rt shartlarni (aksioma-

$$\cos \varphi = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Evklid fazosida skalyar ko'paytma yordamida x va y vektorlar orasida burchak tushunchasi quyidagicha aniqlanadi:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

larni) qanoatlanuvchi funksiya skalyar ko'paytma deb ataladi:

- 1) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
2) $\langle x_1 + x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \langle x_2, y \rangle$;
3) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$, $\lambda \in \mathbb{R}$;

- 4) $\langle x, x \rangle \geq 0$; $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Skalyar ko'paytma kiritilgau chiziqli fazoda normani

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

ko'rnishda kiritish mumkin. Bu normalangan fazo *Evklid fazosi* deyiladi. Norma aksiomalarini tekshiramiz:

- 1) $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = 0 \Leftrightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2)

$$\begin{aligned} \|\lambda x\| &= \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda \langle x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda} \langle x, x \rangle = \\ &= \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|; \end{aligned}$$

- 3) Xohlagan λ son uchun

$$\langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle \geq 0.$$

Bundan

$$\lambda^2 \langle x, x \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \geq 0.$$

Demak, kvadrat uchhadning determinantni manfydr:

$$D = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0,$$

ya'ni $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$, yoki

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Oxirgi tengsizlik Koshi — Bunyakovskiy tengsizligi deb ataladi. Bu tengsizlikdan foydalanimiz, ushbu

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

tengsizligiga ega bo'lamiz. Natijada

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

$\langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|$ bo'lgani uchun, $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \leq 1$. Demak, (4.9) formula nolga teng bo'lmagan x va y vektorlar orasidagi φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$) bur-chakni aniqlaydi.

Agar $\langle x, y \rangle = 0$ bo'lsa, u holda x va y vektorlar *ortogonal* deb ataladi va $x \perp y$ ko'rinishda yoziladi. Bu holda (4.9) dan $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ekanligi kelib chiqadi.

L evklid fazosida noldan farqli vektorlarning $\{x_\alpha\}$ sistemasi berilgan bo'lib, $\alpha \neq \beta$ bo'lganda $\langle x_\alpha, x_\beta \rangle = 0$ bo'lsa, u holda $\{x_\alpha\}$ *ortogonal sistema* deb ataladi.

Agar $\{x_\alpha\}$ ortogonal sistema to'la bo'lsa, u holda u *ortogonal bazis* deyiladi.

Agar $\{x_\alpha\}$ sistema uchun

$$\langle x_\alpha, x_\beta \rangle = \begin{cases} 0, & \text{agar } \alpha \neq \beta, \\ 1, & \text{agar } \alpha = \beta \end{cases}$$

sharti o'rini bo'lsa, u holda u *ortonormal sistema* deb ataladi.

Ta'rif. To'la evklid fazosi Hilbert fazosi deb ataladi va u odatda H bilan belgilanadi.

H Hilbert fazosida $\{x_\alpha\}$ ortonormal sistema berilgan bo'lsin. $x \in H$ elementi uchun

$$c_\alpha = \langle x, x_\alpha \rangle$$

sonlar, berilgan ortonormal sistema bo'yicha Fure koeffitsientlari deb ataladi. Ushbu $\sum_\alpha c_\alpha x_\alpha$ qator bo'lsa, x elementning *Fure qatori* deyiladi.

Masalalar

4.3.1. ℓ_2 fazosida skalyar ko'paytmani

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$$

ko'rinishda kiritish mumkin ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ qatorning yaqinlashishi

$$2x_k y_k \leq x_k^2 + y_k^2$$

tengsizligidan kelib chiqadi.

Skalyar ko'paytma aksionalarini tekshiramiz.

$$1) \langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k = \sum_{k=1}^{\infty} y_k x_k = \langle y, x \rangle;$$

2)

$$\begin{aligned}\langle x' + x'', y \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} (x'_k + x''_k) y_k = \sum_{k=1}^{\infty} (x'_k y_k + x''_k y_k) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} x'_k y_k + \sum_{k=1}^{\infty} x''_k y_k = \langle x', y \rangle + \langle x'', y \rangle.\end{aligned}$$

$$3) \langle \lambda x, y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda x_k y_k = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k = \lambda \langle x, y \rangle;$$

$$4) \langle x, x \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 \geq 0,$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = \dots = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

4.3.2. ℓ_2 Evklid fazosida

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0, \dots),$$

$$e_2 = (0, 1, \dots, 0, \dots),$$

.....

$$e_n = (0, 0, \dots, 1, \dots),$$

.....

ortonormal bazisning to‘la ekanligini ko‘rsating.

Yechimi. $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell_2$ xohlagan element va

$$x^{(n)} = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots)$$

bo‘lsin. U holda $x^{(n)}$ element e_1, e_2, \dots, e_n vektorlarning chiziqli qobiqiga tegishli va $n \rightarrow \infty$ da $\|x - x_n\| \rightarrow 0$, ya’ni $x \in [\mathcal{L}(\{e_n\})]$. Demak, $[\mathcal{L}(\{e_n\})] = \ell_2$.

4.3.3. $[a, b]$ segmentda barcha uzluksiz funksiyalar fazosida skalyar ko‘paytmani

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt \quad (4.10)$$

ko‘rinishda kiritish mumkin ekanligini ko‘rsating.

Yechimi. Skalyar ko‘paytma aksiomalarini tekshiramiz.

$$1) \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt = \int_a^b g(t)f(t) dt = \langle g, f \rangle;$$

2)

$$\begin{aligned} \langle f_1 + f_2, g \rangle &= \int_a^b (f_1(t) + f_2(t))g(t) dt = \\ &= \int_a^b f_1(t)g(t) dt + \int_a^b f_2(t)g(t) dt = \langle f_1, g \rangle + \langle f_2, g \rangle; \\ 3) \quad \langle \lambda f, g \rangle &= \int_a^b \lambda f(t)g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t)g(t) dt = \lambda \langle f, g \rangle; \\ 4) \quad \langle f, f \rangle &= \int_a^b f^2(t) dt \geq 0, \quad \langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(t) dt = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0. \end{aligned}$$

Bu fazo $C_2[a, b]$ ko'rinishda belgilanadi.

4.3.4. $C_2[a, b]$ Evklid fazosida

$$\frac{1}{2}, \cos \frac{2\pi nt}{b-a}, \sin \frac{2\pi nt}{b-a}, \quad n = 1, 2, \dots$$

funksiyalardan iborat sistema ortogonal sistema ekanligini tekshiring.

Yechimi. Mumkin bo'lgan barcha hollarni tekshirib ko'ramiz:

1)

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2}, \cos \frac{2\pi nt}{b-a} \right\rangle &= \int_a^b \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi nt}{b-a} dt = \frac{1}{4} \frac{b-a}{\pi n} \sin \frac{2\pi nt}{b-a} \Big|_a^b = \\ &= \frac{1}{2} \frac{b-a}{\pi n} \cos \frac{2\pi n(a+b)}{b-a} \sin \pi n = 0; \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{2}, \sin \frac{2\pi nt}{b-a} \right\rangle &= \int_a^b \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi nt}{b-a} dt = -\frac{1}{4} \frac{b-a}{\pi n} \cos \frac{2\pi nt}{b-a} \Big|_a^b = \\ &= \frac{1}{4} \frac{b-a}{\pi n} \sin \frac{\pi n(a+b)}{b-a} \sin \pi n = 0; \end{aligned}$$

3)

$$\left\langle \cos \frac{2\pi nt}{b-a}, \sin \frac{2\pi nt}{b-a} \right\rangle = \int_a^b \cos \frac{2\pi nt}{b-a} \sin \frac{2\pi nt}{b-a} dt = \frac{1}{2} \int_a^b \sin \frac{4\pi nt}{b-a} dt =$$

$$= -\frac{1}{8} \frac{b-a}{\pi n} \cos \frac{4\pi nt}{b-a} \Big|_a^b = \frac{1}{4} \frac{b-a}{\pi n} \sin \frac{2\pi n(a+b)}{b-a} \sin 2\pi n = 0;$$

4)

$$\begin{aligned} \left\langle \cos \frac{2\pi nt}{b-a}, \cos \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} \right\rangle &= \int_a^b \cos \frac{2\pi nt}{b-a} \cos \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \cos \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} dt + \frac{1}{2} \int_a^b \cos \frac{2\pi nt}{b-a} dt = 0 \end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned} \left\langle \cos \frac{2\pi nt}{b-a}, \sin \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} \right\rangle &= \int_a^b \cos \frac{2\pi nt}{b-a} \sin \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b \sin \frac{2\pi t(n+k)}{b-a} dt + \frac{1}{2} \int_a^b \sin \frac{2\pi kt}{b-a} dt = 0; \end{aligned}$$

6)

$$\begin{aligned} \left\langle \sin \frac{2\pi nt}{b-a}, \sin \frac{2\pi(n+k)t}{b-a} \right\rangle &= \int_a^b \sin \frac{2\pi nt}{b-a} \sin \frac{2\pi(n+k)t}{b-a} dt = \\ &= \frac{1}{4} \frac{b-a}{\pi} \left(\frac{1}{k} \sin \frac{2\pi kt}{b-a} - \frac{1}{2n+k} \sin \frac{2\pi t(2n+k)}{b-a} \right) \Big|_a^b = 0; \end{aligned}$$

7)

$$\left\langle \sin \frac{2\pi nt}{b-a}, \cos \frac{2\pi(n+k)}{b-a} \right\rangle = 0.$$

Demak, qaralayotgan sistema ortogonal bo'lar ekan.

4.3.5. L evklid fazosida

$$f_1, f_2, \dots, f_n, \dots \quad (4.11)$$

chiziqli erkli sistema berilgan bo'lsin. U holda quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \dots \quad (4.12)$$

sistema mavjudligini isbotlang:

- 1) (4.12) sistema ortonormal;
 2) har bir φ_n element $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ elementlarning chiziqli kombinatsiyasidan iborat, ya'ni

$$\varphi_n = a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + \dots + a_{nn}f_n;$$

- 3) har bir f_n element $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ elementlarning chiziqli kombinatsiyasidan iborat, ya'ni

$$f_n = b_{n1}\varphi_1 + b_{n2}\varphi_2 + \dots + b_{nn}\varphi_n$$

va $b_{nn} \neq 0$. (4.12) sistemaning har bir elementi 1) - 3) shartlar bilan bir qiyamatli aniqlanadi (± 1 koeffitsientlarini hisobga olmaganda).

Yechimi. φ_1 elementni $\varphi_1 = a_{11}f_1$ ko'rinishda izlaymiz. Bunda a_{11} quyidagi shart bilan aniqlanadi:

$$\langle \varphi_1, \varphi_1 \rangle = \|\varphi_1\|^2 = a_{11}^2(f_1, f_1) = 1.$$

Bundan

$$a_{11} = \frac{1}{b_{11}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{\langle f_1, f_1 \rangle}}, \quad \varphi_1 = \frac{\pm f_1}{\sqrt{\langle f_1, f_1 \rangle}}.$$

Shunday qilib, φ_1 elementning ishorasi hisobga olinmasa, u bir qiyamatli aniqlanadi. Endi 1) – 3) shartlarni qanoatlantiruvchi $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}$ elementlar topiladi deb faraz qilamiz. U holda f_n elementni ushbu

$$f_n = b_{n1}\varphi_1 + b_{n2}\varphi_2 + \dots + b_{nn-1}\varphi_{n-1} + h_n$$

ko'rinishda yozish mumkin. Bu yerda $k < n$ bo'lganda

$$\langle h_n, \varphi_k \rangle = 0.$$

Haqiqatan, b_{nk} koeffitsientlar. Demak, h_n element ham quyidagi shartlar bilan bir qiyamatli aniqlanadi:

$$\begin{aligned} \langle h_n, \varphi_k \rangle &= \langle f_n - b_{n1}\varphi_1 - \dots - b_{nn-1}\varphi_{n-1}, \varphi_k \rangle = \\ &= \langle f_n, \varphi_k \rangle - b_{nk}\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle = 0. \end{aligned}$$

$\langle h_n, h_n \rangle > 0$ ekanligi ravshan ($\langle h_n, h_n \rangle = 0$ tengligi (4.1) sistemaning chiziqli erkiligidiga zid bo'lар edi). Endi φ_n elementni quyidagicha olamiz:

$$\varphi_n = \frac{h_n}{\sqrt{\langle h_n, h_n \rangle}}.$$

Natijada h_n va φ_n elementlar induksiya yordamida f_1, f_2, \dots, f_n elementlar orqali ifodalanadi:

$$\varphi_n = a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + \dots + a_{nn}f_n,$$

bu yerda $a_{nn} = \frac{1}{\sqrt{\langle h_n, h_n \rangle}}$. Shu bilan birga,

$$\langle \varphi_n, \varphi_n \rangle = 1, \langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = 0,$$

$$f_n = b_{n1}\varphi_1 + b_{n2}\varphi_2 + \dots + b_{nn}\varphi_n, \quad b_{nn} = \sqrt{\langle h_n, h_n \rangle} \neq 0.$$

(4.11) sistemadan (4.12) sistemaga o'tish ortogonallashtirish jarayoni deb ataladi.

4.3.6. L Evklid fazosida $\{x_n\}$ va $\{y_n\}$ ketma-ketliklari berilgan bo'lib, $x_n \rightarrow x$ va $y_n \rightarrow y$ bo'lsa, u holda $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ ekanligini isbotlang.

Yechimi. Koshi — Bunyakovskiy tengsizligiga ko'ra

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_n, y_n \rangle| &= |\langle x, y \rangle - \langle x, y_n \rangle + \langle x, y_n \rangle - \langle x_n, y_n \rangle| \leq \\ &\leq |\langle x, y \rangle - \langle x, y_n \rangle| + |\langle x, y_n \rangle - \langle x_n, y_n \rangle| = \\ &= |\langle x, y - y_n \rangle| + |\langle x - x_n, y_n \rangle| \leq \\ &\leq \|x\| \|y - y_n\| + \|x - x_n\| \|y_n\|. \end{aligned}$$

Yaqinlashuvchi $\{y_n\}$ ketma-ketlik chegaralangan bo'lgani uchun, tengsizlikning o'ng tomoni $n \rightarrow \infty$ da nolga intiladi. Shu sababli, $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$. Bundan skalyar ko'paytmaning uzluksizligi kelib chiqadi.

4.3.7. L Evklid fazosining xohlagan x va y elementlari uchun parallelogramm tengligi deb ataluvchi

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

tengligining o'rinali ekanligini isbotlang.

Yechimi. Norma ta'rifiiga ko'ra

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \\ &= 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \end{aligned}$$

4.3.8. Skalyar ko'paytmaning to'rtinchisi aksiomasini quyidagi aksioma bilan almashtirish mumkin ekanligini isbotlang:

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Yechimi. $x = 0$ bo'lsin. U holda xohlagan λ soni uchun

$$\langle 0, 0 \rangle = \langle \lambda 0, 0 \rangle = \lambda \langle 0, 0 \rangle$$

tengligini yoza olamiz. Natijada $\langle 0, 0 \rangle = 0$ ekanligi kelib chiqadi.

4.3.9. Skalyar ko'paytma kiritilgan fazoning xohlagan x, y, z elementlari uchun Apolloniy ayniyati deb ataluvchi

$$\|z - x\|^2 + \|z - y\|^2 = \frac{1}{2} \|x - y\|^2 + 2 \left\| z - \frac{x + y}{2} \right\|^2$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. Berilgan tenglikning ikki tomonini ham almashtiramiz:

$$\begin{aligned} \|z - x\|^2 + \|z - y\|^2 &= \langle z - x, z - x \rangle + \langle z - y, z - y \rangle = \\ &= \langle z, z \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, x \rangle + \langle x, x \rangle + \\ &\quad + \langle z, z \rangle - \langle y, z \rangle - \langle z, y \rangle + \langle y, y \rangle = \\ &= 2(\langle z, z \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, y \rangle) + \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle. \\ \frac{1}{2} \|x - y\|^2 + 2 \left\| z - \frac{x + y}{2} \right\|^2 &= \frac{1}{2} \langle x - y, x - y \rangle + \\ &\quad + 2 \left\langle z - \frac{x + y}{2}, z - \frac{x + y}{2} \right\rangle = \\ &= \frac{1}{2} (\langle x, x \rangle - \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle) + \\ &\quad + 2 \langle z, z \rangle - \langle x + y, z \rangle - \langle z, x + y \rangle + \frac{1}{2} \langle x + y, x + y \rangle = \\ &= 2(\langle z, z \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, y \rangle) + \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle. \end{aligned}$$

Demak, berilgan tenglik o'rini.

4.3.10. Evklid fazosida x va y elementlarning ortogonal bo'lishi uchun

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2$$

tengligining zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi.. Zarurligi. $x \perp y$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2. \end{aligned}$$

Yetarliligi. $\|x\|^2 + \|y\|^2 = \|x + y\|^2$ tenligi o'rini bo'lsa, $\langle x, y \rangle = 0$ tengligi kelib chiqadi, ya'ni $x \perp y$.

4.3.11. ℓ_2 fazoda $x = (x_1, x_2, \dots)$ va $y = (y_1, y_2, \dots)$ elementlarning skalyar ko‘paytmasi

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$$

ko‘rinishda, norma $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ko‘rinishda kiritiladi. ℓ_2 ning to‘la ekanligini isbotlang.

Yechimi. ℓ_2 fazoda metrika

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2}$$

formula bilan aniqlanadi. Demak, 3.1.14-misolga ko‘ra ℓ_2 ning to‘la ekanligi kelib chiqadi.

4.3.12. K to‘plam H ning qism fazosi bo‘lsa, u holda xohlagan $f \in H$ elementni

$$f = g + h \quad g \in K, \quad h \in K^\perp, \quad (4.13)$$

ko‘rinishda yagona usulda yozish mumkin ekanligini va g elementning

$$\|f - g\| = \rho(f, K) \quad (4.14)$$

tenglikni qanoatlantirishini isbotlang. Bunda $\rho(f, K)$ miqdor f nuqtadan K fazogacha masofa:

$$\rho(f, K) = \inf_{x \in K} \|f - x\|.$$

Yechimi. $\rho(f, K) = d$ belgilashini kiritib, K dan

$$\|f - f_n\|^2 < d^2 + \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (4.15)$$

tengsizlikni qanoatlantiruvchi $\{f_n\}$ ketma-ketlligini olamiz. Parallelogramm tengligiga ko‘ra

$$\|f_n - f_m\|^2 + \|(f - f_n) + (f - f_m)\|^2 = 2[\|f - f_n\|^2 + \|f - f_m\|^2] \quad (4.16)$$

tengligiga ega bo‘lamiz. Shu bilan birga, $\frac{f_m + f_n}{2} \in K$ bo‘lganligidan, ushbu

$$\|(f - f_n) + (f - f_m)\|^2 = 4 \left\| f - \frac{f_n - f_m}{2} \right\|^2 \geq 4d^2 \quad (4.17)$$

tengsizligi o'rini. Natijada (4.15), (4.16) va (4.17) lardan

$$\|f_n - f_m\|^2 \leq 2 \left[d^2 + \frac{1}{n^2} + d^2 + \frac{1}{m^2} \right] - 4d^2 = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{m^2}.$$

Bu tengsizlikdan $\{f_n\}$ ketina-ketlikning fundamental ekanligi ko'rinadi. Shu sababli, H to'la bo'lgani uchun, u yaqinlashuvchi. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = g$ bo'lsin. K yopiq bo'lgani uchun $g \in K$.

Endi (4.15) da $n \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak $\|f - g\| \leq d$ tengsizligiga ega bo'lamiz. d ning ta'rifidan $\|f - g\| \geq d$ tengsizligi ham o'rini. Natijada, $\|f - g\| = d$ tengligi kelib chiqadi.

Endi $f - g = h$ elementning H^\perp fazosiga tegishli ekanligini isbotlaymiz.

K to'plamda noldan farqli xohlagan φ element olaylik. Har bir λ son uchun $g + \lambda\varphi \in K$, u holda

$$\|h - \lambda\varphi\|^2 = \|f - (g + \lambda\varphi)\|^2 \geq d^2.$$

Bu tengsizlikni skalyar ko'paytmaning xossasidan va $\|f - g\| = d$ tenglididan foydalanimiz

$$-\lambda\langle h, \varphi \rangle - \lambda\langle \varphi, h \rangle + |\lambda|^2\langle \varphi, \varphi \rangle \geq 0$$

ko'rinishda yozishi mumkin. Natijada $\lambda = \frac{\langle h, \varphi \rangle}{\langle \varphi, \varphi \rangle}$ bo'lgan xususiy holda

$$-\frac{|\langle h, \varphi \rangle|^2}{\langle \varphi, \varphi \rangle} - \frac{|\langle h, \varphi \rangle|^2}{\langle \varphi, \varphi \rangle} + \frac{|\langle h, \varphi \rangle|^2}{\langle \varphi, \varphi \rangle} \geq 0$$

tengsizligi, ya'ni $|\langle h, \varphi \rangle|^2 \leq 0$ tengsizligi kelib chiqadi. Bu tengsizlik faqat $h \perp \varphi$ bo'lgan holda o'rini. Demak, φ element K ning xohdagan elementi bo'lganligidan, $h \perp K$, ya'ni $h \in K^\perp$.

Shunday qilib f ning (4.13) ko'rinishda ifodalanishi va uning (4.14) tenglikni qanoatlantirilishi isbotlandi.

Endi f ni (4.13) ko'rinishda ifodalash yagonaligini ko'rsatamiz. Agar

$$f = g + h = g' + h', \quad g, g' \in K, \quad h, h' \in K^\perp$$

bo'lsa, u holda $g - g' = h' - h$ tengligiga ega bo'lamiz. Bu tenglikning chap tomonidagi element K ga, o'ng tomonidagi element K^\perp fazosiga tegishli. Shu sababli $g - g' \perp h' - h$. Bundan $g - g' = h' - h = 0$ munosabatiga ega bo'lamiz.

4.3.13. x element Fure qatorining $s_n = \sum_{k=1}^n a_k x_k$ qismi, x elementning $H_n = \mathcal{L}(\{x_1, x_2, \dots, x_n\})$ qism fazodagi proektsiyasi dan iborat ekanligini isbotlang.

Yechimi. $x = s_n + (x - s_n)$ bo'lib, $s_n \in H_n$ bo'lganligi uchun $x - s_n \perp H_n$ ekanligini ko'rsatish yetarli.

$$\langle x - s_n, x_k \rangle = \langle x, x_k \rangle - \langle s_n, x_k \rangle = a_k - a_k = 0,$$

ya'ni

$$x - s_n \perp x_k, \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

bo'lgani uchun $x - s_n \perp H_n$ ekanligi skalyar ko'paytmaning xossalardan kelib chiqadi.

4.3.14. Hilbert fazosida Bessel tengsizligi deb ataluvchi

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 \leq \|x\|^2$$

tengsizligini isbotlang.

Yechimi.

$$\begin{aligned} \|s_n\|^2 + \|x - s_n\|^2 &= \langle s_n, s_n \rangle + \langle x - s_n, x - s_n \rangle = \\ &= \langle s_n, s_n \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, s_n \rangle = \\ &= \left\langle \sum_{k=1}^n a_k x_k, \sum_{k=1}^n a_k x_k \right\rangle + \langle x, x \rangle - \left\langle x, \sum_{k=1}^n a_k x_k \right\rangle = \\ &= \sum_{k=1}^n a_k^2 + \langle x, x \rangle - \sum_{k=1}^n a_k^2 = \langle x, x \rangle = \|x\|^2 \end{aligned}$$

tengligidan $\|x\|^2 \geq \|s_n\|^2$ tengsizligi, ya'ni $\sum_{k=1}^n a_k^2 \leq \|x\|^2$ tengsizligi kelib chiqadi. Bu tengsizligida $n \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 \leq \|x\|^2$$

tengsizligiga ega bo'lamiz.

4.3.15. (Riss — Fisher teoremasi) *H Hilbert fazosida xohlagan $\{\varphi_n\}$ ortonormal sistema va $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < \infty$ shartni qanoatlantiruvchi $\{c_n\}$ sonlar ketma-ketligi berilgan bo'lsin. U holda ushbu*

$$c_k = \langle f, \varphi_k \rangle;$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \langle f, f \rangle = \|f\|^2$$

tengliklarni qanoatlantiruvchi $f \in H$ element mavjudligini isbotlang.

Yechimi. $f_n = \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k$ deb olaylik, u holda

$$\begin{aligned}\|f_{n+p} - f_n\|^2 &= \|c_{n+1}\varphi_{n+1} + \dots + c_{n+p}\varphi_{n+p}\|^2 = \\ &= \langle c_{n+1}\varphi_{n+1} + \dots + c_{n+p}\varphi_{n+p}, c_{n+1}\varphi_{n+1} + \dots + c_{n+p}\varphi_{n+p} \rangle = \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k^2.\end{aligned}$$

Natijada $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < \infty$ bo'lgani uchun $\{f_n\}$ ketma-ketlik fundamental, Demak, yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ bo'lsin. Endi $\langle f, \varphi_i \rangle$ ni quyidagicha almashtiramiz:

$$\langle f, \varphi_i \rangle = \langle f_n, \varphi_i \rangle + \langle f - f_n, \varphi_i \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k, \varphi_i \right\rangle + \langle f - f_n, \varphi_i \rangle.$$

$n \geq i$ bo'lganda, $\left\langle \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k, \varphi_i \right\rangle = c_i$ bo'lgani uchun,

$$\langle f, \varphi_i \rangle = c_i + \langle f - f_n, \varphi_i \rangle. \quad (4.18)$$

Endi

$$\langle f - f_n, \varphi_i \rangle \leq \|f - f_n\| \cdot \|\varphi_i\|$$

tengsizligi o'rinali bo'lganligi uchun $n \rightarrow \infty$ da $\langle f - f_n, \varphi_i \rangle \rightarrow 0$. (4.18) ning chap tomoni n ga bog'liq emas. Shu sababli, bu tenglikda $n \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak $\langle f, \varphi_i \rangle = c_i$ tengligiga ega bo'lamiz.

$$\left\langle f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k, f - \sum_{k=1}^n c_k \varphi_k \right\rangle = \langle f, f \rangle - \sum_{k=1}^n c_k^2$$

tengligini tekshirish qiyin emas. $n \rightarrow \infty$ da $\|f - f_n\| \rightarrow 0$ bo'lganligidan, bu tenglikdan

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \langle f, f \rangle$$

tengligi kelib chiqadi.

4.3.16. H separabel Hilbert fazosida har qanday ortonormal sistema ko'pi bilan sanoqli bo'lishini isbotlang.

Yechimi. H separabel Hilbert fazosida $\{\varphi_\alpha\}$ ortonormal sistema berilgan bo'lsin. U holda ixtiyorli φ_α va φ_β har xil elementlari uchun

$\|\varphi_\alpha - \varphi_\beta\| = \sqrt{2}$ tengligi o'rini bo'ladi. Shuning uchun $B(\varphi_\alpha, \frac{1}{2})$ sharlari o'zaro kesishmaydi. Agar sanoqli $\{\psi_n\}$ to'plami H da zichi bo'lsa, u holda $B(\varphi_\alpha, \frac{1}{2})$ sharning har birida bu to'plamning kamida bir elementi mavjud bo'ladi. Shu sababli $B(\varphi_\alpha, \frac{1}{2})$ sharlar sistemasi ko'pi bilan sanoqli. Natijada $\{\varphi_\alpha\}$ ortonormal sistemaning sanoqli ekanligi kelib chiqadi.

4.3.17. *H Hilbert fazosida x_1, x_2, \dots, x_n ortogonal sistema berilgan bo'lsin. Agar $x = \sum_{k=1}^n x_k$ bo'lsa, u holda $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2$ tengligini isbotlang.*

Yechimi.

$$\begin{aligned}\|x\|^2 &= \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n x_k, \sum_{k=1}^n x_k \right\rangle = \\ &= \langle x_1, x_1 \rangle + \langle x_2, x_2 \rangle + \dots + \langle x_n, x_n \rangle = \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2.\end{aligned}$$

4.3.18. *H Hilbert fazosining x elementi $L \subset H$ qism fazoga ortogonal bo'lishi uchun xohlagan $y \in L$ uchun $\|x\| \leq \|x - y\|$ tengsizlikning o'rini bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Zarurligi. $x \perp L$ bo'lsin. U holda xohlagan $y \in L$ uchun $\langle x, y \rangle = 0$ tengligi o'rini. Shuning uchun

$$\begin{aligned}\|x - y\|^2 &= \langle x - y, x - y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 \geq \|x\|^2.\end{aligned}$$

Yetarliligi. $\|x\| \leq \|x - y\|$ tengsizligidan $2\langle x, y \rangle \leq \langle y, y \rangle$ tengsizligi kelib chiqadi. x elementni $x = h + h'$ ko'rinishda yozib olamiz, bunda $h \in L$, $h' \in L^\perp$. Natijada

$$\langle x, y \rangle = \langle h + h', y \rangle = \langle h, y \rangle + \langle h', y \rangle = \langle h, y \rangle.$$

Shu sababli $2\langle h, y \rangle \leq \langle y, y \rangle$ tengsizligini yoza olamiz. Bu tengsizlik barcha $y \in L$ uchun o'rini bo'lganligi uchun $y = h$ bo'lganda ham o'rini bo'ladi. Shunday qilib $2\langle h, h \rangle \leq \langle h, h \rangle$ tengsizligiga ega bo'lamiz. Bu tengsizlik $\langle h, h \rangle = 0$ bo'lgandagina o'rini. U holda $x = h'$, ya'ni $x \in L^\perp$. Demak, $x \perp L$.

4.3.19. *H Hilbert fazosida xohlagan M qism to'plami uchun $M \subset (M^\perp)^\perp$ munosabatining o'rini ekanligini isbotlang.*

Yechimi. M to'plamidan ixtiyoriy x nuqtani olamiz. U holda $x \perp M^\perp$, ya'nı $x \in (M^\perp)^\perp$. Demak, $M \subset (M^\perp)^\perp$.

4.3.20. *H Hilbert fazosida M, N to'plamlari uchun $M \subset N$ bo'lsa, $M^\perp \supset N^\perp$ munosabatining o'rinni ekanligini isbotlang.*

Yechimi. N^\perp to'plamidan ixtiyoriy x nuqtani olamiz. U holda $x \perp N$. $M \subset N$ bo'lganlididan, $x \perp M$, ya'nı $x \in M^\perp$. Demak, $N^\perp \subset M^\perp$.

4.3.21. *Hilbert fazoda polyarlashtirish tengligning o'rinni ekanligi isbotlang:*

$$\langle x, y \rangle = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} + i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4}$$

Yechimi. 1)

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \\ &= \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle \overline{x + y}, \overline{x} \rangle + \langle \overline{x + y}, \overline{y} \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + \overline{\langle y, x \rangle} + \overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle \overline{x}, \overline{y} \rangle + \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \langle x - y, x - y \rangle = \\ &= \langle x, x - y \rangle - \langle y, x - y \rangle = \overline{\langle x - y, x \rangle} - \overline{\langle x - y, y \rangle} = \\ &= \langle x, x \rangle - \overline{\langle y, x \rangle} - \overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

1) va 2) tengliklardan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4} &= \frac{2\langle x, y \rangle + 2\overline{\langle x, y \rangle}}{4} = \\ &= \frac{2[\langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle}]}{4} = Re(x, y) \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned} \|x + iy\|^2 &= \langle x + iy, x + iy \rangle = \\ &= \langle x, x + iy \rangle + i\langle y, x + iy \rangle = \\ &= \overline{\langle x + iy, x \rangle} + i\overline{\langle x + iy, y \rangle} = \\ &= \langle x, x \rangle - i\overline{\langle y, x \rangle} + i\overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle = \\ &= \langle x, x \rangle - i\langle x, y \rangle + i\overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle \end{aligned}$$

4)

$$\|x - iy\|^2 = \langle x - iy, x - iy \rangle =$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle x, x - iy \rangle - i\langle y, x - iy \rangle \overline{\langle x - iy, x \rangle} - i\overline{\langle x - iy, y \rangle} = \\
 &= \langle x, x \rangle + i\overline{\langle y, x \rangle} - i\overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle = \\
 &= \langle x, x \rangle + i\langle x, y \rangle - i\overline{\langle x, y \rangle} + \langle y, y \rangle
 \end{aligned}$$

3) va 4) tengliklardan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned}
 i \frac{\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2}{4} &= \frac{i[-2i\langle x, y \rangle + 2i\overline{\langle x, y \rangle}]}{4} = \\
 &= \frac{2[\langle x, y \rangle - \overline{\langle x, y \rangle}]}{4} = iIm(x, y)
 \end{aligned}$$

Natijada

$$Re(x, y) + iIm(x, y) = (x, y)$$

munosabati o'rnlili.

4.3.22. Quyidagi normalangan fazolarning Evklid fazosi bo'lmashligini isbotlang:

- a) ℓ_p , ($p \geq 1, p \neq 2$) fazosi;
- b) $C[0, 1]$ fazosi.

Yechimi. a) ℓ_p ($p \geq 1, p \neq 2$) fazosida $x = (1, 1, 0, \dots)$, $y = (1, -1, 0, \dots)$ vektorlarni qaraymiz. U holda

$$x + y = (2, 0, \dots), \quad x - y = (0, 2, 0, \dots)$$

va

$$\|x\| = \|y\| = 2^{\frac{1}{p}}, \quad \|x - y\| = \|x + y\| = 2$$

bo'lganligi sababli

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

parallelogramm tengligi o'rnlili bo'lmaydi.

b) $C[0, 1]$ fazosida $x(t) = \frac{1}{2}$, $y(t) = \frac{1}{2}t$ elementlarni qaraymiz. Ushbu

$$\|x\| = \|y\| = \frac{1}{2}, \quad \|x - y\| = \frac{1}{2}, \quad \|x + y\| = 1$$

munasobatlardan parallelogramm tengligi o'rnlili bo'lmaydi.

4.3.23. Hilbert fazosida $\|x\| = \|y\|$ bo'lsa, u holda $x - y \perp x + y$ (romb diagonallari perpendikulyar) bo'lishini ko'rsating.

Yechimi.

$$\begin{aligned}
 \langle x + y, x - y \rangle &= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, y \rangle = \\
 &= \|x\|^2 - \|y\|^2 = \|x\|^2 - \|x\|^2 = 0.
 \end{aligned}$$

Mustaqil ish uchun masalalar

1. $C_2[a, b]$ fazosida

$$\frac{1}{2}, \cos \frac{2\pi nt}{b-a}, \sin \frac{2\pi nt}{b-a}, n = 1, 2, \dots$$

ortogonal sistemaniнг то'лаеканлигини ишботланг.

2. Separabel bo'lmagan Evklid fazosiga misol keltiring.

3. Har qanday cheksiz o'lchamli separabel Evklid fazosida sanoqli ортонормал базисинг маъjud еканлигини ишботланг.

4. Birorta ham ортogonal базисга ега эмас separatbel bo'lmagan evklid fazosiga misol keltiring.

5. To'la Evklid fazosida ортонормал базисинг маъjud еканлигини ишботланг.

6. Evklid fazosida xohlagan x, y, z, t elementlar uchun ушбуу

$$\|x - z\| \cdot \|y - t\| \leq \|x - y\| \cdot \|z - t\| + \|y - z\| \cdot \|x - t\|$$

tengsizligining о'rинли еканлигини ишботланг.

7. Haqiqiy L normalangau fazosining xohlagan x, y elementlari ушун ушбуу

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

parallelogram tengligi о'rинли bo'lsin. Unda

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

formula $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ tenglikni qanoatlaniruvchi skalyar ko'paytmani aniqlashini ишботланг.

8. $C[0, 1]$ да $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$ tenglikni qanoatlaniradigan skalyar ko'paytmani aniqlash mumkin emas еканлигини ишботланг.

9. L Evklid fazosi bo'lib $x, y_1, y_2 \in L$ elementlar uchun $x \perp y_1$ va $x \perp y_2$ munosabatlар о'rинли bo'lsa, у holda x оллаган α va β sonlar uchun $x \perp (\alpha y_1 + \beta y_2)$ munosabatning о'rинли еканлигини ишботланг.

10. L Evklid fazosining x elementi $A \subset L$ то'planning har bir elementiga ортogonal bo'lsa, у holda x element A то'плинига ортogonal дейилади ва $x \perp A$ ко'ринишда belgilanadi. Agar $x \perp A$ bo'lsa, у holda $x \perp [\mathcal{L}(A)]$ еканлигини ишботланг.

11. L Evklid fazosidagi A qism то'planning har bir elementiga ортogonal bo'lgan барча элементлар то'плини A ning ортogonal то'дирувчиси deb atayniz va A^\perp орқали belgilaymiz. A^\perp то'плам L ning qism fazosi bo'лшини ишботланг.

12. Evklid fazosining то'дирувчиси ham Evklid fazosi bo'лшини исботланг.

13. Hilbert fazosining qa'tiy normalangau fazo еканлигини ишботланг.

14. M va N лар H Hilbert fazosining qism fazolari bo'lib, $M \perp N$ bo'lsa, у holda $M + N$ то'planning ham qism fazo bo'лшини ишботланг.

15. ℓ_2 fazoda shundak M то'plamiga misol keltiringki, $M + M^\perp$ то'плини ℓ_2 bilan teng bo'lmasin.

16. ℓ_2 da berilgan ushbuу

$$x_k = \left(1, \frac{1}{2^k}, \frac{1}{2^{2k}}, \frac{1}{2^{3k}}, \dots \right), \quad k \in \mathbb{N}$$

ketma-ketlikning chiziqli qobig'i l_∞ ning hamma yerida zich еканлигини ишботланг.

17. H Hilbert fazosida yopiq qavariq M то'плами берилган bo'lsin. M то'пламада eng kichik normaga ega elementning bor еканлигини ишботланг.

18. ℓ_2 fazoda normasi eng kichik normaga teng elementi bo'lmagan yopiq то'плам тузинг.

19. $[a, b]$ segmentda barcha uzlusiz differentiallanuvchi funksiyalar $\overline{H}_1[a, b]$ fazosida skalyar ko'paytmani

$$\langle x, y \rangle = \int_a^b [x(t)y(t) + x'(t)y'(t)] dt$$

ко'ринишда aniqlaymiz. $\overline{H}_1[a, b]$ Hilbert fazosi bo'ladimi?

- X fazoning *hanma yerida zinch to'plam* — yopilmasi X fazoga teng bo'lgan to'plam;

- **Separabel fazo**, — hamma yerida zinch sanqqli qism to'planga ega fazo.

Berilgan X to'plamning qism to'plamlaridan iborat turli sistemalar topologiya shartlarini qanoatlantirishi, ya'ni X to'plamda turli topologiyalar kiritilishi mumkin. Bunda turli topologik fazolar hosil bo'ladi.

X to'plamda τ_1, τ_2 topologiyalar berilgan bo'lib, $\tau_1 \subset \tau_2$ umnosabat o'rinni bo'lsa, u holda τ_2 topologiya τ_1 topologiyaga nisbatan *kuchliroq* topologiya deyiladi va, $\tau_1 \leq \tau_2$ ko'rinishda yoziladi. Bu holda τ_1 topologiya ni τ_2 topologiyaga nisbatan *kuchsizroq* (*sustroq*) ham deyiladi.

X topologik fazoda ochiq to'plamlardan iborat \mathcal{B} sistema berilgan bo'lsin. Agar X fazodagi har bir ochiq to'plami \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lsa, u holda \mathcal{B} sistemani X fazodagi *topologiyaning bazasi* deb ataladi. Sanqqli bazaga ega bo'lgan topologik fazoga *sanqqli bazaga ega fazo* yoki *sanqqlikning ikkinchi aksiomasi qanoatlantiruvchi fazo* deyiladi.

$x \in X$ muqtaning biror atroflaridan iborat sistemasi \mathcal{B}_x orqali belgilaylik. Agar x nuqtani o'z ichiga oluvchi ixtiyoriy U ochiq to'plam uchun, shunday $V \in \mathcal{B}$ to'plam topilib, $V \subset U$ bo'lsa, u holda \mathcal{B}_x sistema x nuqta atroflarining *aniglovlchi sistemasi* deb ataladi. Agar sanqqli \mathcal{B}_x sistema mavjud bo'lsa, u holda x nuqtada *sanqqlikning birinchи aksiomasi* bajarilgan deyiladi. Agar X fazoning har bir nuqtasida sanqqlikning birinchи aksiomasi bajarilsa, u holda X ni *sanqqlikning birinchи aksiomasiiga ega fazo* deb ataymiz.

{ M_α } to'plamlar sistemasi va A to'plam uchun $A \subset \bigcup M_\alpha$ bo'lsa, u holda { M_α } sistema A to'plamning *qoplamasasi* deb ataladi. Agar { M_α } qoplamaning biror { M_{α_i} } qismi ham A uchun qoplama bo'lsa, u holda { M_{α_i} } sistema { M_{α_i} } qoplamaning *qism qoplamasasi* deyiladi. Agar { M_α } qoplama tegishli har bir to'plam ochiq (yopiq) bo'lsa, u holda { M_α } sistemani *ochiq (yopiq) qoplama* deb ataymiz.

X topologik fazoda { x_n } ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Agar x muqtaning ixtiyoriy U atrofi uchun, shunday n_0 soni toplib, $n \geq n_0$ tengsizligni qanoatlantiruvchi barcha n natural sonlar uchun $x_n \in U$ o'rinni bo'lsa, u holda x nuqta { x_n } ketma-ketlikning *limiti* deyiladi.

X va Y topologik fazolar, $f : X \rightarrow Y$ akslantirish bo'lib, $x \in X$ nuqta berilgan akslantiruvchi *barcha* n natural sonlar uchun $f(x) \in Y$.

V BOB

Topologik fazolar

5.1. Topologik fazolar

Metrik fazolarda metrika yordamida ochiq shar, atrof tushunchalariga ta'siflar berilib, ular yordamida ochiq to'plam aniqlanadi. Boshqa fundamental tushunchalar asosida ham ochiq to'plam tushunchasi yotadi. Ochiq to'planni metrika yordamida emas, aksiomalar orqali aniqlash g'oyasi natijasida topologik fazolar nazariyasi paydo bo'lgan.

Tarif. Aytaylik, X to'plamning qism to'plamlaridan iborat τ sistema quyidagi shartlarini qanoatlantirinsin:

- 1) $\emptyset \in \tau, X \in \tau;$
- 2) τ sistemasiga tegishli $G_\alpha, \alpha \in I$ (I indekslar to'plami) to'plamlarning birlashmasi $\bigcup G_\alpha$ va chekli sondagi $\bigcap_{k=1}^n G_k$ kesishmasi yana τ sistemasiga tegishli.

U holda τ sistemasi X to'plamda berilgan topologiya deyiladi.

(X, τ) juftlikga topologik fazo deyiladi. τ sistemining elementlarini *ochiq* to'plamlar deb, ochiq to'plamlarning to'ldiruvchilarini *yopiq* to'plamlar deb ataymiz. Topologik fazoning elementlari uning nuqtalari deb ham ataladi. Topologik fazolardagi boshlang'ich fundamental tushunchalar ro'yxatini keltiramiz:

- $x \in X$ nuqtaning *atrofi* — shu nuqtani o'z ichiga oluvchi ixtiyoriy ochiq to'plam;
- $X \supset M$ to'plamning *urinish nuqtasi* — ixtiyoriy atrofida M to'plamning kamida bitta elementi mavjud bo'lgan nuqta;
- $X \supset M$ to'plamning *yopilmasi* [M] — M ning barcha urinish nuqtalari to'plami;
- $X \supset M$ to'plamning *limit nuqtasi* — ixtiyoriy atrofida o'zidan boshqa M to'plamning kamida bitta nuqta mavjud bo'lgan nuqta;
- $X \supset M$ to'plamning *hosila to'plami* M' — M ning barcha limit nuqtalari to'plami;
- M to'plamning *ichi int(M)* — M to'plamdag'i barcha ochiq qism to'plamlar birlashmasi;

Agar $y = f(x)$ nuqtaning ixtiyoriy U_y atrofi uchun, x nuqtaning shunday V_x atrofi mavjud bo'lib, $f(V_x) \subset U_y$ bo'lsa, u holda f akslantirish x nuqtada uzluksiz deb ataladi. X fazoning barcha nuqtasida uzluksiz bo'lgan akslantirishiga X fazoda uzluksiz akslantirish deyiladi.

Quyida ajratish aksiomalari deb ataluvchi shartlarni keltiramiz.

T_0 – aksiomasi: X topologik fazoning ixtiyoriy ikkita har xil x va y nuqtalari uchun bu nuqtalarning kamida bittasining ikkinchicini o'z ichiga olmaydigan atrofi mavjud.

T_1 – aksiomasi (ajratishning birinchi aksiomasi): X topologik fazoning ixtiyoriy ikkita har xil x va y nuqtalari uchun, x ning y nuqtani o'z ichiga olmaydigan O_x atrofi, y ning x nuqtani o'z ichiga olmaydigan O_y atrofi mavjud.

T_2 – aksiomasi (ajratishning ikkinchi yoki xausdorf aksiomasi): X topologik fazoning ixtiyoriy ikkita har xil x va y nuqtalari o'zaro kesishmaydigan O_x va O_y atroflarga ega.

Topologik fazoda berilgan *to'plamning atrofi* deb, shu *to'plamni o'z ichiga oluvchi ixtiyoriy ochiq to'plamga* aytildi.

T_3 – aksiomasi (ajratishning uchinchi aksiomasi): X topologik fazoda ixtiyoriy nuqta va bu nuqta tegishli bo'lмаган ixtiyoriy yopiq *to'plam o'zaro kesishmaydigan atroflarga* ega.

T_i ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$) aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazoni T_i — fazo deb ataymiz.

T_1 va T_3 aksiomalarni qanoatlantiruvchi topologik fazo *regulyar* deyiladi.

T_4 aksiomasi (normallik aksiomasi). T_1 -fazoda ixtiyoriy ikkita o'zaro kesishmaydigan yopiq *to'plamlar o'zaro kesishmaydigan atroflarga* ega.

T_4 aksiomasini qanoatlantiruvchi fazo *normal* deb ataladi.

Masalalar

5.1.1. *Ikki elementdan iborat $X = \{a, b\}$ to'plamda $\tau = \{\emptyset, \{b\}, X\}$ sistemaning topoliyiya bo'lishini ko'rsating.*

Yechimi. Topoliyiya aksiomalarining bajarilishini tekshiramiz:

1) τ sistemaning berilishiga ko'ra $\emptyset, X \in \tau$;

2)

$$\emptyset \cup \{b\} = \{b\} \in \tau,$$

$$\emptyset \cup X = \{b\} \cup X = X \in \tau,$$

$$\emptyset \cap \{b\} = \emptyset \cap X = \emptyset \in \tau,$$

$$\{b\} \cap X = \{b\} \in \tau.$$

5.1.2. X metrik fazoda barcha ochiq to‘plamlardan iborat τ sistemaning topologiya bo‘lishini ko‘rsating.

Yechimi. τ sistemaga tegishli to‘plamlarning ixtiyoriy birlashmasi $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ va chekli sondagi $S = \bigcap_{k=1}^n G_k$ kesishmasining ochiq to‘plam bo‘lishini ko‘rsatamiz.

G to‘plamga tegishli ixtiyoriy x nuqta olaylik. U holda bu nuqta $\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ birlashmadagi to‘plamlarning kamida bittasiga, aytaylik, G_{α_0} to‘plamga tegishli bo‘ladi. G_{α_0} to‘plam ochiq bo‘lganligidan, x nuqtaning bu to‘plamda yotadigan V_x atrofi mavjud. Natijada $V_x \subset G_{\alpha_0} \subset G$ munosabatni yoza olamiz. Bu munosabatdan G to‘plamning ochiq ekanligi kelib chiqadi.

Endi $S = \bigcap_{k=1}^n G_k$ to‘plamdan ixtiyoriy x nuqta olaylik. Bu nuqta G_k , $k = 1, n$ to‘plamlarning har biriga tegishli bo‘ladi. x nuqtaning G_k to‘plamda yotadigan $V_{\varepsilon_k} = B(x, \varepsilon_k)$ atrofini olamiz. Bundan x nuqtaning $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ atrofi uchun $V_\varepsilon \subset V_{\varepsilon_k}$, $k = 1, \dots, n$ munosabatni yoza olamiz. U holda $V_\varepsilon \subset S$, ya’ni S ochiq to‘plam.

5.1.3. X to‘plamda berilgan topologiyalarning ixtiyoriy sondagi kesishmasi shu to‘plamda topologiya bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. X to‘plamda berilgan har bir τ_α , $\alpha \in I$ topologiya uchun $X, \emptyset \in \tau_\alpha$ bo‘lganligidan, $X, \emptyset \in \bigcap_\alpha \tau_\alpha$.

$\bigcap_\alpha \tau_\alpha$ kesishmadan olingan ixtiyoriy G_γ to‘plam har bir τ_α sistemaga tegishli bo‘ladi. Bundan τ_α sistema topologiya bo‘lganligi sababli $\bigcup_\gamma G_\gamma \in \tau_\alpha$ va $\bigcap_{k=1}^n G_k \in \tau_\alpha$ munosabatlar o‘rinli. U holda

$$\bigcup_\gamma G_\gamma \in \bigcap_\alpha \tau_\alpha$$

va

$$\bigcap_{k=1}^n G_k \in \bigcap_\alpha \tau_\alpha,$$

ya’ni $\bigcap_\alpha \tau_\alpha$ kesishma topologiya bo‘ladi.

5.1.4. X to‘plamning biror qism to‘plamlaridan iborat \mathcal{B} sistemani o‘z ichiga oluvchi minimal topologiya mavjud bo‘ladi (uni \mathcal{B} sistema paydo etgan topologiya deb ataymiz va $\tau(\mathcal{B})$ ko‘rinishda belgilaymiz). Isbotlang.

Yechimi. \mathcal{B} sistemani o'z ichiga oluvchi topologiyalar mavjud (misol uchun \mathcal{B} sistema X ning barcha qism to'plamlaridan iborat topologiyaning ichida yotadi). Bu topologiyalarning kesishmasi (5.1.3-misolga qarang) \mathcal{B} sistemani o'z ichiga oluvchi minimal topologiya bo'ladi.

5.1.5. (X, τ) topologik fazoning ixtiyoriy \mathcal{B} bazasi quyidagi shartlarni qanoatlantirishini isbotlang:

- 1) Ixtiyoriy $x \in X$ nuqta \mathcal{B} bazaga tegishli G_1 va G_2 to'plamlarning kesishmasiga tegishli bo'lsa, u holda shunday $G_3 \in \mathcal{B}$ to'plam mavjud bo'lib, $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ munosabati o'rinni bo'ladi;
- 2) Agar $x \in X$ nuqta \mathcal{B} bazaga tegishli G_1 va G_2 to'plamlarning kesishmasiga tegishli bo'lsa, u holda shunday $G_3 \in \mathcal{B}$ to'plam mavjud bo'lib, $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ munosabati o'rinni bo'ladi.

Yechimi. 1) X ochiq to'plam bo'lganligidan, uni \mathcal{B} bazaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalash mumkin. Shuning uchun X ning har bir nuqtasi \mathcal{B} bazaga tegishli to'plamlarning biriga tegishli bo'ladi.

2) $G_1 \cap G_2$ kesishma ochiq to'plam bo'lganligida, uni \mathcal{B} bazaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalash mumkin. Birlashmadagi to'plamlarning kannida bittasiga x nuqta tegishli bo'ladi. Ushbu to'plamni G_3 orqali belgilasak,

$$x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$$

munosabat o'rinni bo'ladi.

5.1.6. X to'planning qism to'plamlaridan iborat \mathcal{B} sistema quyidagi shartlarni qanoallantirsin:

- 1) Ixtiyoriy $x \in X$ element kannida bitta $G \in \mathcal{B}$ to'plama tegishli;
- 2) Agar $x \in X$ nuqta \mathcal{B} sistemaga tegishli G_1 va G_2 to'plamlarning kesishmasiga tegishli bo'lsa, u holda shunday $G_3 \in \mathcal{B}$ to'plam mavjud bo'lib, $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ munosabati o'rinni bo'ladi.

U holda \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalananidigan bareba to'plamlardan iborat $\tau(\mathcal{B})$ sistema X to'plama topologiya hosil etishini isbotlang.

Yechimi. 1) shart bo'yicha ixtiyoriy $x \in X$ element \mathcal{B} sistemining kannida bitta to'plamiga tegishli. Bu to'plamlarning birlashmasi X to'plamni beradi, ya'in $X \in \tau(\mathcal{B})$.

\mathcal{B} sistemaga tegishli har bir to'plama bo'sh to'plam qism to'plam bo'ladi. Bu bo'sh to'plam $\tau(\mathcal{B})$ sistemasiga ham tegishli bo'ladi.

$\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli to'plamlarning ixtiyoriy sondagi $\bigcup G_\alpha$ birlashmasini qayrylik. Bu birlashmadagi har bir to'plam o'miiga, uning \mathcal{B} sistema to'plamlarining birlashmasi ko'rinishdagi ifodasini qo'ysak, natijada \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi hosil bo'ladi. Bundan $\bigcup G_\alpha$ birlashmaning $\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli ekalnigi kelib chiqadi.

Endi $\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli to'plamlarning chekli sondagi kesishmasi ham shu sistemaga tegishli bo'lishini ko'rsatamiz. $A, B \in \tau(\mathcal{B})$ bo'lib, $A = \bigcup_n G_\alpha$ va $B = \bigcup_\beta G_\beta$ bo'lsin, bunda $G_\alpha, G_\beta \in \mathcal{B}$. U holda

$$A \bigcap B = \bigcup_{\alpha, \beta} (G_\alpha \bigcap G_\beta)$$

tengligini yoza olamiz. 2) shart bo'yicha $G_\alpha \bigcap G_\beta$ kesishmaga tegishli har bir x nuqta uchun $x \in G^* \subset G_\alpha \bigcap G_\beta$ munosabatni qanoatlaningradigan $G^* \in \mathcal{B}$ to'plam topiladi. Ularning barchasining birlashmasi $G_\alpha \bigcap G_\beta$ to'plamni beradi, ya'in $G_\alpha \bigcap G_\beta$ kesishma $\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli. Ularning \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rinishdagi ifodalarini $\bigcup (G_\alpha \bigcap G_\beta)$ ifodaga qo'ysak \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi hosil bo'ladi. Bundan $A \bigcap B$ kesishmaning $\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli elanligi kelib chiqadi.

Demak, $\tau(\mathcal{B})$ sistema topologiyaning barcha shartlarini qanoatlaning $\tau(\mathcal{B})$ sistemaga tegishli elanligi kelib chiqadi.

5.1.7. (X, τ) topologik fazoda $\mathcal{B} \subset \tau$ sistemasi τ topologiyatingning bazasi bo'lishi uchun quyidagi shartlarning bajarlilishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang:

- 1) Ixtiyoriy $x \in X$ element kamida bitta $G \in \mathcal{B}$ to'plama tegishli;
- 2) Agar $x \in X$ nuqta \mathcal{B} sistemaga tegishli G_1 va G_2 to'plamlarning kesishmasiga tegishli bo'lsa, u holda shunday $G_3 \in \mathcal{B}$ to'plam mavjud bo'lib, $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$ munosabati o'rinni bo'ladi;
- 3) Ixtiyoriy $G \in \tau$ to'plam va har bir $x \in G$ nuqta uchun $x \in G_x \subset G$ munosabatni qanoatlaniruvchi $G_x \in \mathcal{B}$ to'plam mavjud.

Yechimi. 1) va 2) shartlar bajarilganda \mathcal{B} sistema X topologik fazoning bazasi bo'lishi 5.1.6-misolda ko'rsatilgan.
3) shartning bajarlilishidan ixtiyoriy $G \in \tau$ to'plamni $G = \bigcup G_x$

ko'rnishda ifodalash mumkin ekanligi kelib chiqadi. Demak, \mathcal{B} sistema τ topologiyaning bazasi bo'ladi.

Aksincha, \mathcal{B} sistema τ topologiyaning bazasi bo'lsa 1) va 2) shartlarning bajarilishi 5.1.5-misolda ko'rsatilgan.

3) shartning bajarilishini isbotlaymiz. Ixtiyoriy $G \in \tau$ to'plamni \mathcal{B} sistemaga tegishli to'plamlarning birlashmasi ko'rnishda yozish mumkin. Har bir $x \in G$ element birlashmadagi to'plainmlarning kamida bittasiga tegishli bo'ladi. Shu to'plamni G_x ko'rnishda belgilaymiz. $x \in G_x \subset G$ munosabat o'rini bo'lganligidan, 3) shartning bajarilishi kelib chiqadi.

5.1.8. X topologik fazoda yopiq to'plamning to'ldiruvchisi ochiq bo'lishini ko'rsating.

Yechimi. X fazoda berilgan ixtiyoriy F yopiq to'plam biror $G \in X$ ochiq to'plamning to'ldiruvchisi bo'ladi, ya'ni $F = X \setminus G$. Bundan $X \setminus F = X \setminus (X \setminus G) = G$, ya'ni $X \setminus F$ ochiq to'plam.

5.1.9. X topologik fazoda A ochiq, B yopiq to'plamlar bo'lsa, u holda $A \setminus B$ ayirmaning ochiq to'plam bo'lishini ko'rsating.

Yechimi. 5.1.8-misolga ko'ra $X \setminus B$ ochiq to'plam. Bundan

$$A \setminus B = A \cap (X \setminus B)$$

tengligi va topologiyaning ikkinchi aksiomasiga ko'ra $A \setminus B$ to'plam ochiq bo'ladi.

5.1.10. X topologik fazoda yopiq to'plamlarning chekli sondagi birlashmasi yopiq to'plam bo'lishini isbotlang.

Yechimi. X fazoda yopiq F_1, F_2, \dots, F_n to'plamlar berilgan bo'lib, $F_i = X \setminus G_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) bo'lsin, bunda G_i ochiq to'plam. U holda

$$\bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcup_{i=1}^n (X \setminus G_i) = X \setminus \bigcap_{i=1}^n G_i$$

tengligi va $\bigcap_{i=1}^n G_i$ kesishmaning ochiq ekanligidan, $\bigcup_{i=1}^n F_i$ to'plamning yopiq ekanligi kelib chiqadi.

5.1.11. X topologik fazoning ixtiyoriy M qism to'plami uchun

$$X \setminus [M] = \text{int}(X \setminus M)$$

tenglikning o'rini ekanligini isbotlang.

Yechimi. $X \setminus [M]$ to'plamdan ixtiyoriy x element olaylik. $x \notin [M]$ bo'lganligidan, uning M to'plam bilan kesishmaydigan, ya'ni $X \setminus M$

to'plam ichida yotadigan V_x atrofi mavjud. Bundan $x \in \text{int}(X \setminus M)$, ya'ni $X \setminus [M] \subset \text{int}(X \setminus M)$ munosabatning o'rini ekanligi kelib chiqadi.

Endi $x \in \text{int}(X \setminus M)$ bo'lsin. $\text{int}(X \setminus M)$ ochiq bo'lganligidan, uni x nuqtaning atrofi sifatida olish mungkin. $\text{int}(X \setminus M) \subset X \setminus M$ munosabat o'rini bo'lganligidan, $\text{int}(X \setminus M) \cap M = \emptyset$. Bundan $x \notin [M]$ ekanligi kelib chiqadi, ya'ni $x \in X \setminus [M]$. Demak, $X \setminus [M] \supset \text{int}(X \setminus M)$. Shunday qilib berilgan tenglikning to'g'ri ekanligi isbotlandi.

5.1.12. X topologik fazoda M to'plamning yopiq bo'lishi uchun $[M] = M$ tengligining bajarilishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. M yopiq to'plam bo'lsin. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $[M] \neq M$. U holda $[M] \setminus M$ ayirma bo'sh emas. Bu ayirmadan biror x nuqtani olaylik. $x \notin M$ bo'lganligidan, $x \in X \setminus M$. M yopiq bo'lganligidan, $X \setminus M$ to'plam ochiq bo'ladi. U holda $X \setminus M$ to'plam x nuqtaning atrofi bo'lib, bu atrof M to'plam bilan kesishmaydi. U holda $x \notin [M]$. Bunday bo'lishi mumkin emas. Demak, farazimiz noto'g'ri, ya'ni $[M] = M$.

Yetarliligi. 5.1.11-misolda isbotlangan $X \setminus [M] = \text{int}(X \setminus M)$ tengligidan $[M]$ to'plamning yopiq ekanligi ko'rindi. $[M] = M$ tengligidan esa M ning yopiq ekanligi kelib chiqadi.

5.1.13. Ixtiyoriy xos qism to'plami yopiq bo'lmagan topologik fazoga misol keltiring.

Yechimi. Elementlari soni bittadan ko'p ixtiyoriy X to'plamda trivial $\tau = \{\emptyset, X\}$ topologiyani aniqlasak, paydo bo'lgan topologik fazoning ixtiyoriy bo'sh bo'lmagan qism to'plami yopilmasi X to'plamdan iborat bo'ladi. Demak, bu fazoda faqat bo'sh to'plam va X to'plami yopiq bo'lib, boshqa qism to'plamlar yopiq bo'lmaydi.

5.1.14. Ixtiyoriy bir nuqtali qism to'plami yopiq bo'lmagan T_0 -fazoga misol keltiring.

Yechimi. $X = \mathbb{Z}$ barcha butun sonlar to'plamini olaylik. Har bir $k \in \mathbb{Z}$ uchun

$$N_k = \{m \in \mathbb{Z} : m \geq k\}$$

to'plamni olamiz.

$$\tau = \{\emptyset, \mathbb{Z}, N_k, k \in \mathbb{Z}\}$$

to'plamlar sistemasi topologiya hosil qildi.

Har bir $m, n \in \mathbb{Z}$, $m < n$ uchun, $U \in \tau$ to'plami m nuqtaning atrofi bo'lishidan $n \in N_m \subset U$ munosabatlar o'rini ekanligi kelib chiqadi. Demak, m nuqtaning xohlagan atrofiga n nuqtasi tegishli, ya'ni $m \in [n]$. Bundan $\{n\}$ to'plamning, Demak, bir nuqtali xohlagan

qism to‘planining yopiq emasligi kelib chiqadi. Shu bilan birga, $m \notin N_n$ bo‘lganligidan, qaralayotgan topologik fazosi T_0 -fazo bo‘ladi.

5.1.15. X topologik fazoda to‘plam yopilmasi quyidagi xossalarga ega ekanligini isbotlang:

- $M \subset [M]$;
- agar $M_1 \subset M_2$ bo‘lsa, u holda $[M_1] \subset [M_2]$;
- $[M_1 \cup M_2] = [M_1] \cup [M_2]$;
- $[[M]] = [M]$.

Yechimi. a) M to‘planning xohlagan nuqtasi shu to‘planning o‘ziga urinish nuqta bo‘lganligidan, $M \subset [M]$;

b) $[M_1]$ to‘plamga tegishli xohlagan x nuqtaning har bir atrofida M_1 to‘planning, demak, M_2 to‘planning kamida bir elementi mavjud bo‘lgani uchun $x \in [M_2]$, ya’ni $[M_1] \subset [M_2]$;

c) $M_1 \subset M_1 \cup M_2$, $M_2 \subset M_1 \cup M_2$ munosabatlar va b) xossadan $[M_1 \cup M_2] \supset [M_1] \cup [M_2]$ munosabat kelib chiqadi.

Endi $[M_1 \cup M_2]$ to‘plamdan xohlagan x nuqta olib $x \notin [M_1] \cup [M_2]$ deb faraz qilamiz. U holda x nuqtaning M_1 va M_2 to‘plamlar bilan kesishmaydigan U_x atrofi mavjud bo‘ladi. Bundan

$$U_x \cap (M_1 \cup M_2) = \emptyset,$$

ya’ni $x \notin [M_1 \cup M_2]$. Bu ziddiyatdan $[M_1 \cup M_2] \subset [M_1] \cup [M_2]$ munosabatining o‘rinli ekanligi kelib chiqadi.

- a) xossadan $[M] \subset [[M]]$ munosabati o‘rinli.

$[[M]]$ to‘plamdan olingan ixtiyoriy x nuqtaning har bir U_x atrofiga $[M]$ to‘plamning kamida bitta x' nuqta yotadi. U_x to‘plam x' nuqta uchun ham atrof bo‘ladi. Demak, bu atrofda M to‘plamning kamida bir nuqtasi bor, ya’ni $x \in [M]$. Demak, $[M] \supset [[M]]$.

5.1.16. Sanoqli bazaga ega X topologik fazoning separabelligini isbotlang.

Yechimi. $\{G_n\}$ sistema X fazoning biror sanoqli bazasi bo‘lsin. Bu bazaning har bir G_n elementidan ixtiyoriy x_n nuqta olaylik. $T = \{x_n\}$ sanoqli to‘plam X fazoning hamma yerida zinch ekanligini ko‘rsatamiz. Teskarisini faraz qilaylik, ya’ni $X \neq [T]$ bo‘lsin. U holda $G = X \setminus [T]$ bo‘sh bo‘lmasigan ochiq to‘plam bo‘lganligidan, uni $\{G_n\}$ bazaga tegishli biror G_k to‘plamlarning birlashmasi ko‘rinishda ifodalash mumkin. $x_k \in G_k$ bo‘lganligidan, $x_k \in G$ munosabat o‘rinli bo‘lishi kerak. Bunday bo‘lishi mumkin emas, chunki $G \cap T = \emptyset$. Demak, $X = [T]$.

5.1.17. Agar X sanoqli bazaga ega topologik fazo bo‘lsa, u holda uning ixtiyoriy ochiq qoplamasidan sanoqlicha qism qoplama ajratib olish mumkin ekanligini isbotlang.

Yechimi. $\{O_\alpha\}$ sistema X topologik fazoning ixtiyoriy ochiq qoplamasi bo'lsin. U holda X fazoning har bir x nuqta kamida bitta O_α to'plamga tegishli bo'ladi. Agar $\{G_n\}$ sistema X tapologik fazoning sanoqli bazasi bo'lsa, bu sistemadan $x \in G_n(x) \subset O_\alpha$ munosabatni qanoatlantiradigan $G_n(x)$ to'plam topiladi. Shunday usul bilan tanlangan $G_n(x)$ to'plamlar sistemasi sanoqlicha bo'lib, X fazoning qoplamasi bo'ladi. Har bir $G_n(x)$ to'plam uchun, uni o'z ichiga oluvchi O_α to'plamlarning bittasini tanlaymiz. Bunday usul bilan tanlangan to'plamlar sistemasi ham sanoqlicha bo'lib, $\{O_\alpha\}$ qoplamaning qismi qoplamasini bo'ladi.

5.1.18. (X, τ) topologik fazoda $M \subset X$ to'plam berilgan bo'lsin. x nuqtaning M to'plamga urinish nuqta bo'lishidan, M to'plamda x ga yaqinlashuvchi ketma-ketlikning mavjud bo'lishi kelib chiqadimi?

Yechimi. Umuman olganda, kelib chiqmasligi quyidagi misoldan ko'rindi. $X = [0, 1]$ bo'lib, τ topologiya X va bo'sh to'plam bilan birga $[0, 1]$ segmentdan chekli yoki sanoqli sondagi nuqtalarni olib tashlashdan hosil bo'lgan to'plamlardan iborat bo'lsin.

Bu fazoda faqat statsionar ketma-ketliklar, ya'ni biror hadidan boshlab barcha hadlari o'zaro teng bo'lgan ketma-ketliklar yaqinlashuvchi bo'ladi.

Haqiqatan, $\{x_n\}$ statsionar ketma-ketlik bo'lib, biror n natural son uchun $x_n = x_{n+1} = x_{n+2} = \dots$ bo'lganda $x = x_n$ nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti bo'ladi. Sababi uning ixtiyoriy atrofida berilgan ketma-ketlikning n hadidan boshlab barcha hadi joylashgan.

Endi $\{x_n\}$ ketma-ketlik statsionar bo'lmagan holni ko'ramiz. Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni berilgan ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lib, x nuqta uning limiti bo'lsin. $[0, 1]$ segmentdan $\{x_n\}$ ketma-ketlikning barcha hadlarini (agar x berilgan ketma-ketlikning biror hadiga teng bo'lgan holda, bu hadidan boshqa barcha hadlarini) olib tashlashdan hosil bo'lgan to'plam ochiq bo'lib, x ning atrofi bo'ladi. Ravshanki, x nuqtaning bu atrofida $\{x_n\}$ ketma-ketlikning ko'pi bilan chekli hadlari joylashgan bo'ladi. Demak, x nuqta berilgan ketma-ketlikning limit nuqta bo'lomaydi.

Shuning uchun, agar M sifatida $(0, 1]$ yarim intervalni olsak, u holda M to'plamda $0 \in X$ nuqtaga yaqinlashuvchi ketma-ketlik mavjud emas. Shu bilan birga, τ topologiyaning bo'sh to'plamdan boshqa barcha elementlari cheksiz to'plamlardan iborat bo'lganligidan, 0 nuqtaning ixtiyoriy atrofida M ning kainida bitta elementi mavjud bo'ladi, ya'ni $0 \in [M]$.

5.1.19. *X sano'qlilikning birinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazo bo'lib, $M \subset X$ bo'lsin. Agar $x \in [M]$ bo'lsa, u holda M to'plamda x nuqtaga yaqinlashuvchi ketma-ketlikning mavjud bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. Sanoqli $\{O_n\}$ sistema $x \in [M]$ nuqta atroflarining aniqlovchi sistemasi bo'lsin. $O_{n+1} \subset O_n$ munosabat o'rini deb olish mumkin (aks holda O_n o'rniiga $\bigcap_{k=1}^n O_k$ kesishmani olar edik). $x \in [M]$ bo'lganligidan, O_k ga tegishli $x_k \in M$ nuqta mavjud bo'ladi. Natijada, x nuqtaning ixtiyoriy atrofining ichida yotadigan $\{O_n\}$ sistema elementi mavjud bo'lganligidan, x nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti bo'ladi.

5.1.20. *X va Y topologik fazolar bo'lsin. $f : X \rightarrow Y$ akslantirish uzluksiz bo'lishi uchun Y fazodagi har bir A ochiq to'plamning X fazodagi $f^{-1}(A)$ asli ochiq bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Zarurligi. $f : X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish va $A \subset Y$ biror ochiq to'plam bo'lsin. $B = f^{-1}(A)$ to'plamning X da ochiq ekanligini ko'rsatamiz. B to'plamga tegishli ixtiyoriy x nuqtani oaylik. U holda A to'plam $f(x) = y$ nuqtaga atrof bo'ladi. Bundan f akslantirish uzluksiz bo'lganligidan, x nuqtaning biror V_x atrofi $f(V_x) \subset A$ munosabatni qanoatlantiradi. Demak, $V_x \subset B$ munosabat o'rini ekanligi kelib chiqadi, ya'ni B ochiq bo'ladi.

Yetarliligi. Y fazoning har bir A ochiq to'plamining $f^{-1}(A)$ asli ochiq to'plam bo'lsin. X fazoning ixtiyoriy x nuqtasini va $y = f(x)$ nuqtaning ixtiyoriy U_y atrofini qaraylik. U_y ochiq to'plam bo'lgani uchun $f^{-1}(U_y)$ ochiq bo'lib, bu to'plam x nuqtaning atrofi bo'ladi. $f(f^{-1}(U_y)) \subset U_y$ munosabatdan f akslantirishning x nuqtada uzluksiz ekanligi kelib chiqadi. x nuqta X fazodan ixtiyoriy tanlab olinganligi uchun f akslantirish X fazoda uzluksiz bo'ladi.

5.1.21. *(X, τ_1) va (Y, τ_2) topologik fazolar bo'lib, $f : X \rightarrow Y$ akslantirish X ni Y ning ichiga o'tkazsin.*

$$f^{-1}(\tau_2) = \{f^{-1}(G) : G \in \tau_2\}$$

sistemaning X to'plamda topologiya bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $f^{-1}(\tau_2)$ sistemaning topologiya aksiomalarini qanoatlantirishini tekshiramiz:

1) $f(X) \subset Y$ munosabat o'rini bo'lib, $Y \in \tau_2$ bo'lganligidan, $X = f^{-1}(Y) \in f^{-1}(\tau_2)$. Shu bilan birga, $\emptyset = f^{-1}(\emptyset) \in f^{-1}(\tau_2)$.

2) $f^{-1}(\tau_2)$ sistemaga tegishli ixtiyoriy O_α to'plamlarni oaylik. U

holda

$$O_\alpha = f^{-1}(G_\alpha), \quad G_\alpha \in \tau_2.$$

Bundan

$$\bigcup_{\alpha} O_\alpha = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(G_\alpha) = f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha} G_\alpha\right).$$

Endi $\bigcup_{\alpha} O_\alpha \in \tau_2$ bo'lganligidan,

$$\bigcup_{\alpha} O_\alpha \in f^{-1}(\tau_2).$$

Shu bilan birga,

$$\bigcap_{k=1}^n O_k = \bigcap_{k=1}^n f^{-1}(G_k) = f^{-1}\left(\bigcap_{k=1}^n G_k\right) \in f^{-1}(\tau_2).$$

Demak, $f^{-1}(\tau_2)$ sistema topologiya'ning barcha aksiomalarini qanoatlantirar ekan.

5.1.22. *T_1 -fazo bo'lmaydigan topologik fazoga misol keltirring.*

Yechimi. 5.1.1-misolda qaralgan $X = \{a, b\}$ topologik fazoda a nuqtaning b nuqtani o'z ichiga olmaydigan atrofi yo'q. Shuning uchun bu fazo T_1 -fazo bo'lmaydi.

5.1.23. *T_1 -fazoda bitta nuqtali to'plamning yopiq bo'lishini ko'rsating.*

Yechimi. T_1 -fazodan ixtiyoriy x nuqta olaylik. Agar $x \neq y$ bo'lsa, u holda y nuqtaning x nuqtani o'z ichiga olmaydigan O_y atrofi mavjud, ya'ni $y \notin [x]$. Demak, $x = [x]$.

5.1.24. *T_1 -fazoda chekli to'plamning yopiq bo'lishini ko'rsating.*

Yechimi. T_1 -fazoda chekli $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ to'plam berilgan bo'lsin. U holda

$$A = \bigcup_{k=1}^n \{a_k\}$$

tengligini yoza olamiz. 5.1.23-misolda T_1 -fazoda bitta nuqtadan iborat to'plamning yopiq to'plam bo'lishi, 5.1.10-misolda esa topologik fazoda yopiq to'plainlarining chekh sondagi birlashmasi yopiq to'plam bo'lishi ko'rsatilgan. Demak, A yopiq to'plam.

5.1.25. *T_1 -aksiomasini qanoatlantirmaydigan topologik fazoda chekli to'plam ham limit nuqtaga ega bo'lishi mumkin ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. $X = \{a, b\}$ to‘plamda $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}\}$ topologiyani qarasak, a nuqta $\{b\}$ to‘plam uchun limit nuqta bo‘ladi.

5.1.26. x nuqtaning T_1 -fazodagi M to‘plamga limit nuqta bo‘lishi uchun, bu nuqtaning ixtiyoriy U atrofiga M to‘plamning cheksiz ko‘p elementi tegishli bo‘lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. x nuqta M to‘plamning limit nuqtasi bo‘lsin. Teskarisidan faraz qilaylik, ya’ni x nuqtaning shunday U atrofi mavjud bo‘lib, bu atrofda M to‘plamning (agar $x \in M$ bo‘lsa, u holda x dan boshqa) faqat chekli x_1, x_2, \dots, x_n nuqtalarigina joylashgan bo‘lsin. 5.1.24-misoldan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ to‘plamning yopiq ekanligi, 5.1.9-misoldan esa $V = U \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ to‘plamning ochiq ekanligi kelib chiqadi. $x \in V$ bo‘lganligidan, V to‘plam x nuqtaning atrofi bo‘lib, $V \cap M \setminus \{x\} = \emptyset$ tenglik o‘rinli. Bu ziddiyatdan bizning farazimizning noto‘g‘ri ekanligi kelib chiqadi.

Yetarlılığı. To‘plamning limit nuqtasi ta’rifidan bevosita kelib chiqadi.

5.1.27. T_1 -fazo bo‘lib, T_2 -fazo bo‘lmagan topologik fazoga misol keltiring.

Yechimi. $X = [0, 1]$ bo‘lib, τ topologiya bo‘sish to‘plam bilan birga $[0, 1]$ segmentdan chekli yoki sanoqli sondagi nuqtalarni olib tashlashdan hosil bo‘lgan to‘plamlardan iborat bo‘lsin. Bu topologik fazo T_1 -fazo bo‘ladi. Haqiqatan, o‘zaro teng bo‘lmagan ixtiyoriy $x, y \in X$ nuqtalar uchun atroflarni, mos ravishda, $O_x = X \setminus \{y\}$ va $O_y = X \setminus \{x\}$ ko‘rinishlarda aniqlasak, u holda $x \notin O_y$ va $y \notin O_x$.

Endi $x, y \in X$ nuqtalarning o‘zaro kesishmaydigan atroflari yo‘q ekanligini ko‘rsatamiz. G_x va G_y to‘plamlar, mos ravishda, x va y nuqtalarning ixtiyoriy atroflari bo‘lsin. U holda $G_x = X \setminus A$ va $G_y = X \setminus B$, bunda A va B lar $[0, 1]$ segmentning ko‘pi bilan sanoqli qism to‘plamlaridir. Natijada

$$G_x \cap G_y = (X \setminus A) \cap (X \setminus B) = X \setminus (A \cup B).$$

$A \cup B$ to‘plam ko‘pi bilan sanoqli bo‘lganligidan, $X \setminus (A \cup B) \neq \emptyset$.

5.1.28. (X, τ) Hausdorf topologik fazoning xohlagan (M, τ_M) qism fazosi Hausdorf fazo bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. X Hausdorf fazo bo‘lganligidan, M to‘plamga tegishli xohlagan x, y nuqtalarning o‘zaro kesishmaydigan O_x, O_y atroflari mavjud bo‘ladi. $O_x \cap M$ va $O_y \cap M$ to‘plamlar x va y nuqtalarning M fazodagi o‘zaro kesishmaydigan atroflari bo‘ladi, ya’ni (M, τ_M) Hausdorf fazosi bo‘ladi.

5.1.29. Quyidagi tasdiqlarning o‘zaro ekvivalent ekanligini isbotlang:

1) T_3 -aksiomasi;

2) X topologik fazodagi har bir x nuqtaning ixtiyoriy atrofi uchun, shu atrofda yopilmasi bilan birga yotadigan x nuqtaning biror atrofi mavjud.

Yechimi. X topologik fazoda T_3 -aksiomasi o‘rinli bo‘lsin. $x \in X$ nuqtaning ixtiyoriy O_x atrofini olaylik. T_3 -aksiomasiga ko‘ra $X \setminus O_x$ yopiq to‘plamning va x nuqtaning o‘zaro kesishmaydigan, mos ravishda, U va G_x atroflari mavjud. Natijada

$$G_x \subset X \setminus U \subset X \setminus (X \setminus O_x) = O_x.$$

Shu bilan birga, $X \setminus U$ to‘plam yopiq bo‘lganligidan, $[G_x] \subset X \setminus U$, ya’ni $[G_x] \subset O_x$.

Endi 2) tasdiq o‘rinli bo‘lsin. X fazodan ixtiyoriy x nuqta va bu nuqta tegishli bo‘lmagan ixtiyoriy M yopiq to‘plamni qaraylik. 2) tasdiqqa ko‘ra $X \setminus M$ to‘plamda yopilmasi bilan birga to‘liq yotadigan x nuqtaning G atrofi mavjud. $X \setminus [G]$ to‘plam M to‘plamning atrofi bo‘lib,

$$G \cap (X \setminus [G]) \subset G \cap (X \setminus G) = \emptyset,$$

ya’ni T_3 aksiomasi bajariladi.

5.1.30. Ixtiyoriy regulyar X topologik fazoning T_2 -fazo bo‘lishini ko‘rsating.

Yechimi. $x, y \in X$ bo‘lib, $x \neq y$ bo‘lsin. T_1 -aksiomasiga ko‘ra x nuqtaning y nuqtani o‘z ichiga olmaydigan O_x atrofi mavjud. T_3 -aksiomasiga ko‘ra x nuqta va $X \setminus O_x$ yopiq to‘plamning o‘zaro kesishmaydigan atroflari mavjud. $X \setminus O_x$ to‘plamning atrofi y nuqta uchun ham atrof bo‘ladi. Demak, T_2 aksioma bajariladi.

5.1.31. Ixtiyoriy X metrik fazoning normal topologik fazo bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. X metrik fazoda o‘zaro kesishmaydigan yopiq A va B to‘plamlar berilgan bo‘lsm. $X \setminus B$ ochiq to‘plam bo‘lib, $A \subset X \setminus B$ bo‘lganligidan, A to‘plamga tegishli ixtiyoriy x nuqtaning B to‘plam bilan kesishmaydigan O_x atrofi mavjud. Natijada, x nuqta B to‘plamdan musbat ρ_x masofada joylashgan bo‘ladi. Xuddi shunday, B to‘plamning ixtiyoriy y nuqtasi A to‘plamdan musbat ρ_y masofada joylashadi. A va B to‘plamlarning, mos ravishda, $U = \bigcup_{x \in A} S(x, \frac{\rho_x}{2})$ va $V = \bigcup_{y \in B} S(y, \frac{\rho_y}{2})$ atroflarini amiqlab, ularning o‘zaro kesishmasligini ko‘ratamiz. Teskarisini faraz qilamiz, ya’ni shunday z element mavjud

$x_0, z \in U \cap V$ bo'lsin. U holda A va B to'plamlardan, mos ravishida, shunday x_0 va y_0 muqtalar topilib, $\rho(x_0, z) < \frac{\rho_{y_0}}{2}$ va $\rho(y_0, z) < \frac{\rho_{y_0}}{2}$ tengsizliklari o'rinni bo'ladи. Aniqlik uchun $\rho_r \leq \rho_y$ bo'lsin. U holda $\rho(x_0, y_0) \leq \rho(x_0, z) + \rho(z, y_0) < \frac{\rho_{y_0}}{2} + \frac{\rho_{y_0}}{2} = \rho_{y_0}$, ya'ni $x_0 \in S(y_0, \rho_{y_0})$. Bu esa ρ_{y_0} ning aniqlanishiga zid. Demak, $U \cap V = \emptyset$, ya'ni X fazo normaldir.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. X topologik fazoning M qism to'plami uchun quyidagi tenglikni isbotlang:

$$[M] = \bigcap \{P : M \subset P = [P] \subset X\}.$$

2. X topologik fazosida o'zaro kesishmaydigan ochiq A va B to'plamlar uchun $[A] \cap B = \emptyset$, int $[A] \cap \text{int}[B] = \emptyset$ tengliklari o'rinni ekanligini isbotlang.

3. X topologik fazosida τ_1 va τ_2 topologiyalar aniqlangan bo'lib, $\tau_1 \leq \tau_2$ munosabati o'rinni bo'lsa, u holda har bir $A \subset X$ to'plam uchun $[A]_{\tau_2} \subset [A]_{\tau_1}$ munosabatining o'rinni bo'lishini isbotlang.

4. X fazosida ochiq P to'plam va xohlagan Q qism to'plami uchun $\text{int}(P \cap Q) = \text{int}[P] \cap \text{int}[Q]$

tengligining o'rinni ekanligini isbotlang.

5. X fazosidagi xohlagan ochiq G to'plam uchun $F = |G| \setminus G$ to'plam fazosining hech qayerida zinch emasligini isbotlang.

6. X fazosining hech qayerida zinch bo'lmagan $A \subset X$ to'plaming yopilmasi ham X ning hech qayerida zinch bo'lmastigini isbotlang.

7. X fazoning hech qayerida zinch bo'lmagan ochiq to'plam bo'sh bo'lishini isbotlang.

8. X fazoning hamma yerida zinch A qism to'plam va X da ochiq xohlagan U to'plam uchun $[U] = [A \cap U]$ tengligining o'rinni bo'lishini isbotlang.

9. Normal fazoning yopiq qism to'plami normal bo'lishini isbotlang.

10. Yakkalangan muqtalarga ega bo'lmagan T_1 - fazoning hamma yerida zinch bo'lgan qism fazosi ham yakkalangan nuqtalarga ega bo'lmastigini isbotlang.

11. Bequlyar bo'lmagan sanoqli Hausdorff fazogiga misol keltiring.

5.2. Topologik fazolarda kompaktlik

X topologik fazo bo'lib, Y uning biron qism fazosi bo'lsin. Ochiq to'plamlarning $\{G_\alpha : \alpha \in A\}$ sistemasi uchun $Y \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ bolsa, u holda bu sistema Y to'planning ochiq qoplamasini deb ataladi.

Agar ochiq qoplama chekli elementlardan iborat bo'lsa, u holda u chekli ochiq qoplama deyiladi.

Agar topologik fazoning ixтийори очиқ qoplamasidan chekli qism qoplama ajratib olish mumkin bo'lsa, u holda bu topologik fazo kompaktli deyiladi.

T_2 aksiomasini qanoatlaniruvchi kompaktli topologik fazoni kompakt deb ataymiz.

M to'planning qism to'plamlardan iborat $\{A\}$ sistemadan xohla-gancha olingan chekli sondagi to'plamlarning kesishmasi bo'sh bo'lmasa, u holda $\{A\}$ sistema markazlashgan deb ataladi. Agar X topologik fazoning har bir cheksiz qism to'plami kamida bir limit nuqtaga ega bo'lsa, u holda bu iazo sanoqli-kompaktli deyiladi.

Masalalar

5.2.1. Ixtiyoriy $[a, b]$ kesma kompakt to'plamdir.

Yechimi. $[a, b]$ kesmaning intervallar bilan qoplamasidan chekli qop-lama ajratib olish mumkinligini ko'rsatish yetarijidir. Ayaylik, $\mathcal{F} = \{I_\alpha\}$ intervallar sistemasi uchun $[a, b] \subset \bigcup_\alpha I_\alpha$ bo'lsin.

C orqali $[a, b]$ kesmaning shunday x nuqtalarini belgilaymizki, bunda $[a, x]$ kesma \mathcal{F} sistemining chekli intervallari bilan qoplangan bo'lsmi. C bo'sh bo'lmagan to'plamdir. Haqiqatan, a soni biror I_α intervalga tegishliligidan, $[a, a] \subset I_\alpha$, ya'ni $a \in C$.

$x_0 = \sup C$ bo'lsin. Shunday $I_\alpha = (x', x'') \in \mathcal{F}$ mavjudki, $x' < x_0 < x''$. Aniq quyi chegara ta'rifdan shunday $x \in C$ mavjudki $x' < x < x_0$. $[a, x]$ kesma \mathcal{F} sistemining chekli intervallari bilan qoplangani uchun $[a, x]$ ham bu sistemining chekli intervallari bilan qoplanadi. Bundan $x_0 \in C$.

Agar $x_0 < b$ desak, u holda (x_0, x'') oraliqda C to'planning nuqr-tasi topiladi, bu esa x_0 ning aniq quyi chegara ekenligiga ziddir. Hosisil bo'lgan ziddiyatdan $x_0 = b$ kelib chiqadi, ya'ni $[a, x]$ kesmani \mathcal{F} sisteme-masing chekli intervallari bilan qoplash mumkin.

5.2.2. X topologik fazo kompaktli bo'lishi uchun uning yopiq to'plamlardan iborat har bir markazlashgan sis-

temasining kesishmasi bo'sh bo'lmasligi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. X konipakt topologik fazoning biror yopiq to'plamlaridan iborat markazlashgan $\{F_\alpha\}$ sistemasi berilgan bo'lsin. $G_\alpha = X \setminus F_\alpha$ to'plamlardan iborat $\{G_\alpha\}$ sistemaga tegishli chekli sondagi G_1, G_2, \dots, G_n to'plamlar uchun

$$\bigcup_{i=1}^n G_i = \bigcup_{i=1}^n (X \setminus G_i) = X \setminus \bigcap_{i=1}^n F_i$$

tengligidan va $\{F_\alpha\}$ sistemaning markazlashgan ekanligidan, $\bigcup_{i=1}^n G_i \neq X$ ekanligi kelib chiqadi, ya'ni $\{G_\alpha\}$ sistemaning hech bir chekli qismi X fazo uchun qoplama bo'la olmaydi. U holda X kompaktli bo'lgani uchun, $\{G_\alpha\}$ sistemaning o'zi ham X fazoning qoplamasini emas, ya'ni $\bigcup_\alpha G_\alpha \neq X$. Bundan

$$\bigcup_\alpha (X \setminus F_\alpha) = X \setminus \bigcap_\alpha F_\alpha \neq X.$$

Demak, $\bigcap_\alpha F_\alpha \neq \emptyset$ ekanligi kelib chiqadi.

Yetariligi. X topologik fazoning biror $\{G_\alpha\}$ ochiq qoplamasini berilgan bo'lsim. $F_\alpha = X \setminus G_\alpha$ yopiq to'plamlarning $\{F_\alpha\}$ sistemasi uchun

$$\bigcap_\alpha F_\alpha = \bigcap_\alpha (X \setminus G_\alpha) = X \setminus \bigcup_\alpha G_\alpha = \emptyset.$$

Masala sharti bo'yicha, X fazodagi yopiq to'plamlarning xohlagan markazlashgan sistemasi bo'sh bo'lmasligi kesishmaga ega. Shu sababli $\{F_\alpha\}$ sistema markazlashgan bo'la ohnaydi. U holda bu sistemada kesishmasi bo'sh bo'lgan chekli sondagi F_1, F_2, \dots, F_m to'plamlar mavjud. Bundan

$$X = X \setminus \left(\bigcap_{k=1}^m F_k \right) = \bigcup_{k=1}^m (X \setminus F_k) = \bigcup_{k=1}^m G_k.$$

Demak, xohlagan $\{G_\alpha\}$ ochiq qoplamadan chekli qoplama ajratib olish mumkin ekan, ya'ni X kompaktli.

5.2.3. Kompaktli X topologik fazoning xohlagan cheksiz qism to'plami kamida bir limit nuqtaga ega bo'lishini isbotlang.

Yechimi. Aksinchasini faraz qilamiz, ya'ni bironta ham limit nuqtaga ega bo'lmasligi cheksiz $M \subset X$ to'plam mavjud bo'lsin. U

holda M to'plamidan bitta ham limit nuqtaga ega bo'lмаган саноғы $M_1 = \{x_1, x_2, \dots\}$ to'plam ажратып олыш мүмкін. Натижада yопиқ $M_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ to'plamlар кесishмасы bo'sh bo'lған марказлашындағы система hosил етади. Bu X fazoning kompaktli bo'lishiga zид, ya'ni farazimiz noto'g'ri.

5.2.4. Kompaktli X toplogik fazoning xohlagan yопиқ F qism to'plami kompaktli bo'lishini isbotlang.

Yechimi. F qism fazoning yопиқ qism to'plamlардан iborat xohlagan $\{F_\alpha\}$ марказлашындағы системаны olamız. Bu sistemaga tegishli har bir F_α to'plam X fazosida yопиқ bo'ladi. X kompaktli bo'lғанligидан, $\cap F_\alpha \neq \emptyset$. Demak, 5.2.2-misol bo'yicha, F kompaktli bo'ladi.

5.2.5. Kompaktning yопиқ qism to'plami kompakt bo'lishini isbotlang.

Yechimi. 5.1.28-misolda Hausdorff fazoning xohlagan qism fazоzi Hausdorff bo'lishи, 5.2.4-misolda esa, kompaktli topologik fazoning yопиқ qism to'plamining kompaktli bo'lishи ко'rsatылған. Натижада kompaktning yопиқ qism to'plami kompakt bo'lishи келіб чиқади.

5.2.6. X Hausdorff fazoning xohlagan kompakt K qism to'plami yопиқ bo'lishini isbotlang.

Yechimi. X Hausdorff fazо bo'lгани үчун, xohiagan $x \in K$ va xohlagan $y \notin K$ nuqtalarning o'заро кесishmaydиган U_x va V_y atroflари топилади. $\{U_x : x \in K\}$ система K үчун очиқ qoplama bo'ladi. K kompakt bo'lгани үчун $\{U_x : x \in K\}$ qoplamaning chekli $U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_n}$ qism qoplamasы mavjud. Bu qism qoplамадағы hech bir to'plam bilan y nuqtanинг

$$V_y = V_y^{x_1} \cap V_y^{x_2} \cap \dots \cap V_y^{x_n}$$

atrofi kesishmaydi, ya'ni

$$V_y \cap (U_{x_1} \cup U_{x_2} \cup \dots \cup U_{x_n}) = \emptyset.$$

$K \subset U_{x_1} \cup U_{x_2} \cup \dots \cup U_{x_n}$ munosabati o'rинли bo'lгани үчун $y \notin [K]$. Bundan K to'plamining yопиқ ekanligи келіб чиқади.

5.2.7. Har bir kompakt normal fazо bo'lishini isbotlang.

Yechimi. A va B to'plamlар K kompaktning o'заро кесishmaydиган yопиқ qism to'plamlари bo'lsin. 5.2.5-misoldan A va B to'plamlар kompakt ekanligи келіб чиқади. 5.2.6-misoldan A to'plam va har bir $y \in B$ nuqtanинг o'заро кесishmaydиган U_y va V_y atroflarining mavjud ekanligи келіб чиқади. Demak, K kompakt регуляр fazо bo'lar ekan. B to'plamining $\{V_y : y \in B\}$ очиқ qoplamasыдан chekli $\{V_{y_1}, V_{y_2}, \dots, V_{y_n}\}$

qism qoplama ajratib olamiz. U holda

$$A \subset U_A = U_{y_1} \cap U_{y_2} \cap \dots \cap U_{y_n},$$

$$B \subset V_B = V_{y_1} \cup V_{y_2} \cup \dots \cup V_{y_n}$$

va

$$U_A \cap V_B = \emptyset$$

munosabatlар о‘ринли. Demak, K kompakt normal fazо bo‘лади.

5.2.8. Kompaktli fazoning uzluksiz akslantirishdagi obrazi kompaktli fazо bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. X kompaktli topologik fazо, f esa X ni biror Y topologik fazoga uzluksiz akslantirish bo‘lsin. $f(X)$ fazoning xohlagan $\{V_\alpha\}$ ochiq qoplamasini qaraymiz. f akslantirish uzluksiz bo‘lganligi sababli $f^{-1}(V_\alpha)$ to‘plamlar ochlq bo‘lib, $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ sistema X fazoning ochiq qoplamasи bo‘лади. X fazо kompaktli bo‘lgани учун chekli

$$\{f^{-1}(V_1), f^{-1}(V_2), \dots, f^{-1}(V_n)\}$$

qism qoplama mavjud bo‘лади, ya’ni $X \subset \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(V_k)$. Bundan

$$f(X) \subset f\left(\bigcup_{k=1}^n f^{-1}(V_k)\right) = \bigcup_{k=1}^n f(f^{-1}(V_k)) = \bigcup_{k=1}^n V_k.$$

Demak, $f(X)$ fazо kompaktli.

5.2.9. X kompaktni Y Hausdorff fazosiga o‘zaro bir qiyamatli uzluksiz φ akslantirish gomeomorfizm bo‘lishini isbotlang.

Yechimi. X fazosidan xohlagan yopiq F to‘plamini olamiz. F kompakt (5.2.5-misolga qarang) bo‘lgани учун, $G = \varphi(F)$ to‘plam (5.2.8-misolga qarang) kompakt bo‘лади. Natijada 5.2.6-misol bo‘yicha G to‘plam yopiq. Demak, φ^{-1} akslantirishda xohlagan yopiq $F \subset X$ to‘plamning proobrazi yopiq. Bundan φ^{-1} akslantirishning uzluksiz ekanligi, demak, φ ning gomeomorfizm ekanligi kelib chiqadi.

5.2.10. Quyidagi shartlarning o‘zaro ekvivalent ekanligini isbotlang:

i) X fazosining har bir sanoqli ochiq qoplamasи chekli qism qoplamaga ega;

ii) X fazosining yopiq qism to‘plamlaridan iborat har bir sanoqli markazlashgan sistemasi bo‘sh bo‘lmagan kesishmaga ega.

Yechimi. i) shart o'rinli bo'lib, yopiq to'plamlarning sanoqli $\{F_n\}$ markazlashgan sistemasi berilgan bo'lsm. Agar $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset$ deb faraz qilsak, u holda

$$\{G_n : G_n = X \setminus F_n\}$$

ochiq to'plamlar sistemasi X fazosi uchun ochiq qoplama bo'ladi. Haqiqatan,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus F_n) = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = X.$$

i) shart bo'yicha $\{G_n\}$ qoplamaning chekli $G_{n_1}, G_{n_2}, \dots, G_{n_k}$ qism qoplamasi mavjud. U holda

$$\bigcap_{i=1}^k F_{n_i} = \bigcap_{i=1}^k (X \setminus G_{n_i}) = X \setminus \bigcup_{i=1}^k G_{n_i} = \emptyset.$$

Bu $\{F_n\}$ sistemaning markazlashgan ekanligiga zid.

Endi ii) shart o'rinli bo'lib, X topologik fazoning sanoqli $\{G_n\}$ ochiq qoplamasini berilgan bo'lsm. $F_n = X \setminus G_n$ yopiq to'plamlarning $\{F_n\}$ sistemasini uchun

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus G_n) = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = \emptyset.$$

Masala sharti bo'yicha, X fazosidagi yopiq to'plamlarning xohlagan sanoqli markazlashgan sistemasi bo'sh bo'lмаган kesishmaga ega. Shu sababli $\{F_n\}$ sistema markazlashgan bo'la olmaydi. U holda bu sistemada kesishmasi bo'sh bo'lgan chekli sondagi F_1, F_2, \dots, F_m to'plamlar mavjud. Bundan

$$X = X \setminus \left(\bigcap_{k=1}^m F_k \right) = \bigcup_{k=1}^m (X \setminus F_k) = \bigcup_{k=1}^m G_k.$$

Demak, $\{G_n\}$ ochiq qoplamanidan chekli qoplama ajratib olish mumkin ekan, ya'ni i) shart o'rmlisi.

5.2.11. X topologik fazo sanoqli-kompakt bo'lishi uchun yopiq qism to'plamlardan iborat har bir sanoqli markazlashgan sistemasi bo'sh bo'lмаган kesishmaga ega bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. Sanoqli-kompakt X fazoning yopiq to'plamlaridan iborat sanoqli $\{F_n\}$ markazlashgan sistema berilgan bo'lsm. $\Phi_n = \bigcap_{k=1}^n F_k$ bo'lsm. $\{F_n\}$ markazlashgan sistema

bo'lganligidan va yopiq to'plamlarning kesishmasi yopiq bo'lganligidan, har bir Φ_n to'plain bo'sh bo'lmasagan yopiq to'plain bo'ladi. Shu bilan birga,

$$\Phi_1 \supset \Phi_2 \supset \dots \supset \Phi_n \supset \dots$$

munosabat, demak, $\bigcap_n \Phi_n = \bigcap_n F_n$ tengligi o'rinni. Natijada quyidagi ikki hol bo'lishi mumkin:

1 – hol. Biror n_0 natural sonidan boshlab

$$\Phi_{n_0} = \Phi_{n_0+1} = \dots$$

tengliklari o'rinni. U holda

$$\bigcap_{n \geq 1} \Phi_n = \Phi_{n_0} \neq \emptyset.$$

2 – hol. Φ_n to'plamlar orasida cheksiz sondagi o'zaro har xil to'plamlar mavjud. Bu holda barcha Φ_n lar o'zaro har xil bo'lgan holni qarash yetarli. $x_n \in \Phi_n \setminus \Phi_{n+1}$ nuqtalardan iborat $\{x_n\}$ ketma-ketlik X fazoning cheksiz qism to'plami bo'ladi. X sanoqli-kompakt bo'lganligidan, $\{x_n\}$ ketma-ketlik kamida bitta x_0 limit nuqtaga ega. x_n, x_{n+1}, \dots nuqtalar Φ_n to'plamiga tegishli bo'lganligidan, x_0 nuqta Φ_n uchun ham limit nuqta bo'ladi, Φ_n to'plamning yopiqligidan $x_0 \in \Phi_n$. Bundan $x_0 \in \bigcap_n \Phi_n$, ya'ni $\bigcap_n \Phi_n \neq \emptyset$.

Yetariligi esa 5.2.2 va 5.2.10-misollardan kelib chiqadi.

5.2.12. Metrik fazodan olingan E to'plamning kompakt bo'lishi uchun uning sanoqli-kompakt bo'lishi zarur va yetarli.

Yechimi. Zarurligi. E to'plam kompakt bo'lsin. E to'plamdan ixtiyoriy $\{x_n\}$ ketma-ketlikni olamiz. Bu ketma-ketlikning birorta ham qismiy ketma-ketligi E da yaqinlashuvchi emas deb faraz qilaylik. U holda E to'plamning har bir z elementi berilgan ketma-ketlikning faqat chekli hadlarinigma o'z ichiga oluvchi $V(z)$ atrofga ega bo'ladi. Bu atroflar E uchun ochiq qoplama hosil qiladi. E kompakt bo'lgani uchun chekli sondagi $z_1, z_2, \dots, z_k \in E$ elementlar mavjud bo'lib,

$$E \subset V(z_1) \cup V(z_2) \cup \dots \cup V(z_k)$$

munosabat o'rinni bo'ladi. Ammo bu munosabatning o'rinni bo'lishi mumkin emas, sababi $V(z_1) \cup V(z_2) \cup \dots \cup V(z_k)$ to'plamlarga $\{x_n\}$ ketma-ketligining faqat chekli sondagi hadlari tegishli, E to'plamga esa barcha hadlari tegishli. Bu ziddiyatdan farazimizning noto'g'ri ekanligi

kelib chiqadi. U holda E dan olingan ixtiyoriy ketma-ketlik E da yaqinlashuvchi qisiniy ketma-ketlikka ega ekan. Bundan esa E to'plamning sanoqli-kompakt ekanligi kelib chiqadi.

Yetariligi. E sanoqli-kompakt to'plam bo'lzin. Faraz qilaylik E kompakt bo'lmasin. U holda E to'plamdan chekli qism qoplama ajratib olish mumkin bo'lmasigan $\{G_\alpha\}$ ochiq qoplamasini mavjud bo'ladi. Nolga intiluvchi kamayuvchi $\{\varepsilon_n\}$ sonli ketma-ketlik olamiz. E uchun chekli ε -to'r tuzib (Hausdorff teoremasi bo'yicha chekli ε -to'r tuzish mumkin), bu to'rnинг har bir elementi atrofida radiusi ε_1 bo'lgan shar hosil qilaniiz. Sanoqli-kompakt to'plamning yopiq qism to'plami sanoqli-kompakt bo'lgani uchun hosil qilingan har bir shar yopilmasining E to'plam bilan kesishmasi sanoqli-kompakt bo'ladi. Bu kesishmalaridan hosil bo'lgan to'plamlarning diametrлари $2\varepsilon_1$ sonidan katta emas. Natijada E to'plam diametrлари $2\varepsilon_1$ sonidan katta bo'lmasigan chekli sondagi sanoqli-kompakt to'plamlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalayadi. Farazimiz bo'yicha $\{G_\alpha\}$ sistemaning chekli qism qoplamasini mavjud emas. U holda birlashmadagi sanoqli-kompaktlarning hech biri ham chekli ochiq qoplamaga ega emas. Bu sanoqli-kompaktni E_1 orqali belgilaymiz.

Endi E_1 to'plam uchun chekli ε_2 -to'r tuzamiz va bu to'rnинг har bir elementi atrofida radiusi ε_2 ga teng shar hosil qilib, E_1 to'plamni, yuqoridaqiday qilib, diametrлари $2\varepsilon_2$ sonidan katta bo'lmasigan chekli sondagi sanoqli-kompaktlarning birlashmasi ko'rinishda ifodalaymiz. Bu birlashmadagi $\{G_\alpha\}$ sistemaning chekli sondagi to'plamlari bilan qoplamaydigan kompakt to'plamni E_2 orqali belgilaymiz.

Bu jarayonni cheksiz davom ettirsaq sanoqli-kompaktlarning kamayuvchi

$$E \supset E_1 \supset E_2 \supset \dots$$

ketma-ketligiga ega bo'lamiz. Bu ketma-ketlikdagи hech bir sanoqli-kompakt $\{G_\alpha\}$ sistemaning chekli sondagi to'plamlari bilan qoplamaydi va $\text{diam } E_n \rightarrow 0$. ξ element bu kompaktlarga tegishli umumiy muqta bo'lzin (5.2.10-misolga qarang). $\xi \in E$ bo'lgani uchun $\{G_\alpha\}$ sistemaga tegishli G_{α_0} to'plam topilib, $\xi \in G_{\alpha_0}$ bo'ladi va $2\varepsilon_{n_0} < \delta$ bo'lzin. U holda $E_{n_0} \subset G_{\alpha_0}$. Bu farazimizga zid. Demak, E to'plam kompakt.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Sanoqli bazaga ega topologik fazoming xohlagan ochiq qoplamasini sanoqli qism qoplamaga ega ekanligini isbotlang .

2. Kompaktli topologik fazoda aniqlangan ixtiyoriy uzluksziz sonli funksiya shu fazoda chegaralangan bo'lib, o'zining aniq quyisi va aniq yuqori chegarasiga ega bo'lismeni isbotlang.
3. T_1 -fazo sanoqli kompakt bo'lismi uchun muqtalaridan iborat xohlagan ketma-ketlik kamida bir limit nuqtaga ega bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

4. Sanoqli bazaga ega topologik fazoda kompakt va sanoqli kompakt-likning ozaro teng kuchli ekanligini isbotlang.
5. Sanoqli-kompaktli topologik fazoning xoqlagan yopiq qismi to'plamining sanoqli-kompaktli fazo bo'lismini isbotlang.

6. $[0, 1)$ yarim intervalning kompakt emasligini ko'rsating.
7. s barcha haqiqiy sonlar ketma-ketliklar fazosida

$$\{x = (x_n) : |x_n| \leq 1\}$$

to'plamning kompaktligini ko'rsating.

8. Agar topologik fazoda aniqlangan har bir uzluksziz funksiya chegaralangan bo'lsa, u holda bu topologik fazo kompakt bo'ladimi?

9. Kantor to'plamning kompakt ekanligini ko'rsating.

5.3. Chiziqli topologik fazolar

E to'plam quyidagi shartlarni qanoatlantirsa, u holda E chiziqli topologik fazo deyiladi:

- a) E chiziqli fazo;
- b) E topologik fazo;
- c) E da qo'shish va songa ko'paytirish amallari uzluksziz.

Qo'shish va songa ko'paytirish amallaringi quyidagini anglatadi:

- 1) agar $z_0 = x_0 + y_0$ bo'lsa, u holda z_0 nuqtaning ixtiyoriy U atrofi uchun x_0 va y_0 muqtalarning mos ravishda V va W atroflari toplib, ixtiyoriy $x \in V, y \in W$ muqtalar uchun $x + y \in U$ sharti bajariladi;
- 2) agar $y_0 = \lambda_0 x_0$ bo'lsa, u holda y_0 nulltaning ixtiyoriy U atrofi uchun x_0 nuqtaning V atrofi va $\varepsilon > 0$ soni toplib, ixtiyoriy $x \in V$ va $|\lambda - \lambda_0| < \varepsilon$ lar uchun $\lambda x \in U$ sharti bajariladi.

E chiziqli topologik fazo va $A \subset E$ bo'lsin.

Agar $\forall x \in A, \forall \alpha, |\alpha| \leq 1$ uchun $\alpha x \in A$ bo'lsa, u holda A muvozanatlashgan to'plam deyiladi.

Agar $\forall x \in E$ uchun shunday $\alpha > 0$ toplib, $\alpha^{-1}x \in A$ bo'lsa, u holda A yutuvchi to'plam deyiladi.

2. Kompaktli topologik fazoda aniqlangan ixtiyoriy uzluksziz sonli funksiya shu fazoda chegaralangan bo'lib, o'zining aniq quyisi va aniq yuqori chegarasiga ega bo'lismeni isbotlang.

3. T_1 -fazo sanoqli kompakt bo'lismi uchun muqtalaridan iborat xohlagan ketma-ketlik kamida bir limit nuqtaga ega bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

4. Sanoqli bazaga ega topologik fazoda kompakt va sanoqli kompakt-likning ozaro teng kuchli ekanligini isbotlang.
5. Sanoqli-kompaktli topologik fazoning xoqlagan yopiq qismi to'plamining sanoqli-kompaktli fazo bo'lismini isbotlang.

6. $[0, 1)$ yarim intervalning kompakt emasligini ko'rsating.
7. s barcha haqiqiy sonlar ketma-ketliklar fazosida

$$U(p_1, p_2, \dots, p_n, \varepsilon) = \{x \in E : p_i(x) < \varepsilon, i = \overline{1, n}\},$$

bunda $p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathcal{P}$, $\varepsilon > 0$, to'plamlar sistemasi E fazo nolining atrofflarini tashkil etadi.

Agar har bir $x \in E$, $x \neq 0$, uchun shunday $p_\alpha \in A$ toplib, $p_\alpha(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda \mathcal{P} yarim normalar sistemasi a'ratuvchi deyiladi.

E chiziqli fazo, \mathcal{P} yarim normalar sistemasi va $M \subset E$ bo'lsin. Agar $p \in \mathcal{P}$ uchun shunday c_p soni toplib, barcha $x \in M$ uchun $p(x) \leq c_p$ tengsizligi bajarilsa, M to'plam p yarim norma bo'yicha chegaralangan deyiladi.

Masalalar

- 5.3.1. Chiziqli topologik fazoning U ochiq to'plami qavarig bo'lishi uchun $U + U = 2U$ tengligi bajarilishi zarur va yetarli dir.

Yechimi. U ochiq qavariq to'plam bo'lsin. $U + U = 2U$ ekanligini ko'rsatamiz.

$z \in U + U$ bo'lsa, u holda $x, y \in U$ nuqtalar toplib, $z = x + y$ tenligi o'rinni. U qavariq bo'lganligidan, $\frac{1}{2}(x + y) \in U$. Bundan

$$z = 2 \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \right) \in 2U,$$

$ya'nii U + U \subseteq 2U$.

Endi $z \in 2U$ bo'lsa, u holda $z = 2x, x \in U$. Bundan $z = x + x \in U + U$, $ya'nii 2U \subseteq U + U$. Demak, $U + U = 2U$.

Endi $U + U = 2U$ bo'lsin. $x, y \in U$ nuqtalarni olamiz. U holda $x+y \in U+U$. $U+U = 2U$ ekanligidan, $x+y \in 2U$. Bundan $\frac{1}{2}(x+y) \in U$. Bundan

$$\frac{m}{2^n}x + \left(1 - \frac{m}{2^n}\right)y \in U,$$

bu yerda $0 < \frac{m}{2^n} < 1$. Endi U ochiq to'plam ekanligidan, ixtiyoriy $0 < t < 1$ uchun $tx + (1-t)y \in U$, ya'ni U qavariq to'plam.

5.3.2. A absolyut qavariq to'plam bo'lishi uchun uning muvozanatlashgan va qavariqligi zarur va yetarlidir.

Yechimi. Absolyut qavariq to'plamning muvozanatlashgan va qavariqligi bevosita ta'rifdan kelib chiqadi.

Aksincha A muvozanatlashgan va qavariq, $x, y \in A$ va $|\alpha| + |\beta| \leq 1$ bo'lsin. Agar $\alpha = 0$ yoki $\beta = 0$ bo'lsa, u holda $\alpha x + \beta y \in A$ ekanligi ravshan.

$\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ deylik. U holda A muvozanatlashgan ekanligidan,

$$\frac{\alpha}{|\alpha|}x \in A, \frac{\beta}{|\beta|} \in A.$$

Endi A ning qavariqligi va

$$\frac{|\alpha|}{|\alpha| + |\beta|} + \frac{|\beta|}{|\alpha| + |\beta|} = 1$$

tengligidan

$$\alpha x + \beta y = (|\alpha| + |\beta|) \left(\frac{|\alpha|}{|\alpha| + |\beta|} \frac{\alpha}{|\alpha|}x + \frac{|\beta|}{|\alpha| + |\beta|} \frac{\beta}{|\beta|}y \right) \in A.$$

5.3.3. Chiziqli topologik fazoda T_3 -aksioma bajarilishini ko'rsating.

Yechimi. Aniqlik uchun $x = 0$ nuqtani va bu nuqtani o'z ichiga olmag'an F yopiq to'plamning o'zaro kesishmaydigan atroflari mavjudligini ko'rsatamiz.

$U = E \setminus F$ bo'lsin. Ayirish amalinig uzluksizligidan nolning W atrofi to'plib, $W - W \in U$ munosabati bajariladi.

$[W] \subseteq U$ ekanligini ko'rsatamiz. $y \in [W]$ bo'lsin. U holda y nuqtaning ixtiyoriy atrofi, jumladan $y + W$ atrofi W to'plam bilan keshishadi, ya'ni $z \in (y + W) \cap W$ nuqta mavjud. U holda $z - y \in W$. Bundan

$$y = z - (z - y) \in W - W \subseteq U,$$

ya'ni $[W] \subseteq U$.

Endi W va $E \setminus [W]$ ochiq to'plamlar 0 nuqta va F to'plamlarning o'zaro kesishmaydigan atroflari bo'ladi.

5.3.4. *s barcha haqiqiy sonlar ketma-ketligi fazosida*

$$p_n((x_k)) = |x_n|, \quad (x_k) \in s, \quad \dots \quad (5.1)$$

$n \in \mathbb{N}$, yarim normalar sistemsi ajratuvchi ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $x = (x_k) \in s$, $x \neq 0$ bo'lsin. U holda shunday $n \in \mathbb{N}$ topilib, $x_n \neq 0$. Demak, $p_n(x) = |x_n| \neq 0$, ya'ni, $\{p_n\}$ yarim normalar sistemasi ajratuvchi bo'ladi.

5.3.5. *s fazoda (5.1) formula orqali aniqlangan topologiya*

$$\rho((x_n), (y_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}, \quad (x_n), (y_n) \in s \quad (5.2)$$

metrika orqali aniqlangan topologiya bilan ustma-ust tushishini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik,

$$U(p_1, p_2, \dots, p_n, \varepsilon) = \{x \in s : p_i(x) < \varepsilon, i = \overline{1, n}\}$$

yarim normalar hosil etgan nolning atrofi bo'lsin. U holda har bir $1 \leq i \leq n$ uchun $|x_i| < \varepsilon$. Bundan (5.2) ga asosan, $\rho(0, x) < \varepsilon$, ya'ni x nuqta ρ metrika bo'yicha nolning ε -atrofiga tegishlidir.

Aytaylik, x nuqta ρ metrika bo'yicha nolning ε -atrofiga tegishli, ya'ni $\rho(0, x) < \varepsilon$ bo'lsin. $\varepsilon > \frac{1}{2^n}$ bo'lgan n sonini olamiz. U holda

$$x \in U(p_1, p_2, \dots, p_n, \varepsilon).$$

Demak, bu topologiyalar ustma-ust tushadi.

5.3.6. *E chiziqli fazo va \mathcal{P} yarim normalar sistemasi bo'lsin.* $M \subset E$ to'plam chegaralangan bo'lishi uchun bu to'plam har bir $p \in \mathcal{P}$ yarim norma bo'yicha chegaralangan bo'lishi zarur va yetarli.

Yechimi. Zarurligi. $M \subset E$ to'plam chegaralangan bo'lsin. Har bir $p \in \mathcal{P}$ uchun

$$U(p, 1) = \{x \in E : p(x) < 1\}$$

ochiq to'plamni qaraylik.

M to'plami chegaralangan ekanligidan, shunday $\lambda_0 > 0$ soni topilib, barcha $\lambda > \lambda_0$ uchun $M \subseteq \lambda U(p, 1)$ imunosabati bajariladi. Demak, barcha $x \in M$ uchun $p(x) \leq \lambda_0$ tengsizligi bajariladi.

Yetarliligi. Endi M to'plam har bir $p \in \mathcal{P}$ yarim norma bo'yicha chegaralangan bo'lsin, ya'ni har bir $p \in \mathcal{P}$ uchun shunday c_p soni topilib, barcha $x \in M$ uchun $p(x) \leq c_p$ tengsizligi bajariladi.

U nolning biror atrofi bo'lsin. U holda sunday $p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathcal{P}$, $\varepsilon > 0$, topilib,

$$U(p_1, p_2, \dots, p_n, \varepsilon) \subset U$$

bajariladi. $\lambda_0 = \varepsilon^{-1} \max\{c_{p_1}, \dots, c_{p_n}\}$ bo'lsin. U holda har bir $x \in M$ uchun $p_i(x) \leq c_{p_i}$ ekanligidan, $p_i(x) \leq \lambda_0 \varepsilon$ kelib chiqadi. Demak, $x \in \lambda_0 U(p_1, p_2, \dots, p_n, \varepsilon)$, ya'ni $M \subset \lambda_0 U$.

5.3.7. *$C(0, 1) - (0, 1)$ intervalda aniqlangan barcha haqiqiy uzluksiz funksiyalar fazosi bo'lsin. $C(0, 1)$ fazoda f funksiya atroflari sistemasi*

$$V(f, \varepsilon) = \{g \in C(0, 1) : |f(t) - g(t)| < \varepsilon, \forall t \in (0, 1)\}$$

ko'rinishdagi to'plamlardan iborat bo'lsin. Bu topologiyada qo'shish amali uzluksiz bo'lib, songa ko'paytirish amali uzluksiz emasligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $g, h \in C(0, 1)$, $f = g + h$ bo'lsin.

$$V(g, \varepsilon) + V(h, \varepsilon) \subset V(f, 2\varepsilon)$$

ekanligini ko'rsatamiz.

$g_1 \in V(g, \varepsilon)$, $h_1 \in V(h, \varepsilon)$, $f_1 = g_1 + h_1$ bo'lsin. U holda $\forall t \in (0, 1)$ uchun $|g(t) - g_1(t)| < \varepsilon$ va $|h(t) - h_1(t)| < \varepsilon$ tensizliklar o'rmla. Bundan

$$\begin{aligned} |f(t) - f_1(t)| &= |g(t) - g_1(t) + h(t) - h_1(t)| \leq \\ &\leq |g(t) - g_1(t)| + |h(t) - h_1(t)| < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

ya'ni $f_1 \in V(f, 2\varepsilon)$. Demak, $C(0, 1)$ fazoda qo'shish amali uzluksiz bo'ladi.

Faraz qilaylik songa ko'paytirish amali ham uzluksiz bo'lsin. $f(t) = \frac{1}{t}$ funksiyasini olaylik. U holda shunday $\delta > 0$ soni topilib, $|\lambda| < \delta$ tensizligini qanoatlantiruvchi barcha $\lambda \in \mathbb{R}$ sonlari uchun

$$\lambda V(f, \delta) \subset V(0, 1)$$

munosabati bajariladi. Bundan $\lambda = \frac{\delta}{2}$ uchun

$$\frac{\delta}{2} |f| < 1,$$

ya'ni $\forall t \in (0, 1)$ uchun

$$\frac{\delta}{2} < t$$

tensizligi bajariladi. Bundan $\delta \leq 0$. Bu esa $\delta > 0$ ekanligiga zid. Hosil bo'lgan ziddiyatdan $C(0, 1)$ fazoda songa ko'paytirish amali uzlusiz emasligi kelib chiqadi.

5.3.8. $L^0(\Omega, \Sigma, \mu) = (\Omega, \Sigma, \mu)$ o'lchovli fazoda aniqlangan baracha haqiqiy o'lcovli funksiyalar fazosida

$$U(\varepsilon, \delta) = \{f \in L^0(\Omega, \Sigma, \mu) : \exists A \in \Sigma, \mu(\Omega \setminus A) < \delta, |f\chi_A| < \varepsilon\}$$

to'plamlarni qaraylik, bunda $\varepsilon > 0, \delta > 0$. Quyidagilarni isbotlang:

- 1) $\lambda U(\varepsilon, \delta) = U(|\lambda|\varepsilon, \delta)$, **bunda** $\lambda \neq 0$;
- 2) $U(\varepsilon, \delta) + U(\varepsilon, \delta) \subset U(2\varepsilon, 2\delta)$;
- 3) $\bigcap\{U(\varepsilon, \delta) : \varepsilon > 0, \delta > 0\} = \{0\}$.

Yechimi. 1) Faraz qilaylik $f \in \lambda U(\varepsilon, \delta)$, $\lambda \neq 0$. U holda shunday $g \in U(\varepsilon, \delta)$ topilib, $f = \lambda g$. Endi $g \in U(\varepsilon, \delta)$ bo'lganligidan,

$$\exists A \in \Sigma, \Rightarrow \mu(\Omega \setminus A) < \delta, |g\chi_A| < \varepsilon.$$

Bundan

$$|f\chi_A| = |\lambda g\chi_A| < |\lambda|\varepsilon.$$

Demak, $f \in U(|\lambda|\varepsilon, \delta)$.

Endi $f \in U(|\lambda|\varepsilon, \delta)$ bo'lsin. U holda

$$\exists A \in \Sigma, \mu(\Omega \setminus A) < \delta, |f\chi_A| < |\lambda|\varepsilon.$$

Bundan $\left| \int f \chi_A \right| < \varepsilon$. Demak, $\int f \chi_A \in U(\varepsilon, \delta)$, ya'mi $f \in \lambda U(\varepsilon, \delta)$.

2) $f, g \in U(\varepsilon, \delta)$ bo'lsin. U holda shunday $A, B \in \Sigma$ mavjud bo'lbob,

$$\mu(\Omega \setminus A) < \delta, |f\chi_A| < \varepsilon$$

va

$$\mu(\Omega \setminus B) < \delta, |g\chi_B| < \varepsilon.$$

$C = A \cap B$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \mu(\Omega \setminus C) &= \mu(\Omega \setminus (A \cap B)) = \mu((\Omega \setminus A) \cup (\Omega \setminus B)) \leq \\ &\leq \mu(\Omega \setminus A) + \mu(\Omega \setminus B) < \delta + \delta = 2\delta, \end{aligned}$$

ya'mi

$$\mu(\Omega \setminus C) < 2\delta.$$

$$|f + g|\chi_C \leq |f\chi_C| + |g\chi_C| \leq |f\chi_A| + |g\chi_B| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

ya'ni

$$|f + g|\chi_C < 2\varepsilon.$$

Demak, $f + g \in U(2\varepsilon, 2\delta)$, ya'ni $U(\varepsilon, \delta) + U(\varepsilon, \delta) \subset U(2\varepsilon, 2\delta)$.

3) Aytaylik, barcha $\varepsilon > 0, \delta > 0$ uchun $f \in U(\varepsilon, \delta)$ bo'lsin. Faraz qilaylik, $f \neq 0$. U holda shunday $\lambda > 0$ soni topilib,

$$E = \{t \in \Omega : |f(t)| \geq \lambda\}$$

to'plami musbat o'lchovga ega bo'ladi, hamda $\chi_E|f| \geq \lambda\chi_E$.

Endi $\delta < \mu(E)$ shartni qanoatlantiruvchi $\delta > 0$ sonini olaylik. Faraz qilaylik, $f \in U\left(\frac{\lambda}{2}, \delta\right)$. U holda

$$\exists A \in \Sigma, \Rightarrow \mu(\Omega \setminus A) < \delta, |f\chi_A| < \frac{\lambda}{2}.$$

Quyidagi

$$\chi_E|f| \geq \lambda\chi_E,$$

$$|f\chi_A| < \frac{\lambda}{2}$$

tengsizliklardan $E \cap A = \emptyset$ kelib chiqadi. Demak, $E \subset \Omega \setminus A$ va $\mu(E) \leq \mu(\Omega \setminus A) < \delta$, ya'ni $\mu(E) < \delta$. Bu esa $\delta < \mu(E)$ tengsizligiga zid. Hosil bo'lgan ziddiyatdan $f = 0$ ekanligi kelib chiqadi. Demak, $\bigcap\{U(\varepsilon, \delta) : \varepsilon > 0, \delta > 0\} = \{0\}$.

5.3.9. Agar $A_n \in \Sigma$ va $\chi_{A_n} \xrightarrow{\mu} 0$ bo'lsa, u holda $\mu(A_n) \rightarrow 0$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $A_n \in \Sigma$ va $\chi_{A_n} \xrightarrow{\mu} 0$ bo'lsin. Ixtiyoriy $\delta > 0$, $0 < \varepsilon < 1$ sonlarini olaylik. $\chi_{A_n} \xrightarrow{\mu} 0$ bo'lganligidan, shunday n_0 nomeri topilib, barcha $n \geq n_0$ nomerlari uchun $\chi_{A_n} \in U(\varepsilon, \delta)$ bajariladi. Bundan $\forall n \geq n_0$ uchun shunday $B_n \in \Sigma$ topilib,

$$\mu(\Omega \setminus B_n) < \delta, |\chi_{A_n}\chi_{B_n}| < \varepsilon < 1.$$

Bundan $\chi_{A_n}\chi_{B_n} = 0$, ya'ni $A_n \cap B_n = \emptyset$. Demak, $A_n \subset \Omega \setminus B_n$ va

$$\mu(A_n) \leq \mu(\Omega \setminus B_n) < \delta,$$

ya'ni $\mu(A_n) \rightarrow 0$.

5.3.10. Agar $\mu(\Omega) < +\infty$ bo'lsa, $L^0(\Omega, \Sigma, \mu)$ fazoda o'lchov bo'yicha yaqinlashish topologiyasi

$$\rho(f, g) = \int_{\Omega} \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} d\mu(t)$$

metrika hosil etgan topologiya bilan ustma-ust tushishini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $\varepsilon > 0$ va $f \in U(\varepsilon, \varepsilon)$ bo'lsin. U holda shunday $A \in \Sigma$ to'plam topilib,

$$\mu(\Omega \setminus A) < \varepsilon, \quad |f\chi_A| < \varepsilon.$$

Bundan

$$\begin{aligned} \rho(f, 0) &= \int_{\Omega} \frac{|f(t)|}{1 + |f(t)|} d\mu(t) = \\ &= \int_{\Omega \setminus A} \frac{|f(t)|}{1 + |f(t)|} d\mu(t) + \int_A \frac{|f(t)|}{1 + |f(t)|} d\mu(t) \leq \\ &\leq \int_{\Omega \setminus A} 1 d\mu(t) + \int_A \varepsilon d\mu(t) = \mu(\Omega \setminus A) + \varepsilon \mu(A) < \varepsilon + \varepsilon \mu(A), \end{aligned}$$

ya'ni

$$\rho(f, 0) < \varepsilon(1 + \mu(\Omega)).$$

Demak, $U(\varepsilon, \varepsilon) \subset B(0, r)$, bu yerda $r = \varepsilon(1 + \mu(\Omega))$.

Endi ixtiyoriy ε , $\delta > 0$ sonlar uchun shunday $r > 0$ topilib,

$$B(0, r) \subset U(\varepsilon, \delta)$$

ekanligini ko'rsatamiz.

$$r = \frac{\delta \varepsilon}{1 + \varepsilon} \text{ bo'lsin.}$$

$$A = \{t \in \Omega : |f(t)| < \varepsilon\}$$

to'plamni olamiz. U holda $f \in B(0, r)$ uchun

$$\begin{aligned} r > \rho(f, 0) &= \int_{\Omega} \frac{|f(t)|}{1 + |f(t)|} d\mu(t) \geq \int_{\Omega \setminus A} \frac{|f(t)|}{1 + |f(t)|} d\mu(t) \geq \\ &\geq \int_{\Omega \setminus A} \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} d\mu(t) = \mu(\Omega \setminus A) \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}. \end{aligned}$$

Bundan

$$\mu(\Omega \setminus A) < r \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon} = \frac{\delta \varepsilon}{1 + \varepsilon} \cdot \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon} = \delta,$$

ya'ni $\mu(\Omega \setminus A) < \delta$. Hamda $|f\chi_A| < \varepsilon$. Demak, $f \in U(\varepsilon, \delta)$. Bundan $B(0, r) \subset U(\varepsilon, \delta)$ munosabatga ega bo'lamiz.

5.3.11. E chiziqli topologik fazo. $A \subset E$ chegaralangan bo‘lishi uchun ixtiyoriy $\{x_n\} \subset A$ va $\lambda_n \rightarrow 0$, $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{R}$ uchun $\lambda_n x_n \rightarrow 0$ bajarilishi zarur va yetarli.

Yechimi. Zarurligi. $\{x_n\} \subset A$, $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{R}$, $\lambda_n \rightarrow 0$ bo‘lsin. V nolning muvozonaatlashirilgan atrofi bo‘lsa, u holda shunday $\lambda > 0$ topilib, $A \subset \lambda V$. Jumladan, $x_n \in \lambda V$, $n \in \mathbb{N}$. Endi $|\lambda_n| \leq \frac{1}{\lambda}$ bo‘lgan n lar uchun $\lambda_n x_n \in \lambda_n \lambda V \subset V$, ya’ni $\lambda_n x_n \rightarrow 0$.

Yetarliligi. Faraz qilaylik, A chegaralanmagan to‘plam. U holda nolning shunday V atrofi topilib, barcha λ uchun $A \setminus \lambda V \neq \emptyset$. $\lambda = 1, 2, \dots$ qiyatlarida

$$x_n \in A \setminus nV, n = 1, 2, \dots$$

nuqtalarini olamiz. $\{x_n\} \subset A$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ dan $\frac{1}{n} x_n \rightarrow 0$. Lekin bu barcha n lar uchun $\frac{1}{n} x_n \notin V$ ekanligiga ziddir.

5.3.12. Agar A va B to‘plamlar chegaralangan bo‘lsa, u holda

$$A + B = \{x : x = y + z, y \in A, z \in B\}$$

to‘plam ham chegaralanganligini ko‘rsating.

Yechimi. $\{x_n\} \subset A + B$, $\{\lambda_n\} \subset \mathbb{R}$, $\lambda_n \rightarrow 0$ bo‘lsin. U holda har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $y_n \in A$, $z_n \in B$ topilib, $x_n = y_n + z_n$. A va B chegaralanganlididan, 5.3.11-misolga ko‘ra $\lambda_n y_n \rightarrow 0$ va $\lambda_n z_n \rightarrow 0$. Bundan $\lambda_n x_n = \lambda_n y_n + \lambda_n z_n \rightarrow 0$. Yana 5.3.11-misoldan $A + B$ chegaralangandir.

5.3.13. E chiziqli topologik fazo, $A \subset E$ qavariq, muvozanaatlashgan, yutuvchi to‘plam bo‘lsin. E fazoda

$$p_A(x) = \inf\{t > 0 : t^{-1}x \in A\}$$

funksionalni qaraylik. Bu funksionalga Minkovskiy funksionali deyiladi va u quyidagi xossalarga ega:

- a) $p_A(\alpha x) = |\alpha| p_A(x)$;
- b) $p_A(x + y) \leq p_A(x) + p_A(y)$.

Yechimi. a) Avval $\alpha \geq 0$ holni qaraymiz.

$$\begin{aligned} p_A(\alpha x) &= \inf\{t > 0 : t^{-1}\alpha x \in A\} = \inf\{\alpha t > 0 : t^{-1}x \in A\} = \\ &= \alpha \inf\{t > 0 : t^{-1}x \in A\} = |\alpha| p_A(x). \end{aligned}$$

Endi $p_A(-x) = p_A(x)$ tengligini ko‘rsatamiz. A muvozanaatlashgan to‘plam ekanlididan, $A = -A$. Bundan

$$\begin{aligned} p_A(-x) &= \inf\{t > 0 : t^{-1}(-x) \in A\} = \inf\{t > 0 : t^{-1}x \in -A\} = \\ &= \inf\{t > 0 : t^{-1}x \in A\} = p_A(x). \end{aligned}$$

Endi $\alpha < 0$ holni qaraymiz.

$$p_A(\alpha x) = p_A((- \alpha)(-x)) = -\alpha p_A(-x) = -\alpha p_A(x) = |\alpha| p_A(x).$$

b) Aytaylik, $p_A(x) < s$, $p_A(y) < t$ va $u = s + t$ bo'lsin. U holda $s^{-1}x \in A$, $t^{-1}y \in A$ va A ning qavariqligidan,

$$u^{-1}(x+y) = \frac{s}{u}(s^{-1}x+) + \frac{t}{u}(t^{-1}y) \in A.$$

Bundan $p_A(x+y) \leq u$, ya'ni $p_A(x+y) \leq p_A(x) + p_A(y)$.

5.3.14. \mathbb{R}^n fazoda

$$V = \{x \in \mathbb{R} : |x_i| \leq a_i, i = \overline{1, n}\},$$

bunda $a_i > 0$, $i = \overline{1, n}$, to'plamning Minkovskiy funksionalini toping.

Yechimi. $x = (x_i) \in \mathbb{R}^n$ bo'lsin. U holda

$$t^{-1}x \in V \Leftrightarrow |t^{-1}x_i| \leq a_i, 1 \leq i \leq n, \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow t \geq \frac{|x_i|}{a_i}, 1 \leq i \leq n, \Leftrightarrow t \geq \max \left\{ \frac{|x_i|}{a_i} : 1 \leq i \leq n \right\}.$$

Demak,

$$t^{-1}x \in V \Leftrightarrow t \geq \max \left\{ \frac{|x_i|}{a_i} : 1 \leq i \leq n \right\}.$$

Bundan

$$p_V(x) = \sup \{t > 0 : t^{-1}x \in V\} = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{|x_i|}{a_i}.$$

Demak,

$$p_V(x) = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{|x_i|}{a_i}.$$

5.3.15. X Hausdorff chiziqli topologik fazosi bo'lsin. X normalangan bo'lishi uchun bu fazoda nolning chegaralangan qavariq V atrofining mavjudligi zarur va yetarlidir.

Yechimi. Zarurligi. X normalangan fazo bo'lsa, u holda uning birlik shari $V = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ nolning chegaralangan qavariq atrofi bo'ladi.

Yetarligi. Aytaylik, V nolning chegaralangan qavariq atrofi bo'lsin. V ning o'rniga $[V] \cap (-[V])$ ni olib, biz V ni absolyut qavariq deb olishimiz mumkin. Har bir $x \in X$ uchun

$$\|x\| = p_V(x)$$

deylik, bunda $p_V - V$ ning Minkovskiy funksionali.
 $x \in X$ uchun $\|x\| = 0$ ekanligidan, $x = 0$ keilib chiqishini ko'rsatamiz.
 X Hausdorff fazosi ekanligidan, nolning shurday U atrofi topilib, $x \notin U$ o'rniqli bo'ladi. V chegaralangan ekanligidan, shunchay $\lambda > 0$ soni mayjudki, $V \subset \lambda U$. U holda $\lambda x \notin V$. Bundan

$$\|x\| = p_V(x) = \frac{1}{\lambda} p_V(\lambda x) > \frac{1}{\lambda},$$

ya'ni $\|x\| \neq 0$. Demak, $\|\cdot\|$ funksiya X fazoda norma bo'ladи.

Endi bu norma hosil etgan topologiya X ning asl topologiyasi bilan ustma-ust tushishini ko'rsatamiz. Aytaylik, U nohing biror atrof bo'sin. V ning chegaralanganligidan, $\lambda > 0$ topilib, $\lambda V \subset U$. Bundan

$$\{\lambda V : \lambda > 0\}$$

sistema nolning atrofvari sistemasi ekanligini ko'rsatadi. Bu esa ikkala topologiyaning aymyligini anglatadi.

Munstaqlil ish uchun masalalar

1. Agar A va B qavariq to'plamlar bo'sa, u holda ixtiyoriy α, β sonlari uchun $\alpha A + \beta B$ qavariq to'plam ekanligini ko'rsating.
2. $\lambda A + \mu A = (\lambda + \mu)A$ tengligi har doim o'rinnimi?
3. Agar $\lambda, \mu \geq 0$ va A qavariq to'plam bo'ssa, u holda $\lambda A + \mu A = (\lambda + \mu)A$ ekanligini isbotlang.
4. Agar A va B muvozamatlashgan to'plamlar bo'ssa, u holda $A + B$ muvozamatlashgan to'plam ekanligini ko'rsating.
5. Agar A va B yopiq to'plamlar bo'ssa, u holda $A + B$ ham yopiq to'plam bo'ladi mi?
6. Agar A yopiq to'plam va B kompakt to'plam bo'ssa, u holda $A + B$ ham yopiq to'plam ekanligini isbotlang.
7. \mathbb{R}^2 da markazi koordinatalar boshida bo'lgan doira uchun Minkovskiy funksionalini toping.
8. \mathbb{R}^2 da markazi koordinatalar boshida va tomonlari koordinatalar o'qilariga parallel bo'lgan kvadrat uchun Minkovskiy funksionalini toping.
9. \mathbb{R}^2 da markazi koordinatalar boshida va diagonallari koordinatalar o'qilarida yotgan kvadrat uchun Minkovskiy funksionalini toping.
10. Chiziqli topologik fazoda chekli sondagi chegaralangan to'plamlarning birlashamsi ham chegaralangan ekanligini ko'rsating.
11. Chiziqli topologik fazoda qavariq to'planning ichi ham qavariq ekanligini ko'rsating.

VI BOB
Chiziqli operatorlar

6.1. Chiziqli operatorlar

Agar X va Y chiziqli fazolar bo'lsa, u holda $A : X \rightarrow Y$ akslan-tirishga *operator* deyiladi. Agar bu operatorning aniqlanish sohasiga tegishli ixtiyoriy x, y elementlar va ixtiyoriy α, β sonlari uchun

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$$

tengligi o'rini bo'lsa, u holda A *chiziqli operator* deb ataladi. A opera-torning aniqlanish va qiymatlar sohalarini mos ravishda $D(A)$ va $R(A)$ ko'rinishlarda belgilaymiz.

X va Y normalangan fazolar, $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operator bo'lsin. Agar ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday $\delta > 0$ soni topilib, $\|x_1 - x_2\| < \delta$ tengsizligini qanoatlantiruvchi barcha $x_1, x_2 \in D(A)$ elementlar uchun $\|Ax_1 - Ax_2\| < \varepsilon$ tengsizligi o'rmlni bo'lsa, u holda A operatori *uzluksiz* deyiladi.

Agar $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operatori X fazosining har bir chegaralangan to'plamini Y fazosining chegaralangan to'plamiga akslantirsa, u holda A *chegaralangan* operator deb ataladi.

X va Y normalangan fazolar va $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operator bo'lsin. Agar shunday $C > 0$ soni topilib, barcha $x \in D(A)$ elementlar uchun $\|Ax\| \leq C\|x\|$ tengsizligi bajarilsa, u holda A operatori chegaralangan bo'ladi. Bu tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonlar to'plamining quyi chegarasi A operatorning *normasi* deb ataladi, ya'ni

$$\|A\| = \inf\{C > 0 : \forall x \in D(A), \|Ax\| \leq C\|x\|\}.$$

Masalalar

6.1.1. X va Y chiziqli fazolar va $A : X \rightarrow Y$ chiziqli ope-rator bo'lsin. Agar A operatorning aniqlanish sohasiga tegishli x_1, x_2, \dots, x_n elementlar chiziqli bog'liq bo'lsa, u holda Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n elementlar ham chiziqli bog'liq ekanligini is-botlang.

Yechimi. x_1, x_2, \dots, x_n elementlar chiziqli bog'liq bo'lganligidan, kamida bittasi noldan farqli $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sonlari topilib,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$$

tengligi o'rini bo'ladi. Chiziqli operatorning noldagi qiymati nol bo'lganligidan, $A(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = 0$ tengligini yoza olamiz. Deinak, $\alpha_1 Ax_1 + \dots + \alpha_n Ax_n = 0$ tengligi, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sonlarning hech bo'lmasganda bittasi noldan farqli bo'lganda o'rini. Bundan Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n elementlarning chiziqli bog'liq ekanligi kelib chiqadi.

6.1.2. X va Y chiziqli fazolar bo'lib, $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operatorning aniqlanish sohasiga tegishli x_1, x_2, \dots, x_n elementlar chiziqli erkli bo'lsa, u holda Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n elementlar ham chiziqli erkli bo'ladimi?

Yechimi. Ümuman aytganda, x_1, x_2, \dots, x_n elementlar chiziqli erkli bo'lsada, Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n elementlar chiziqli bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, A operatorning yadrosi ker A noldan farqli bo'lib, uning noldan farqli x elementi uchun $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$ tengligi o'rini bo'lsin. $x \neq 0$ bo'lganligidan, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sonlarning kamida bittasi noldan farqli. Shu bilan birga,

$$\alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2 + \dots + \alpha_n Ax_n = A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = Ax = 0.$$

Bundan Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n elementlarning chiziqli bog'liq ekanligi kelib chiqadi.

6.1.3. X va Y chiziqli fazolar va $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operatorining aniqlanish sohasi $D(A)$ bo'lsin. Har bir $G \subset D(A)$ qavariq to'plam uchun $A(G)$ to'plam qavariq bo'lishini isbotlang.

Yechimi. $A(G)$ to'plamiga tegishli ixtiyoriy y_1 va y_2 nuqtalarini olamiz. U holda G to'plamida shunday x_1 va x_2 nuqtalari mavjud bo'lib, $y_1 = Ax_1$ va $y_2 = Ax_2$ tengliklari o'rini bo'ladi. Bundan $[0, 1]$ segmentiga tegishli xohlagan α somi uchun

$$\alpha y_1 + (1 - \alpha) y_2 = \alpha Ax_1 + (1 - \alpha) Ax_2 = A(\alpha x_1 + (1 - \alpha) x_2).$$

G to'plami qavariq bo'lganligidan, $\alpha x_1 + (1 - \alpha) x_2 \in G$. Shu sababli

$$\alpha y_1 + (1 - \alpha) y_2 \in A(G),$$

ya'ni $A(G)$ to'plami qavariq.

6.1.4. X va Y chiziqli fazolar va $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operator bo'lsin. Agar $B \subset R(A)$ to'plami qavariq bo'lsa, $G = \{x \in D(A) : Ax \in B\}$ to'plami qavariq bo'ladimi?

Yechimi. G to'plamidan xohlagan x_1 va x_2 nuqtalrini olamiz. B to'plami qavariq bo'lganligidan, barcha $\alpha \in [0, 1]$ sonlari uchun

$$A(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) = \alpha Ax_1 + (1 - \alpha)Ax_2 \in B,$$

ya'ni $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in G$. Bundan G to'plamining qavariq ekanligi kelib chiqadi.

6.1.5. X chiziqli fazosida ikki $\|\cdot\|_1$ va $\|\cdot\|_2$ ekvivalent normalar berilgan bo'lib, $A : X \rightarrow X$ chiziqli operator bo'lsin. Agar A operator berilgan normalarning biri bo'yicha chegaralangan bo'lsa, u holda u ikkinchi norma bo'yicha ham chegaralangan ekanligini isbotlang.

Yechimi. Berilgan operator $\|\cdot\|_1$ norma bo'yicha chegaralangan bo'lsin. $\|\cdot\|_1$ va $\|\cdot\|_2$ normalar ekvivalent bo'lganligi sababli shunday $\alpha > 0$, $\beta > 0$ sonlar topilib, xohlagan $x \in X$ uchun

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1$$

munosabati o'rinci bilan birga, A operator $\|\cdot\|_1$ norma bo'yicha chegaralangan bo'lgani uchun shunday o'zgarmas C soni topilib,

$$\|Ax\|_1 \leq C\|x\|_1$$

tengsizligi o'rinch bo'ladi. Natijada,

$$\|Ax\|_2 \leq \beta\|Ax\|_1 \leq \beta C\|x\|_1 \leq \frac{\beta C}{\alpha}\|x\|_2.$$

Demak, A operator $\|\cdot\|_2$ norma bo'yicha ham chegaralangan.

6.1.6. X va Y normalangan fazolar, $A : X \rightarrow Y$ chegaralangan chiziqli operator bo'lib, $D(A) = X$ bo'lsin. U holda

$$\|A\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. $\alpha = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$ ko'rinishda belgilash kiritamiz. A operator chiziqli bo'lganligidan,

$$\alpha = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

tengligi o'rinci bo'ladi. Shu sababli xohlagan x uchun

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \alpha,$$

va ni

$$\|Ax\| \leq |\alpha| \|x\|.$$

A operatorning normasi $\|Ax\| \leq C\|x\|$ tengsizligini qanoatlantiruvchi C sonlarning eng kichigi bo'lishidan $\|A\| \leq \alpha$ tengsizligini yoza olamiz.

Shu bilan birga, aniq yuqori chegara tarifi bo'yicha xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday $x_\varepsilon \neq 0$ elementi topilib,

$$\alpha - \varepsilon \leq \frac{\|Ax_\varepsilon\|}{\|x_\varepsilon\|}$$

yoki

$$(\alpha - \varepsilon)\|x_\varepsilon\| \leq \|Ax_\varepsilon\| \leq C\|x_\varepsilon\|$$

munosabatlari o'rinni. Oxirgi qo'shil tengsizlikdan $\alpha - \varepsilon \leq C$ tengsizligini yoza olamiz va $\varepsilon > 0$ sonining ixtiyoriyligidan, $\alpha \leq \|A\|$ tengsizligiga ega bo'lamiz. Natijada, $\|A\| = \alpha$ tengligining o'rinni ekanligi kelib chiqadi.

6.1.7. Quyida berilgan operatorlarning chiziqli, chegaralangan ekanligini ko'rsating va normalarini toping:

- a) $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, bunda $Ax(t) = \int_0^t x(s) ds$;
- b) $A : C[-1, 1] \rightarrow C[0, 1]$, bunda $Ax(t) = x(t)$;
- c) $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, bunda $Ax(t) = t^2 x(0)$;
- d) $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, bunda $Ax(t) = x(t^2)$;
- e) $A : C^1[a, b] \rightarrow C[a, b]$, bunda $Ax(t) = x(t)$;
- f) $A : C^1[a, b] \rightarrow C[a, b]$, bunda $Ax(t) = \frac{dx}{dt}$.

Yechimi. a)

$$\begin{aligned} A(\alpha x + \beta y) &= \int_0^t (\alpha x(s) + \beta y(s)) ds = \\ &= \alpha \int_0^t x(s) ds + \beta \int_0^t y(s) ds = \alpha Ax + \beta Ay. \end{aligned}$$

Demak, A chiziqli operator. Endi bu operatorning chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz.

$$\|Ax\| = \left\| \int_0^t x(s) ds \right\| = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t x(s) ds \right| \leq \max_{t \in [0, 1]} \int_0^t |x(s)| ds \leq$$

$$\leq \max_{t \in [0,1]} \int_0^t \max_{s \in [0,1]} |x(s)| ds = \max_{t \in [0,1]} \int_0^t \|x\| \max_{s \in [0,1]} ds = \|x\|.$$

Demak, $\|Ax\| \leq \|x\|$. Bu tengsizlikdan A operatorning chegaralangan ekanligi ko'rnadi.

Shu bilan birga, $\|A\| = \sup_{t \in [0,1]} \|Ax(t)\| \leq 1$ va $x(s) = 1$ uchun $Ax(1) = 1$ bo'lganligidan, $\|A\| = 1$ tengningin or'inli ekanligi kelib chiqadi.

$$\text{b)} \quad A(\alpha x + \beta y) = \alpha x(t) + \beta y(t) = \alpha Ax + \beta Ay.$$

Bundan A operatorning chiziqli ekanligi kelib chiqadi.

Chegaralangan ekanligini quyidagiicha ko'rsatamiz:
 $\|Ax\|_{C[0,1]} = \|x(t)\|_{C[0,1]} = \max_{t \in [0,1]} |x(t)| \leq \max_{t \in [-1,1]} |x(t)| = \|x(t)\|_{C[-1,1]}$

Shu bilan birga, $[0, 1]$ segmentda $x(t) = 1$ funksiya uchun $\|Ax(t)\| = 1$ bo'lganligidan,

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax(t)\| = 1$$

$$\|A\| = \alpha \frac{dx}{dt} + \beta \frac{dy}{dt} = \alpha Ax(t) + \beta Ay(t).$$

tengligiga ega bo'lamiz.

c) Berilgan operatorning chiziqli ekanligini ko'rsatamiz:
 $A(\alpha x(t) + \beta y(t)) = t^2(\alpha x(0) + \beta y(0)) =$

$$= \alpha t^2 x(0) + \beta t^2 y(0) = \alpha Ax(t) + \beta Ay(t),$$

$$\|Ax(t)\| = \|t^2 x(0)\| = |x(0)| \|t^2\| =$$

$$= |x(0)| \max_{t \in [0,1]} t^2 = |x(0)| \leq \max_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x(t)\|.$$

Endi chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz:

$x(0) = 1$ bo'lgan funksiya uchun $\|Ax(0)\| = 1$ bo'lganligidan, $\|A\| = 1$ tengligiga ega bo'lamiz.
d) $A(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha x(t^2) + \beta y(t^2) = \alpha Ax(t) + \beta Ay(t)$. Demiak, A operator chiziqli $[0, 1]$ segmentida

$$\max |x(t)| = \max |x(t^2)|$$

tengligi or'inli bo'lganligidan,
 $\|Ax(t)\| = \|x(t^2)\| = \max_{t \in [0,1]} |x(t^2)| = \max_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x(t)\|$.

Demak, $\|Ax\| = \|x\|$. Bu tenglikdan A operatorning chegaralangan va

normasining birga teng ekanligi kelib chiqadi.

e) Berilgan operatorning chiziqli ekanligini ko'rsatamiz:

$$A(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha x(t) + \beta y(t) = \alpha Ax(t) + \beta Ay(t).$$

Endi chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz:

$\|Ax(t)\|_{C[a,b]} = \|x(t)\|_{C[a,b]} = \max_{t \in [a,b]} |x(t)| \leq \max_{t \in [a,b]} \{|x^{(k)}(t)| : k = 0, 1\} = \|x(t)\|_{C^1[a,b]}.$
Demak, berilgan operator chegaralangan. Shu bilan birga, $[a, b]$ segmentda $x(t) = 1$ funksiya uchun $\|Ax\| = 1$ bo'lganligidan, $\|A\| = 1$ tengligiga ega bo'lamiz.

$$\|Ax(t)\|_{C[a,b]} = \|x'(t)\|_{C[a,b]} = \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \leq \max_{0 \leq k \leq 1} \|x(t)\|_{C^k[a,b]}.$$

Demiak, berilgan operator chiziqli va chegaralangan. Shu bilan birga, $x(t) = \frac{1}{b-a}e^t$ funksiya uchun

bo'lganligidan, $\|A\| = 1$ tengligiga ega bo'lamiz.

6.1.8. *Shunday X normalangan fazoga va sunday A, B chegaralangan chiziqli operatorlarga misol ketiringki,*

$AB \neq BA$

munosabat o'rinnli bo'lsin.

Yechimi. $X = \mathbb{R}^2$ bo'lib,

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ va $BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ bo'ladi, ya ni $AB \neq BA$

B . A X chekli o'lchamli bo'lganligidan, A va B operatorlar uzuksiz, shu sababli chegaralangan.

6.1.9. *Noldan farqli A, B chegaralangan chiziqli operatorlari uchun $R(A) \cap R(B) = 0$ munosabati o'rinli bo'lsa, A va B operatorlarining chiziqli erkli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Faraz qilaylik, A va B operatorlar chiziqli bog'liq bo'lsin. U holda shunday $\alpha \neq 0$ soni mavjud bo'lib, $A = \alpha B$ tengligi o'rinli bo'ladi. $B \neq 0$ bo'lganligidan, $Bx \neq 0$ bo'ladigan $x \in X$ nuqta topiladi. $y = Bx$ bo'lsin. U holda

$$A(\alpha^{-1}x) = \alpha^{-1}Ax = \alpha^{-1}\alpha Bx = y.$$

Natijada, $y \in R(A) \cap R(B)$. Bu masala shartiga zid. Demak, A va B operatorlar chiziqli erkli.

6.1.10. *X normalangan fazoni Y normalangan fazoga akslantiruvchi A chiziqli operatorning uzluksiz bo'lishi uchun uning chegaralanganligi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Zarurligi. A uzluksiz chiziqli operator bo'lsin.

$$C_0 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|A(x)\| < \infty$$

ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Agar $C_0 = \infty$ bo'lsa, u holda shunday $\{x_n\} \subset X$, $\|x_n\| = 1$ ketma-ketligi topilib,

$$\lambda_n = \|A(x_n)\| \rightarrow \infty$$

bo'ladi. $y_n = \lambda_n^{-1}x_n$ ketma-ketligini qaraylik. $y_n \rightarrow 0$ ekanligi ravshan.

U holda A uzluksiz bo'lganligidan, $A(y_n) \rightarrow 0$ kelib chiqadi. Biroq

$$\|A(y_n)\| = \|A(\lambda_n^{-1}x_n)\| = \frac{\|A(x_n)\|}{\|\lambda_n^{-1}\|} = \frac{\|A(x_n)\|}{\|\lambda_n\|} = \frac{1}{\lambda_n} \rightarrow 0.$$

Bu ziddiyatdan A operatorning chegaralangan ekanligi kelib chiqadi.

Yetarliligi. A operator chegaralangan bo'lsin. U holda shunday C soni mavjud bo'lib, xohlagan $x \in X$ uchun

$$\|A(x)\| \leq C\|x\|$$

tengsizligi bajariladi. Bundan xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$ deb olsak, u holda $\|x\| < \delta$ bo'lganda $\|A(x)\| < \varepsilon$ tengsizligi o'rinli bo'ladi. Bundan A operatorning 0 nuqtada, Demak, X da uzluksiz ekanligi kelib chiqadi.

6.1.11. *X normalangan fazo, A chegaralangan chiziqli operator va $N_k = \ker A^k$, $k = 0, 1, \dots$, bo'lsa, u holda*

$$N_0 \subset N \subset \dots \subset N_k \subset \dots$$

munosabatini isbotlang.

Yechimi. Agar $x_1 \in \ker A$ bo'lsa, u holda $Ax_1 = 0$. Shu sababli

$$A^2x_1 = AAx_1 = A0 = 0,$$

ya'ni $x_1 \in N_2$. Agar $x_2 \in N_2$ bo'lsa, u holda $A^2x_2 = 0$. Shu sababli

$$A^3x_2 = AA^2x_2 = 0.$$

Shunday davom ettiraksak,

$$N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_n \subset \dots$$

munosabatga ega bo'lamiz.

6.1.12. $C[a, b]$ fazosida

$$f(x) = \int_a^b \varphi(t)x(t)dt$$

funktionali berilgan, bunda $\varphi(t)$ uzluksiz funksiya. Bu funk-
sionalning normasi

$$\|f\| = \int_a^b |\varphi(t)| dt$$

soniga tengligini ko'rsating.

Yechimi. $x \in C[a, b]$ uchun

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \int_a^b \varphi(t)x(t)dt \right| \leq \int_a^b |\varphi(t)||x(t)|dt \leq \\ &\leq \int_a^b |\varphi(t)| \max_{a \leq t \leq b} |x(t)| dt = \|x\| \int_a^b |\varphi(t)| dt, \end{aligned}$$

ya'ni

$$\|f\| \leq \int_a^b |\varphi(t)| dt.$$

Endi ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ sonini olib, $[a, b]$ segmentni

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

nuqtalar orqali shunday n bo'laklarga bo'lamizki, natijada har bir $[t_k, t_{k+1}]$ segmentda φ funksiyasining tebranishi $\varepsilon > 0$ sonidan kichik bo'lsin. Barcha bo'laklarini ikki gurunga ajratamiz. Birinchisi guruhga φ funksiyasining qiymatlari ishoralarini har bir bo'lakda o'zgartarmaydigan bar-cha $\sigma'_1, \sigma'_2, \dots, \sigma'_r$ segmentlarni (φ funksiya qiymatlari ishorasi bu segmentlarning biridan ikkinchisiga o'tganda o'zgarishi mumkin), ikkinchi guruhga qolgan barcha $\sigma''_1, \sigma''_2, \dots, \sigma''_p$ segmentlarni kiritamiz. Natijada φ uzluksiz va uning qiyatlari σ''_k ($k = \overline{1, p}$) segmentda har xil ishorali bo'lganligidan, σ''_k segmentda φ funksiyasining qiymati nolga teng bo'ladigan nuqta topiladi. Shunga ko'ra

$$|\varphi(t)| < \varepsilon \quad (t \in \sigma''_k, k = \overline{1, p})$$

tengsizligiga ega bo'lamiz.

Endi $C[a, b]$ fazosidan $\tilde{x}(t)$ funksiyani quyidagicha aniqlaymiz:

$$\tilde{x}(t) = sign \varphi(t) \quad (t \in \sigma'_j, j = \overline{1, r}).$$

$[a, b]$ segmentning boshqa nuqtalarida $\tilde{x}(t)$ funksiyani chiziqli deb olamiz. Bunda, agar a (yoki b) ikkinchi gurunga tegishli segmentning nchi bo'lsa, u holda $\tilde{x}(a) = 0$ (mos ravishda $\tilde{x}(b) = 0$) tengligi o'rinni deb hisoblaymiz. $f(\tilde{x})$ miqdorni quyidagicha yozamiz:

$$f(\tilde{x}) = \int_a^b \varphi(t) \tilde{x}(t) dt = \sum_{j=1}^r \int_{\sigma'_j}^{\sigma'_j} \varphi(t) \tilde{x}(t) dt + \sum_{k=1}^p \int_{\sigma''_k}^{\sigma''_k} \varphi(t) \tilde{x}(t) dt.$$

Natijada σ'_j , $i = \overline{1, r}$ segmentlarda $\varphi(t) \tilde{x}(t) = |\varphi(t)|$ bo'lganligidan, va tengsizligidan (bunda $[a, b]$ segmentda $|\tilde{x}(t)| \leq 1$ ekranligidan, foydalandik)

$$\sum_{j=1}^r \int_{\sigma'_j}^{\sigma'_j} \varphi(t) \tilde{x}(t) dt \leq \left| \sum_{k=1}^p \int_{\sigma''_k}^{\sigma''_k} \varphi(t) \tilde{x}(t) dt \right| \leq \sum_{k=1}^p \int_{\sigma''_k}^{\sigma''_k} |\varphi(t)| dt$$

$f(\tilde{x}) \geq \sum_{j=1}^r \int_{\sigma'_j}^{\sigma'_j} |\varphi(t)| dt - \sum_{k=1}^p \int_{\sigma''_k}^{\sigma''_k} |\varphi(t)| dt = \int_a^b |\varphi(t)| dt - 2\varepsilon(b-a).$

Endi $\|\tilde{x}\| \leq 1$ bo'lganligidan,

$$\|f\| \geq f(\tilde{x}) > \int_a^b |\varphi(t)| dt - 2\varepsilon(b-a).$$

U holda $\varepsilon \rightarrow 0$ bo'lganda $\|f\| \geq \int_a^b |\varphi(t)| dt$ tengsizligiga ega bo'lamiz.

Natijada

$$\|f\| = \int_a^b |\varphi(t)| dt$$

tengsizning o'rinni ekanaligi kelib chiqadi.

6.1.13. $C[a, b]$ fazosida

$$Ax(s) = \int_a^b k(s, t) x(t) dt$$

operatori berigan, bunda $k(s, t)$ uzluksiz funksiya. Bu operatorning uzluksiz chiziqli ekanaligini ko'rsatining va normasini toping.

Yechimi. Dastlab chiziqli ekanalini ko'rsatamiz.

$$A(\alpha x(s) + \beta y(s)) = \int_a^b k(s, t)(\alpha x(t) + \beta y(t)) dt =$$

$$= \alpha \int_a^b k(s, t)x(t) dt + \beta \int_a^b k(s, t)y(t) dt = \alpha Ax(s) + \beta Ay(s).$$

Endi uzluksizligini ko'rsatamiz:

$$\|Ax\| = \max_{a \leq s \leq b} \left| \int_a^b k(s, t)x(t) dt \right| \leq \max_{a \leq s \leq b} \int_a^b |k(s, t)| |x(t)| dt \leq M \|x\|,$$

$$\leq \max_{a \leq s \leq b} \int_a^b |k(s, t)| \max_{a \leq s \leq b} |x(t)| dt \leq \|x\| \max_{a \leq s \leq b} \int_a^b |k(s, t)| dt = M \|x\|,$$

bunda $M = \max_{a \leq s \leq b} \int_a^b |k(s, t)| dt$. Demak, berilgan operator chegaralaugan, Demak, uzluksiz. Shu bilan birga, $\|A\| \leq M$ tengsizligiga ega bo'lamiz.

$\int_a^b |k(s, t)| dt$ integral $[a, b]$ segmentda s argument bo'yicha uzluksiz funksiya bo'lganligidan, shunday $s_0 \in [a, b]$ nuqta mavjud bo'lib,

$$M = \int_a^b |k(s_0, t)| dt$$

tengligi o'rini bo'ladi. $C[a, b]$ fazosida aniqlangan

$$f(x) = \int_a^b k(s_0, t) x(t) dt$$

funksionalni qaraylik. 6.1.12-misoldan

$$\|f\| = \int_a^b |k(s_0, t)| dt$$

tengligi o'rindiridir.

Uzluksiz chiziqli funksional norinasining tarifi bo'yicha

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

bo'lganligidan, xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday $x_\varepsilon \in C[a, b]$, $\|x_\varepsilon\| \leq 1$ funksiya topilib,

$$f(x_\varepsilon) \geq \|f\| - \varepsilon = \int_a^b |k(s_0, t)| dt - \varepsilon = M - \varepsilon.$$

Natijada

$$\|A\| \geq \|Ax_\varepsilon\| \geq \int_a^b |k(s_0, t)x_\varepsilon(t)| dt = f(x_\varepsilon) \geq M - \varepsilon.$$

Endi $\varepsilon > 0$ ixtiyoriy son bo'lganligidan, $\|A\| \geq M$ tengsizligiga ega bo'lamiz.

Yuqorida $\|A\| \leq M$ tengsizligining o'rini ekanligini ko'rgan edik. Demak, $\|A\| = M$, ya'ni

$$\|A\| = \max_{a \leq s \leq b} \int_a^b |k(s, t)| dt.$$

6.1.14. *X va Y normalangan fazolar bolib, $A : X \rightarrow Y$ va $B : X \rightarrow Y$ operatorлари chegaralangan bo'lsa, u holda $A + B$ operatorи ham chegaralangan ekanligini va $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$ tengsizligi o'rинли ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. Xohlagan x element uchun

$$\begin{aligned} \|(A+B)x\| &= \|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq \\ &\leq \|A\| \|x\| + \|B\| \|x\| = (\|A\| + \|B\|) \|x\|. \end{aligned}$$

Bu tengsizliklardan $A + B$ operatorning chegaralangan ekanligi va $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$ tengsizligi kelib chiqadi.

6.1.15. *X, Y va Z normalangan fazolar bo'lib, $A : X \rightarrow Y$ va $B : Y \rightarrow Z$ operatorлари chegaralangan bo'lsa, u holda AB operatorи ham chegaralangan ekanligini va $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ tengsizligi o'rинли ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. Xohlagan $x \in X$ elementi uchun

$$\|(AB)(x)\| = \|B(Ax)\| \leq \|B\| \|Ax\| \leq \|B\| \|A\| \|x\|.$$

Bu tengsizlikdan AB operatorning chegaralangan ekanligi va $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ tengsizligi kelib chiqadi.

6.1.16. *A chiziqli operatoriga teskari A^{-1} operatori chiziqli bo'ladi.*

Yechimi. Birinchi navbatda A operator obrazи $R(A)$ to'plamining, ya'ni $D(A^{-1})$ to'plamining chiziqli fazo ekanini ko'rsatamiz.

$y_1, y_2 \in R(A)$ bo'lsin. $A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2$ tengligining o'rинли ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Aytaylik, $Ax_1 = y_1$ va $Ax_2 = y_2$ bo'lsin. A operatorining chiziqli ekanligidan,

$$A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 \quad (6.1)$$

tengligini yoza olamiz. Teskari operator ta'rifidan: $A^{-1}y_1 = x_1$, $A^{-1}y_2 = x_2$. Bu tengliklarning ikki tomonini mos ravishda α_1 va α_2 sonlariga ko'paytirib o'zaro qo'shsak,

$$\alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$$

tengligiga ega bo'lamiz.

Ikkinci tomondan, (6.1) ifoda va teskari operator tarifidan

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)$$

tengligini yoza olamiz. Demak,

$$A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2.$$

6.1.17. *E Banax fazosida zinch bo'lgan M to'plami berilgan bo'lsin. U holda noldan farqli ixtiyoriy y ∈ E elementni*

$$y = y_1 + y_2 + \dots + y_n + \dots$$

bunda y_k ∈ M, ||y_k|| ≤ 3||y||/2^k, ko'rinishda qatorga yoyish mumkin ekanligini isbotlang.

Yechimi. y_k elementlarni ketma-ket tuzamiz. y_1 elementni

$$(6.2) \quad \|y - y_1\| \leq \|y\|/2$$

tengsizlikni qanoatlanitiradigan etib saylab olish mumkin, chunki M to'plami E to'plamida zinch bo'lganligidan, (6.2) tengsizlik bilan aniqlangan radiusi ||y||/2 va markazi y nuqtada bo'lgan sharda M to'plamining elementi topiladi. y_2 ∈ M elementni

$$\|y - y_1 - y_2\| \leq \|y\|/4$$

tengsizlik o'rinnli bo'ladigan, y_3 elementni

$$\|y - y_1 - y_2 - y_3\| \leq \|y\|/8$$

tengsizligi o'rinnli boladigan, umuman y_n elementni

$$\|y - y_1 - y_2 - \dots - y_n\| \leq \|y\|/2^n$$

tengsizlikni qanoatlanitiradigan etib saylab olamiz. Natijada n → ∞ da

$$\|y - \sum_{k=1}^n y_k\| \rightarrow 0,$$

ya'ni $\sum_{k=1}^n y_k$ qator y elementiga yaqinlashuvchidir. Endi y_k elementlari ning normalarini baholaymiz:

$$\|y_1\| = \|y_1 - y + y\| \leq \|y_1 - y\| + \|y\| \leq 3\|y\|/2,$$

$\|y_2\| = \|y_2 + y_1 - y + y - y_1\| \leq \|y - y_1 - y_2\| + \|y - y_1\| \leq 3\|y\|/4.$ Ushbu jarayonni davom ettirsak,

$$\begin{aligned} \|y_n\| &= \|y_n + y_{n-1} + \dots + y_1 - y + y - y_1 - \dots - y_{n-1}\| \leq \\ &\leq \|y - y_1 - \dots - y_n\| + \|y - y_1 - \dots - y_{n-1}\| \leq 3\|y\|/2^n. \end{aligned}$$

6.1.18. (*Teskari operator haqida Banax teoremasi*). X va Y Banax fazolari bo'lib, A : X → Y chegaralangan chiziqli operatori berilgan fazolarni o'zaro bir qiymatli aksantirsas, u holda teskari A^{-1} operatori chegaralangan ekanligini isbotlang.

Yechimi. Y fazosida ||A^{-1}y|| ≤ k||y|| tengsizligini qanoatlanitiruvchi barcha y elementlardan iborat M_k to'plamni qaraylik. Y fazosining har bir elementi bior M_k to'plamiga tegishli bo'ladi, ya'ni

$$Y = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k.$$

3.1.11-misolda ko'rilgan Ber teoremasi bo'yicha M_k to'plamning kamida bittasi, Aytaylik, M_n to'plami bior B sharda zinch bo'ladi. B shridan markazi M_n to'plamida bo'lgan P shar qatlamini olamiz: P qatlam $\beta < \|z - y_0\| < \alpha$ tengsizlikni qanoatlanitiruvchi z elementlardan iborat, bunda $0 < \beta < \alpha$, $y_0 \in M_n$.

P qatlamini markazi koordinatalar boshida bo'ladigan etib ko'chirsak,

$$P_0 = \{z : 0 < \beta < \|z\| < \alpha\}$$

shar qatlamiga ega bo'lamiz.

Bior M_N to'plamining P_0 da zinch ekanligini ko'rsatamiz. z ∈ P ∩ M_n bo'lsin, u holda $z - y_0 \in P_0$ va

$$\begin{aligned} \|A^{-1}(z - y_0)\| &\leq \|A^{-1}z\| + \|A^{-1}y_0\| \leq \\ &\leq n(\|z\| + \|y_0\|) \leq n(\|z - y_0\| + 2\|y_0\|) = \\ &= n\|z - y_0\| \left(1 + \frac{2\|y_0\|}{\|z - y_0\|}\right) \leq n\|z - y_0\|(1 + 2\|y_0\|/\beta). \end{aligned} \tag{6.3}$$

$\|A^{-1}(z - y_0)\| \leq n\|z - y_0\|(1 + 2\|y_0\|/\beta)$ soni z ga bog'liq emas. N = 1 + n[1 + 2\|y_0\|/\beta] bo'lsin, u holda (6.3) dan $z - y_0 \in M_N$ bo'ladi, M_n to'plamining P da zinch ekanligidan, esa M_N to'plamining P_0 da zinch ekanligi kelib chiqadi. Y to'plamidan noldan farqli bior y elementini olaylik. $\beta < \|\lambda y\| < \alpha$ tengsizlik o'rinnli bo'ladigan λ somi saylab olishimiz mumkin, ya'ni $\lambda y \in P_0$. M_N to'plami P_0 shar qatlamda zinch bo'lganligidan, λy elementiga yaqinlashuvchi y_k ∈ M_N ketma-ketlikni niza olamiz. U holda $\{\lambda^{-1}y_k\}$ ketma-ketligi y elementiga yaqinlashuvchidir. Agar $y_k \in M_N$ o'rinnli bo'lsa, u holda har bir $\lambda \neq 0$ uchun $\lambda^{-1}y_k \in M_N$ munosabati o'rinnli natijada M_N to'plami Y \ {0} to'plamda zinch. Demak, Y da zinch bo'ladi.

Noldan farqli $y \in Y$ elementni qaraylik; 6.1.17-misolda uni M_N to‘plainining elementlaridan iborat qatorga yoyish mumkin ekanligi ko‘rsatilgan:

$$y = y_1 + y_2 + \dots + y_k + \dots,$$

bunda $\|y_k\| < \|y\|/2^k$.

X fazoda y_k elementlarining proobrazlaridan tuzilgan qatorni qaraylik, ya’ni $x_k = A^{-1}y_k$.

$$\|x_k\| = \|A^{-1}y_k\| \leq N \|y_k\| < 3N \|y\| / 2^k$$

tengsizligidan $\{x_k\}$ qatorning biror x elementga yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. Shu bilan birga,

$$\|x\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \leq 3N \|y\| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 3N \|y\|.$$

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ qatorning yaqinlashuvchi va A operatorining uzlusizligidan,

$$Ax = Ax_1 + Ax_2 + \dots = y_1 + y_2 + \dots = y$$

tengligiga ega bo‘lamiz, bundan $x = A^{-1}y$. Shu bilan birga,

$$\|A^{-1}y\| = \|x\| \leq 3N \|y\|$$

tengsizligi va bu ifodaning har bir $y \neq 0$ uchun o‘rinli ekanligini hisobga olsak, u holda A^{-1} operatori chegaralangan bo‘ladi.

**6.1.19. X Banax fazosini Y normalangan fazoga akslan-
tiruvchisi uzlusiz chiziqli operatorlarning $\{A_n\}$ ketma-ketligi
ushbu**

$$\sup_n \|A_n(x)\| < +\infty \quad (x \in X) \tag{6.4}$$

tengsizlikni qanoatlantirsa (ya’ni har bir $x \in X$ nuqtada chegaralangan bo‘lsa), u holda shunday chekli M soni mavjud bo‘lib, $\forall n$ uchun

$$\|A_n\| \leq M$$

tengsizligi o‘rinli ekanligini isbotlang.

Yechimi. A chiziqli operatorning $B[x_0, \delta]$ shardagi qiymatlarining chegarasi ma’lum bo‘lsin:

$$\|A(x)\| \leq B \quad (x \in B[x_0, \delta]).$$

U holda

$$\|A\| \leq \frac{2B}{\delta}.$$

Haqiqatan, normasi birdan kichik ixtiyoriy x' nuqta olsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$x = x_0 + \delta x' \in B[x_0, \delta].$$

Natijada,

$$\|A(x)\| = \|A(x_0) + \delta A(x')\| \leq B.$$

U holda

$$\begin{aligned} \|A(x')\| &= \frac{1}{\delta} \|A(\delta x')\| = \frac{1}{\delta} \|A(x_0) + A(\delta x') - A(x_0)\| \leq \\ &\leq \frac{1}{\delta} (\|A(x_0) + \delta A(x')\| + \|A(x_0)\|) \leq \frac{1}{\delta} (B + B) = \frac{2B}{\delta}, \end{aligned}$$

bundan esa $\|A\| \leq \frac{2B}{\delta}$ tengsizligi kelib chiqadi.

Endi $\|A_n\| \leq M$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) tengsizligini isbotlash uchun teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $\{\|A_n\|\}$ ketma-ketlik chegaralamagan bo'lsin. Ushbu

$$p(x) = \sup_n \|A_n(x)\|$$

funksionalni qaraylik. Bu funksional har bir $B[x_0, \delta]$ sharda chegaralamagan, chunki $p(x) \leq B$ bo'lganda, ixtiyoriy $n \in \mathbb{N}$ uchun $\|A_n\| \leq \frac{2B}{\delta}$ tengsizligi o'rinali bo'lar edi.

Natijada, har bir $B[x_0, \delta]$ sharda ixtiyoriy $k \in \mathbb{N}$ uchun $p(x) > k$ tengsizligi o'rinali bo'ladigan $x \in X$ nuqta topiladi. U holda

$$E_k = \{x \in X : p(x) > k\}$$

to'plami X fazoda zinch bo'ladi. Shu bilan birga, bu to'plam ochiqdir. Haqiqatan, E_k to'plamdan ixtiyoriy x_0 nuqta olsak, ya'ni $p(x_0) > k$ bo'lsa, u holda biror $n_0 \in \mathbb{N}$ uchun $\|A_{n_0}\| > k$ tengsizligi o'rinali bo'ladi. $\|A_{n_0}(x_0)\|$ akslantrishning uzluksizligidan esa x_0 nuqtaga yetarlicha yaqin x nuqtalar uchun $\|A_{n_0}(x)\| > k$ tengsizligi bajariladi. Natijada E_k to'plamning ochiq ekanligi kelib chiqadi.

3.1.18-misolda ko'rganimizdek, X fazoda ochiq va zinch E_k to'plamlarning $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ kesishmasi zinch bo'ladi. Demak, $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \neq \emptyset$.

$x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ bo'lsin, u holda

$$\sup_n \|A_n(x_0)\| = \infty.$$

Bu farazimizga ziddir.

6.1.20. X Banax fazosida berilgan uzlucksiz chiziqli operatorlarning $\{A_n\}$ ketma-ketligi X fazoning har bir nuqtasida A operatoriga yaginalashuvchi bo'lsa, u holda A operator ham uzlucksiz bo'lib, ushbu

$$\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| \quad (6.5)$$

tengsizligi bajarilishini isbotlang.

Yechimi. A operatorining chiziqli ekanligi quyida yaqqol ko'rinadi:

$$\begin{aligned} A(\alpha x + \beta y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} A(\alpha x + \beta y) = \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(x) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(y) = \alpha A(x) + \beta A(y). \end{aligned}$$

Endi uzlucksiz ekanligini ko'rsatamiz.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n(x)\| = \|A(x)\| < \infty$$

bo'lganligidan,

$$\sup_n \|A_n(x)\| < \infty$$

tengsizligi, natijada, 6.1.19-misoldan, $\{\|A_n\|\}$ ketma-ketlikning chegaralangan ekanligi kelib chiqadi. U holda

$$\|A(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n(x)\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\| \|x\|.$$

Natijada, A operatorining uzlucksiz va (6.5) tengsizlikning o'rini ekanligi kelib chiqadi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. H Hilbert fazosi va $A : H \rightarrow H$ chegaralangan chiziqli operator uchun $D(A) = H$ bo'lsa, u holda

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0, y \neq 0} \frac{|\langle Ax, y \rangle|}{\|x\| \|y\|}$$

tenglagini isbotlang.

2. Quyidagi operatorlarning chegaralangan chiziqli ekanligini ko'rsatining va normasini toping.

- a) $A : L_2[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$, $Ax(t) = t \int_0^1 x(s) ds$;
- b) $A : L_2[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$, $Ax(t) = \int_0^t x(s) ds$;

c) $A : H^1[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$, $Ax(t) = x(t)$;
d) $A : H^1[0, 1] \rightarrow H^1[0, 1]$, $Ax(t) = tx(t)$.

3. X va Y normalangan fazolar bolib, X chekli o'lchanli bo'lsin. Aniqlanish solhasi X fazosidan iborat bo'lgan har bir $A : X \rightarrow Y$ chiziqli operatorning chegaralangan ekanligini va $\|Ax\| = \|A\| \|x\|$ tenglikni qanoatlantruvchi $x \in X$, $x \neq 0$ nuqtaning mavjud ekanligini isbotlang.

4. $A : X \rightarrow Y$ chegaralangan chiziqli operatorning yadrosi X fazo-ning qism fazosi bo'lishini isbotlang.

5. X va Y normalangan fazolar bo'lib, $A : X \rightarrow Y$ yadrosi X fazoning yopiq qism fazosi bo'lgan chiziqli operator bo'lsin. Bundan A operatorning chegaralangan ekanligi kelib chiqadimi?

6. $\{e_n, n \in \mathbb{N}\}$ sistema H Hilbert fazosining ortonormal bazisi bo'lib, $\lambda_n \in \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}$) bo'lsin. Agar $\{\lambda_n\}$ ketma-ketligi chegaralangan bo'lsa, u holda

$$Ae_n = \lambda_n e_n \quad (n \in \mathbb{N})$$

tengligi chegaralangan chiziqli $A : H \rightarrow H$ operatorini aniqlab, $D(A) = H$ va $\|A\| = \sup_n |\lambda_n|$ tengliklarining o'rini bo'lishimi isbotlang.

7. Qanday $\varphi(t)$ funksiyalar uchun

$$Ax(t) = \varphi(t)x(t)$$

operatori $C[0, 1]$ fazoda chegaralangan bo'ladi?

8. Qanday $\varphi(t)$ funksiyalar uchun

$$Ax(t) = \varphi(t)x(t)$$

operatori $L_2[0, 1]$ fazoda chegaralangan bo'ladi?

9. Qanday α sonlari uchun

$$Ax(t) = x(t^\alpha)$$

operatori $C[0, 1]$ fazoda chegaralangan bo'ladi?

10. $C[0, 1]$ fazoda

$$Ax(t) = t^2 x(t)$$

operatorining normasini toping.

11. $L_2[0, 1]$ fazoda

$$Ax(t) = t^3 x(t)$$

operatorining normasini toping.

12. $C[0, 1]$ fazoda

$$Ax(t) = x(\sqrt{t})$$

operatorining normasini toping.

6.2. Uzluksiz chiziqli funksionallar

Bizga E chiziqli topologik fazosi berilgan bo'lsin. Agar har bir $x \in E$ elementga biror $f(x)$ (haqiqiy yoki kompleks) son mos qo'yilgan bo'lsa, u holda E fazosida *funksional* aniqlangan deyiladi. Bu funksional uchun

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in E \quad (\text{additivlik})$$

va

$$f(\alpha x) = \alpha f(x), \quad (x \in E; \alpha \in \mathbb{R} \text{ yoki } \alpha \in \mathbb{C}) \quad (\text{birjinslilik})$$

tengliklari o'rinni bo'lsa, u holda u *chiziqli funksional* deb ataladi.

E fazosiga tegishli x_0 nuqta olinganda, xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun x_0 nuqtaning shunday U atrofi mavjud bo'lib, bu atrofdan olingan barcha x nuqtalar uchun

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (6.6)$$

tengsizligi o'rinni bo'lsa, u holda f funksional x_0 nuqtada *uzluksiz* deyiladi.

Agar f funksional E fazosining har bir nuqtasida uzluksiz bo'lsa, u holda u E fazosida *uzluksiz* deyiladi.

Agar shunday o'zgarmas soni mavjud bo'lib, barcha $x \in E$ elementlar uchun

$$|f(x)| \leq C\|x\| \quad (6.7)$$

tengsizligi o'rinni bo'lsa, u holda f funksional E fazosida *chegaralangan* deyiladi.

Normalangan fazoda funksionalning *normasi* uchun quyidagi tengliklar o'rinni:

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|.$$

Masalalar

6.2.1. Agar f funksional E chiziqli topologik fazoning biror x nuqtasida uzluksiz bo'lsa, u holda u E fazosida uzluksiz bo'lishini isbotlang.

Yechimi. E fazosidan xohlagan y element va xohlagan $\varepsilon > 0$ sonini olib, x nuqtaning (6.6) shartni qanoatlantiruvchi U atrofini olaylik. $U - x$ to'plami 0 ning atrofi bo'lganligidan, $V = U + (y - x)$ to'plami y nuqtaning atrofi bo'ladi. Bu atrofdan xohlagan z nuqtani olamiz. U holda

$$|f(z) - f(y)| = |f(z - y + x - x)| = |f(z - y + x) - f(x)|$$

tengligidan va $z - y + x$ elementning U to‘plamiga tegishli ekanligidan,

$$|f(z) - f(y)| < \varepsilon$$

tengsizligining o‘rinli ekanligi kelib chiqadi. Demak, V to‘plami y uchun (6.6) shartni qanoatlantiradi.

6.2.2. f funksionalning E fazosida uzluksiz bo‘lishi uchun f funksional nol nuqtaning biror atrofida chegaralanganligi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

Yechimi. Zarurligi. f funksional 0 nuqtada uzluksiz bo‘lsa, u holda xohlagan $\varepsilon > 0$ son uchun 0 nuqtaning $|f(x)| < \varepsilon$ tengsizlik o‘rinli bo‘ladigan atrofi topiladi.

Yetarliligi. 0 nuqtaning U atrofida f funksional chegaralangan bo‘lsin. U holda shunday C soni mayjud bo‘lib, U atrofdan olingan xohlagan x element uchun $|f(x)| < C$ tengsizligi o‘rinli bo‘ladi. Nati-jada xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun 0 nuqtaning $\frac{\varepsilon}{C}U$ atrofida $|f(x)| < \varepsilon$ tengsizligi o‘rinli bo‘ladi.

6.2.3. \mathbb{R}^2 fazosida aniqlangan $z = ax + by$ funksionali \mathbb{R} maydonida chiziqli bo‘ladimi?

Yechimi. $z = f(t)$ bo‘lsin, bunda $t = (x, y)$. Xohlagan $t_1 = (x_1, y_1)$ va $t_2 = (x_2, y_2)$ nuqtalar uchun

$$\begin{aligned} f(\alpha t_1 + \beta t_2) &= a(\alpha x_1 + \beta x_2) + b(\alpha y_1 + \beta y_2) = \\ &= \alpha(ax_1 + by_1) + \beta(ax_2 + by_2) = \alpha f(t_1) + \beta f(t_2). \end{aligned}$$

Demak, berilgan funksional haqiqiy sonlar maydonida chiziqli bo‘lar ekan.

6.2.4. $C[0, 1]$ fazosida berilgan quyidagi funksionallarni additivlikka tekshirring:

- a) $F(f) = |f(\frac{1}{2})|;$
- b) $F(f) = \max_{0 \leq t \leq 1} f(t);$
- c) $F(f) = f(\frac{1}{2}) + f(\frac{1}{3}) + f(\frac{1}{4}).$

Yechimi. a) $C[0, 1]$ fazodan $f(\frac{1}{2}) = 1$ va $g(\frac{1}{2}) = -1$ bo‘lgan funksiyalarni olamiz. U holda

$$F(f + g) = |(f + g)(\frac{1}{2})| = |f(\frac{1}{2}) + g(\frac{1}{2})| = |1 - 1| = 0,$$

$$F(f) + F(g) = |f(\frac{1}{2})| + |g(\frac{1}{2})| = 1 + 1 = 2.$$

Bundan

$$F(f) + F(g) \neq F(f + g).$$

Demak, bu funksional additiv emas.

b) $C[0, 1]$ fazodan $f(t) = t^2$ va $g(t) = 1 - t^2$ funksiyadarni olamiz. U holda

$$F(f + g) = \max_{0 \leq t \leq 1} (f(t) + g(t)) = \max_{0 \leq t \leq 1} (t^2 + 1 - t^2) = 1,$$

$$\begin{aligned} F(f) + F(g) &= \max_{0 \leq t \leq 1} f(t) + \max_{0 \leq t \leq 1} g(t) = \\ &= \max_{0 \leq t \leq 1} t^2 + \max_{0 \leq t \leq 1} (1 - t^2) = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Bundan

$$F(f) + F(g) \neq F(f + g).$$

Demak, bu funksional additiv emas.

c)

$$\begin{aligned} F(f + g) &= (f + g) \left(\frac{1}{2} \right) + (f + g) \left(\frac{1}{3} \right) + (f + g) \left(\frac{1}{4} \right) = \\ &= f \left(\frac{1}{2} \right) + f \left(\frac{1}{3} \right) + f \left(\frac{1}{4} \right) + g \left(\frac{1}{2} \right) + g \left(\frac{1}{3} \right) + g \left(\frac{1}{4} \right) = F(f) + F(g). \end{aligned}$$

Demak, bu funksional additiv.

6.2.5. Xohlagan additiv funksional uchun

$$F(\theta) = 0, \quad F(-x) = -F(x)$$

tengliklarining o'rinni ekanligini ko'rsating.

Yechimi.

$$F(\theta) = F(\theta + \theta) = F(\theta) + F(\theta) = 2F(\theta),$$

$$\text{ya'ni } F(\theta) = 0.$$

$$0 = F(\theta) = F(x - x) = F(x) + F(-x).$$

$$\text{Natijada } F(-x) = -F(x).$$

6.2.6. Xohlagan additiv funksional uchun $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ tengligining o'rinni ekanligini ko'rsating, bunda λ ratsional son.

Yechimi. n natural soni uchun

$$f(nx) = f(\underbrace{x + x + \dots + x}_n) = \underbrace{f(x) + f(x) + \dots + f(x)}_n = nf(x).$$

Natijada, $\lambda = \frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) bo'lganda

$$\begin{aligned} f(\lambda x) &= f\left(\frac{m}{n}x\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{n}x + \frac{1}{n}x + \dots + \frac{1}{n}x}_m\right) = mf\left(\frac{1}{n}x\right) = \\ &= \frac{m}{n}nf\left(\frac{1}{n}x\right) = \frac{m}{n}f\left(n\frac{1}{n}x\right) = \frac{m}{n}f(x) = \lambda f(x). \end{aligned}$$

$\lambda < 0$ bo'lganda 6.2.5-misolda qaralgan $f(-x) = -f(x)$ tengligidan foydalanamiz, ya'ni $f(\lambda x) = f(-(-\lambda x)) = -f(-\lambda x) = -(-\lambda)f(x) = \lambda f(x)$.

6.2.7. *f funksional X normalangan fazoda uzluksiz bo'lsa, u holda har bir $x \in X$ element uchun $|f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\|$ tengsizligining o'rinali bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. $x \neq 0$ bo'lganda $\frac{x}{\|x\|}$ element birlig sharga tegishli bo'ladi. Shu sababli

$$\frac{|f(x)|}{\|x\|} = \left| f\left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\|,$$

ya'ni

$$|f(x)| \leq \|f\| \|x\|.$$

$x = 0$ bo'lganda $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$ tengsizlikning ikki tomoni ham nol bo'ladi.

6.2.8. *X normalangan fazoda berilgan f funksionalning uzluksiz bo'lishi uchun, uning chegaralangan bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.*

Yechimi. Zarurligi. f funksional uzluksiz bo'lsin. $C_0 = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$ miqdorning chekli ekanligini ko'rsatamiz. Aksincha faraz qilamiz, ya'mi $C_0 = \infty$ bo'lsin. U holda shunday $\{x_n\} \subset X$, $\|x_n\| = 1$ ketma-ketligi topilib, $\lambda_n = |f(x_n)| \rightarrow \infty$ bo'ladi. $\{x'_n\}$ ($x'_n = \lambda_n^{-1}x_n$) ketma-ketligini qaraymiz. $\|x_n\| = 1$ bo'lganligidan, $\{x'_n\}$ ketma-ketligi nolga yaqinlashuvchi bo'ladi. f funksional uzluksiz bo'lganligidan, $f(x'_n) \rightarrow 0$ bo'lishi kerak. Biroq

$$|f(x'_n)| = \left| f\left(\frac{x_n}{\lambda_n} \right) \right| = \frac{1}{\lambda_n} |f(x_n)| = \frac{1}{\lambda_n} \lambda_n = 1.$$

Bu ziddiyatdan farazimiz noto'g'ri ekanligi ko'rinadi. Demak, $C_0 = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| < \infty$.

X fazosidan noldan farqli xohlagan x element olamiz. $x' = \frac{x}{\|x\|}$ elementining normasi birga teng bo‘lganligidan, $|f(x')| \leq C_0$ tengsizligi o‘rinli, shu sababli

$$\frac{1}{\|x\|}|f(x)| = \left|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right| = |f(x')| \leq C_0.$$

Natijada $|f(x)| \leq C_0\|x\|$. Demak, f funksional chegaralangan.

Yetarligi. f chegaralangan funksional o‘rinli bo‘lsin. Xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun $\delta = \frac{\varepsilon}{C}$ sonini olsak, $\|x\| < \delta$ bo‘lganda

$$|f(x)| \leq C\|x\| < C\delta = C\frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon.$$

Natijada f funksional nol nuqtada, Demak, X fazosida uzlusiz bo‘ladi.

6.2.9. X normalangan fazosida uzlusiz chiziqli f funksionali berilgan bo‘lsin. $C_0 = \|f\|$ soni $|f(x)| \leq C\|x\|$ tengsizlikni qanoatlantiradigan sonlarning eng kichigi ekanligini isbotlang.

Yechimi. $\|x\| = 1$ bo‘lganda $|f(x)| \leq C$ tengsizligi o‘rinli. $C_0 = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$ bo‘lganligidan, $C_0 \leq C$.

Ikkinchi tomondan C_0 soni $|f(x)| \leq C_0\|x\|$ tengsizlikni qanoatlantiradi.

6.2.10. $C[a, b]$ fazosida aniqlangan

$$f(x) = \sum_{k=1}^n c_k x(t_k)$$

funksionalning chiziqli, uzlusiz ekanligini isbotlang va normasini toping, bunda $t_1, t_2, \dots, t_n \in [a, b]$; $c_k \in \mathbb{R}$ ($k = \overline{1, n}$).

Yechimi. Dastlab chiziqli ekanligini ko‘rsatamiz:

$$\begin{aligned} f(\alpha x_1 + \beta x_2) &= \sum_{k=1}^n c_k [\alpha x_1(t_k) + \beta x_2(t_k)] = \\ &= \alpha \sum_{k=1}^n c_k x_1(t_k) + \beta \sum_{k=1}^n c_k x_2(t_k) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2). \end{aligned}$$

Uzlusiz ekanligini ko‘rsatish uchun uning chegaralangan ekanligini ko‘rsatamiz:

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^n c_k x(t_k) \right| \leq \sum_{k=1}^n |c_k| |x(t_k)| \leq$$

$$\leq \max_{t \in [a,b]} |x(t)| \sum_{k=1}^n |c_k| = \sum_{k=1}^n |c_k| \|x\|,$$

ya'ni $\|f\| \leq \sum_{k=1}^n |c_k|$.

Endi $[a, b]$ segmentida quyidagicha $\tilde{x}(t)$ bo'lakli-chiziqli funksiyani aniqlaymiz: $\tilde{x}(t)$ funksiya t_1, t_2, \dots, t_n nuqtalarda $\tilde{x}(t_k) = \text{sign } c_k$ qiymatlarni qabul qiladi, $[t_k, t_{k+1}]$ segmentlarda chiziqli, $[a, t_1]$ va $[t_n, b]$ segmentlarda o'zgarmas. Bu funksiyaning qiymatlari to'plami $[-1, 1]$ kesmasida joylashgan. Shu sababli

$$\|\tilde{x}\| = \max_{t \in [a,b]} |\tilde{x}(t)| \leq 1.$$

Natijada

$$\begin{aligned} \|f\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \geq |f(\tilde{x})| = \\ &= \left| \sum_{k=1}^n c_k \tilde{x}(t_k) \right| = \sum_{k=1}^n |c_k \text{sign } c_k| = \sum_{k=1}^n |c_k|. \end{aligned}$$

Demak, $\|f\| = \sum_{k=1}^n |c_k|$.

6.2.11. ℓ_2 fazosida aniqlangan

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k + \xi_{k+1}}{2^k} \quad (x = (\xi_1, \xi_2, \dots))$$

funksionalning chiziqli, uzluksiz ekanligini isbotlang va normasini toping.

Yechimi. Xohlagan $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$, $y = (\omega_1, \omega_2, \dots)$ elementlari va $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sonlari uchun

$$\begin{aligned} f(\alpha x + \beta y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\alpha \xi_k + \beta \omega_k) + (\alpha \xi_{k+1} + \beta \omega_{k+1})}{2^k} = \\ &= \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k + \xi_{k+1}}{2^k} + \beta \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\omega_k + \omega_{k+1}}{2^k} = \alpha f(x) + \beta f(y). \end{aligned}$$

Demak, f chiziqli.

Endi birlik sharda chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz.

$$\|\tilde{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^2} = 1$$

bo'lganda $\sum_{k=2}^{\infty} \xi_k^2 = 1 - \xi_1^2$ tengligini yoza olamiz. $|\xi_1| \leq 1$ bo'lganligidan, $|\xi_1| = \sin \omega_0$ belgilashini kirta olamiz. Natijada

$$\begin{aligned}|f(x)| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k + \xi_{k+1}}{2^k} \right| = \left| \frac{\xi_1}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{2^{k+1}} \xi_{k+1} \right| \leq \\&\leq \frac{|\xi_1|}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{2^{k+1}} |\xi_{k+1}| \leq \\&\leq \frac{|\xi_1|}{2} + 3 \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} \right)^2} \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \xi_{k+1}^2} = \\&= \frac{|\xi_1|}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} \xi_k^2} = \frac{|\xi_1|}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{1 - \xi_1^2} = \\&= \frac{1}{2} \sin \omega_0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \omega_0 = \sin \left(\omega_0 + \frac{\pi}{3} \right) \leq 1.\end{aligned}$$

Endi

$$x_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2^2}, \frac{3}{2^3}, \dots \right)$$

nuqtasini qaraylik. Bu nuqta ℓ_2 fazoga tegishli. Haqiqatan,

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2} \right)^2 + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{3}{2^k} \right)^2} = 1.$$

Shu bilan birga,

$$f(x_0) = \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2^{k+1}} \right)^2 = 1.$$

Demak, $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| = 1$.

6.2.12

$$F(y) = \int_0^{\frac{1}{2}} y(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 y(x) dx$$

funktionalning $C[0, 1]$ fazosida chiziqli ekanligini ko'rsating va uning normasini toping.

Yechimi. Funksionalning chiziqli ekanligini ko'rsatamiz:


$$\begin{aligned}
 F(\alpha y + \beta z) &= \int_0^{\frac{1}{2}} (\alpha y + \beta z)(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 (\alpha y + \beta z)(x) dx = \\
 &= \alpha \left(\int_0^{\frac{1}{2}} y(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 y(x) dx \right) + \beta \left(\int_0^{\frac{1}{2}} z(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 z(x) dx \right) = \\
 &= \alpha F(y) + \beta F(z).
 \end{aligned}$$

Endi uzluksiz ekanligini aniqlaylik. Ixtiyorly $y(x) \in C[0, 1]$ uchun:

$$\begin{aligned}
 |F(y)| &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} y(x) dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 y(x) dx \right| \leq \left| \int_0^{\frac{1}{2}} y(x) dx \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 y(x) dx \right| \leq \\
 &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |y(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 |y(x)| dx \leq \\
 &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} \max_{0 \leq x \leq \frac{1}{2}} |y(x)| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \max_{\frac{1}{2} \leq x \leq 1} |y(x)| dx = \\
 &= \max_{0 \leq x \leq \frac{1}{2}} |y(x)| \int_0^{\frac{1}{2}} dx + \max_{\frac{1}{2} \leq x \leq 1} |y(x)| \int_{\frac{1}{2}}^1 dx = \\
 &= \frac{1}{2} \max_{0 \leq x \leq \frac{1}{2}} |y(x)| + \frac{1}{2} \max_{\frac{1}{2} \leq x \leq 1} |y(x)| \leq \\
 &\leq \frac{1}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |y(x)| + \frac{1}{2} \max_{0 \leq x \leq 1} |y(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |y(x)| = \|y\|.
 \end{aligned}$$

Bu munosabat funksionalning chegaralangan, demak, uzluksiz ekanligini ko'rsatadi.

Biz $\|F\| \leq 1$ ekanligini aniqladik. Endi $\|F\| = 1$ tenglikni isbotlaymiz. Buning uchun $\{y_n\}$ funksiyalar ketma-ketligini $\|y_n\| = 1$ va $\lim_{n \rightarrow \infty} F(y_n) = 1$ tengliklarni qanoatlantiradigan etib tuzaylik. $y_n(x)$ sifatida grafigi 8-rasmida ko'rsatilgan funksiyani olamiz.



8-rasm

Bu rasmdan ko‘rinib turganidek, $F(y_n) = 1 - \frac{1}{n}$ (shtrixlangan figуraning yuzasi), shu bilan birga, $\|y_n\| = 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} F(y_n) = 1$ bo‘lganligidan, $\|F\| = 1$ tengligi kelib chiqadi.

6.2.13 $C[a, b]$ fazosida har bir funksionalni

$$F(y) = \int_a^b p(x)y(x)dx \quad (6.8)$$


ko‘rinishida ifodalash mumkin emas ekanligini ko‘rsating, bunda $p(x) = [a, b]$ segmentda uzluksiz funksiya.

Yechimi. Oddiylik uchun $a = -1$, $b = 1$ bo‘lsin. $C[-1, 1]$ fazosida $\delta(y) = y(0)$ funksionalni qaraylik. Uni (6.8) ko‘rinishda yozish mumkin deb olaylik, ya’ni $[-1, 1]$ da uzluksiz f funksiyani topish mumkin bo‘lib, har bir $y(x) \in C[-1, 1]$ uchun δ funksionalning qiymati

$$\delta(y) = \int_{-1}^1 f(x)y(x)dx \quad (6.9)$$

formula bilan hisoblash mumkin bo‘lsin.

Grafigi 9-rasmida ko‘rsatilgan $y_n(x)$ funksiyani qaraymiz.



9-rasm

$$\begin{aligned} \left| \int_{-1}^1 y_n(x) f(x) dx \right| &= \left| \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} y_n(x) f(x) dx \right| \leq \\ &\leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |y_n(x)| |f(x)| dx \leq \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} |f(x)| dx \leq \frac{2\|f\|}{n} \end{aligned}$$

munosabatidan va $n \rightarrow \infty$ da $\frac{2\|f\|}{n} \rightarrow 0$ ekanligidan, biror $n = N$ uchun $\frac{2\|f\|}{n} < \frac{1}{2}$ tengsizligini yoza olamiz. Natijada,

$$\left| \int_{-1}^1 y_N(x) f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2}.$$

Shu bilan birga, $\delta(y_N) = y_N(0) = 1$, bundan $y = y_N$ bo'lganda (6.9) formuladan $\left| \int_{-1}^1 y_N(x) f(x) dx \right| = 1$ tengligiga kelamiz. Bu ziddiyat farazimiz no'tog'ri ekanligini ko'rsatadi.

6.2.14. Absolyut yaqinlashuvchi $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k$ qator va $[a, b]$ segmentidan olingan xohlagan $\{x_k\}$ ketma-ketligi berilgan bo'lsa, $C[a, b]$ fazosida

$$F(y) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k y(x_k)$$

funktionalning chiziqli, uzluksiz ekanligini isbotlang va normasini toping.

Yechimi. Dastlab chiziqli ekanligini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} F(\alpha y_1 + \beta y_2) &= \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k [\alpha y_1(x_k) + \beta y_2(x_k)] = \\ &= \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k y_1(x_k) + \beta \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k y_2(x_k) = \alpha F(y_1) + \beta F(y_2). \end{aligned}$$

Uzluksiz ekanligini ko'rsatish uchun uning chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} |F(y)| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k y(x_k) \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| |y(x_k)| \leq \\ &\leq \max_{a \leq x \leq b} |y(x)| \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k = \|y\| \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|. \end{aligned}$$

Endi $\|F\| = \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|$ tengligining o'rinni ekanligini ko'rsatamiz.

Xohlagan $\varepsilon > 0$ uchun shunday m soni topilib, $\sum_{k=m+1}^{\infty} |\lambda_k| < \varepsilon$ tengsizligi o'rinni bo'ladи. $C[a, b]$ fazosida $|y(x)| \leq 1$ tengsizlikni va $1 \leq k \leq m$ bo'lganda $y(x_k) = \text{sign } \lambda_k$ tengliklarni qanoatlantiruvchi funksiyanı $y_m(x)$ orqali belgilaymiz. Natijada,

$$\begin{aligned} F(y_m) &= \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k y_m(x_k) = \\ &= \sum_{k=1}^m \lambda_k y(x_k) + \sum_{k=m+1}^{\infty} \lambda_k y(x_k) = \\ &= \sum_{k=1}^m |\lambda_k| + \sum_{k=m+1}^{\infty} |\lambda_k| < \varepsilon. \end{aligned}$$

$|y(x)| \leq 1$ bo'lganligidan,

$$\left| \sum_{k=m+1}^{\infty} \lambda_k y(x_k) \right| \leq \sum_{k=m+1}^{\infty} |\lambda_k| < \varepsilon.$$

U holda

$$F(y_m) \geq \sum_{k=1}^m |\lambda_k| - \varepsilon \geq \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| - 2\varepsilon.$$

Demak,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| - 2\varepsilon \leq F(y_m) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|.$$

Endi $\varepsilon > 0$ soni ixтиориyligidан $\|F\| = \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k|$ tengligini yozsa olamiz.

6.2.15. Hilbert fazosida uzluksiz chiziqli funktsonalning urumiyy ko'rinishini toping.

Yechimi. Hilbert fazosidan xohlagan x_0 miqtasini tayinlab,

$$\begin{aligned} f(x) &= \langle x, x_0 \rangle \\ f(\alpha x + \beta y) &= \langle \alpha x + \beta y, x_0 \rangle = \\ &= \alpha \langle x, x_0 \rangle + \beta \langle y, x_0 \rangle = \alpha f(x) + \beta f(y), \end{aligned} \quad (6.10)$$

funktionalini qaraymiz. Ixtiyoriy α, β sondari va x, y elementlar uchun ya'ni f chiziqli funktsonal. Koshi – Bunyakovskiy tengsizligi bo'yicha:

$$|f(x)| = |\langle x, x_0 \rangle| \leq \|x\| \|x_0\|. \quad (6.11)$$

Demak, f uzluksiz.

Endi Hilbert fazosida aniqlangan har bir uzluksiz chiziqli funktsonal (6.10) ko'rinishiga ega bo'lishini ko'rsatamiz. Boshqacha aytqanda, Hilbert fazosida aniqlangan xohlagan uzluksiz chiziqli f funktsonali uchun (6.11) tenglikni qanoatlantiruvchi yagona x_0 nuqtasining mavjud ekanligini isbotlaymiz.

H_0 orqali $\{x \in H : f(x) = 0\}$ to'plamni belgilaymiz. f chiziqli va uzluksiz bo'lganligidan, bu to'plam yopiq qism fazo bo'ladи. Haqidatan, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, x_n \in H_0, n = 1, 2, \dots$ bo'lganda

$$f(x) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0,$$

ya'ni $x \in H_0$.

Agar $H_0 = H$ bo'lsa, x_0 safatida nol elementini olish mumkin. $H_0 \neq H$ bo'lgan holni qaraylik. $H \setminus H_0$ to'plamidan biror y_0 element olib, uni

$$y_0 = y' + y'' \quad (y' \in H_0, y'' \perp H_0)$$

ko'rinishda yozamiz (4.3.12-misolga qarang). $y'' \neq 0$ va $f(y'') \neq 0$ bo'lganligidan, $f(y'') = 1$ tengligi o'rinni deb olish mumkin. Xohlagan

$x \in H$ elementni olib $f(x) = \alpha$ belgilash kiritamiz. $x' = x - \alpha y''$ elementi uchun

$$f(x') = f(x) - \alpha f(y'') = \alpha - \alpha = 0$$

bo'lganligidan, $x' \in H_0$ munosabatga ega bo'lamiz. U holda

$$\langle x, y'' \rangle = \langle x' + \alpha y'', y'' \rangle = \langle x', y'' \rangle + \alpha \langle y'', y'' \rangle = \alpha \langle y'', y'' \rangle.$$

Natijada

$$f(x) = \alpha = \left\langle x, \frac{y''}{\langle y'', y'' \rangle} \right\rangle.$$

Demak, x_0 sifatida $\frac{y''}{\langle y', y'' \rangle}$ elementini olish mumkin.

Endi yagona ekanligini ko'rsatamiz. Agar barcha $x \in H$ elementlar uchun $\langle x, x_0 \rangle = \langle x, x'_0 \rangle$ tengligi o'rinni bo'lsa, u holda $\langle x, x_0 - x'_0 \rangle = 0$ bo'ladi. Natijada $x_0 - x'_0 \perp H$. Bu faqat $x_0 = x'_0$ bo'lganda o'rinni.

6.2.16. E normalangan fazoda noldan farqli uzlucksiz chiziqli f funksionali va $M = \{x \in E : f(x) = 1\}$ to'plami berilgan bo'lsin. U holda

$$\frac{1}{\|f\|} = \inf_{x \in M} \|x\|$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. Xohlagan $x \in E$ element uchun $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$ tengsizligi o'rinni bo'lganligidan, $x \in M$ elementi uchun $1 \leq \|f\| \|x\|$, ya'ni $\frac{1}{\|f\|} \leq \|x\|$ tengsizligini yoza olamiz. Shu sababli $\frac{1}{\|f\|} \leq \inf_{x \in M} \|x\|$.

$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$ bo'lganligidan, xohlagan $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday y_ε elementi topilib,

$$|f(y_\varepsilon)| > (\|f\| - \varepsilon) \|y_\varepsilon\| \quad (\|f\| > \varepsilon)$$

tengsizligi o'rinni bo'ladi. $\frac{y_\varepsilon}{f(y_\varepsilon)}$ nuqtani x_ε orqali belgilaymiz. U holda

$x_\varepsilon \in M$ va $\|x_\varepsilon\| < \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}$. Demak, $\inf_{x \in M} \|x\| < \frac{1}{\|f\| - \varepsilon}$ tengsizligi ham o'rinni. Bu tengsizlikda ε ixtiyoriy bo'lganligidan, $\inf_{x \in M} \|x\| \leq \frac{1}{\|f\|}$ tengsizligini yoza olamiz. Yuqorida $\frac{1}{\|f\|} \leq \inf_{x \in M} \|x\|$ tengsizligining o'rinni ekanligi ko'rsatilgan edi. Natijada, $\frac{1}{\|f\|} = \inf_{x \in M} \|x\|$.

6.2.17. $\mathbb{F}^n, n \in \mathbb{N}$ fazoda har bir chiziqli funksional f uchun shunday $a = (a_i) \in \mathbb{F}^n$ topilib,

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i a_i, \quad x = (x_i) \in \mathbb{F}^n$$

bo'lishini ko'rsating, bunda $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ yoki \mathbb{C} .

Yechimi. Aytaylik, $\{e_1, \dots, e_n\}$ sistema \mathbb{F}^n fazoning bazisi va $f : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ chiziqli funksional bo'lsin. Agar $x = (x_i) \in \mathbb{R}^n$ bo'lsa, u holda

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

va f ning chiziqli ekanligidan,

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i).$$

Demak, f funksional $\{e_1, \dots, e_n\}$ bazisdag'i qiymatlari orqali to'la aniqlanadi. $f(e_i) = a_i$ deb belgilaylik. U holda

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i a_i.$$

6.2.18. $L_2[0, \pi]$ fazoda

$$f(x) = \int_0^\pi x(t) \sin t dt, \quad x \in L_2[0, \pi]$$

funksionalning normasini toping.

Yechimi. $x \in L_2[0, \pi]$ uchun

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \left(\int_0^\pi x(t) \sin t dt \right)^2 \leq \int_0^\pi |x(t)|^2 dt \int_0^\pi \sin^2 t dt = \\ &= \|x\|^2 \int_0^\pi \sin^2 t dt = \|x\|^2 \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

ya'ni $\|f\| \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Endi $x(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin t$ da $f(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ bo'lganligidan, $\|f\| = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

6.2.19. $C[0, \pi]$ fazoda

$$f(x) = \int_0^\pi x(t) \cos t dt, \quad x \in L_2[0, \pi]$$

funksionalning normasini toping.

Yechimi. $x \in C[0, \pi]$ uchun

$$|f(x)| = \left| \int_0^\pi x(t) \sin t dt \right| \leq \|x\| \int_0^\pi \sin t dt = 2\|x\|,$$

yani $\|f\| \leq 2$. Endi $x(t) = 1$ da $f(x) = 2$ bo'lganligidan, $\|f\| = 2$.

Mustaqil ish uchun masalalar

1 - 10 - misollarda $C[0, 1]$ fazodagi funksionalarni chiziqli, uzlusizlikka tekshiring va normasini toping:

1. $f(x) = \int_0^1 x(t) \sin t dt;$

2. $f(x) = x(\frac{1}{2});$

3. $f(x) = \int_0^1 x(t) \operatorname{sign}(t - \frac{1}{2}) dt;$

4. $f(x) = \int_0^1 \sqrt{t} x(t^2) dt;$

5. $f(x) = \int_0^1 \sqrt[3]{t} x(t) dt;$

6. $f(x) = \int_0^1 x(t^2) dt;$

7. $f(x) = x'(t_0);$

8. $f(x) = \int_0^1 |x(t)| dt;$

9. $f(x) = \max_{0 \leq t \leq 1} x(t);$

10. $f(x) = \int_0^1 x^2(t) dt.$

11. c_0 fazoda quyidagi funksionalarning normasini toping, $x = (x_1, \dots, x_n, \dots) \in c_0$:

a) $f(x) = x_1;$

b) $f(x) = \sum_{k=1}^n x_k;$

c) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} x_k;$

d) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} x_k.$

6.3. Qo'shma fazolar

E fazosida aniqlangan f_1 va f_2 chiziqli funksionalarning yig'indisi deb

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x), \quad x \in E$$

ko'rinishda aniqlangan f funksionalga aytildi va $f_1 + f_2$ ko'rinishda belgilanadi.

f chiziqli funksionalning α songa ko'paytmasi deb

$$g(x) = \alpha f(x), \quad x \in E$$

ko'rinishda aniqlangan g funksionalga aytariz va αf ko'rinishda belgilaymiz.

Chiziqli funksionalarning yig'indisi va songa ko'paytmasi chiziqli funksional bo'lishi ravshan. Shu bilan birga, E chiziqli topologik fazosida aniqlangan barcha uzlusiz chiziqli funksionallar to'plami qo'shish va songa ko'paytirish amallariga nisbatan chiziqli fazo bo'lishini tekshirish qiyin emas. Bu chiziqli fazo E fazoga qo'shma fazo deyiladi va E^* ko'rinishda belgilanadi.

Masalalar

6.3.1. E normalangan fazoning ($E^*, \|\cdot\|$) qo'shma fazosi to'la ekanligini isbotlang.

Yechimi. E^* fazosida $\{f_n\}$ fundamental ketma-ketligi berilgan bo'lisin. U holda har bir $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday n_ε soni topilib, $n, m \geq n_\varepsilon$ bo'lganda $\|f_n - f_m\| < \varepsilon$ tengsizligi o'rni. Demak, ixtiyoriy $x \in E$ uchun

$$|f_n(x) - f_m(x)| = |(f_n - f_m)(x)| \leq \|f_n - f_m\| \cdot \|x\| < \varepsilon \|x\|,$$

ya'ni $\{f_n(x)\}$ ketma-ketligi yaqinlashuvchi. Bu ketma-ketlikning limitini $f(x)$ orqali belgilaymiz. $f(x)$ funksional chiziqlidir:

$$f(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\alpha x + \beta y) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha f_n(x) + \beta f_n(y)) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Endi $f(x)$ funksionalning uzlusiz ekanaligini ko'rsatamiz.

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \|x\|$$

tengsizligida $m \rightarrow \infty$ bo'lganda limitga o'tamiz:

$$|f(x) - f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon \|x\|.$$

Bundan $f - f_n$ funksionalning chegaralangan ekanligi kelib chiqadi. U holda $f = f_n + (f - f_n)$ funksional ham chegaralangan, demak, uzliksiz. Shu bilan birga, barcha $n \geq n_\varepsilon$ sonlari uchun $\|f - f_n\| < \varepsilon$ tengsizligi o'rinni, ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$.

6.3.2. Agar \mathbb{R}^n fazosida norma

$$\|x\| = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning qo'shma fazosida normanining

$$\|f\| = \sum_{i=1}^n |f_i| \quad (6.12)$$

kabi aniqlanishini ko'rsating.

Yechimi. $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n \cong (\mathbb{R}^n)^*$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \sum_{i=1}^n x_i f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f_i| |x_i| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f_i| \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = \|x\| \sum_{i=1}^n |f_i|, \end{aligned}$$

ya'ni

$$|f(x)| \leq \|x\| \sum_{i=1}^n |f_i|. \quad (6.13)$$

Koordinatalari $x_i = \text{sign}(f_i)$, $i = \overline{1, n}$ bo'lgan x nuqtani olaylik. U holda

$$\sum_{i=1}^n |f_i| = \sum_{i=1}^n f_i \text{sign}(f_i) = \sum_{i=1}^n f_i x_i = |f(x)|,$$

ya'ni

$$\sum_{i=1}^n |f_i| \geq \|f\|. \quad (6.14)$$

Endi (6.13) va (6.14) tengsizliklardan, (6.12) tenglik kelib chiqadi.

6.3.3. Agar \mathbb{R}^n fazosida norma

$$\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning qo'shma fazosida normanining

$$\|f\| = \max_{1 \leq k \leq n} |f_k| \quad (6.15)$$

kabi aniqlanishini ko'rsating.

Yechimi. $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n \cong (\mathbb{R}^n)^*$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned}|f(x)| &= \left| \sum_{i=1}^n x_i f_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f_i| |x_i| \leq \\&\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \max_{1 \leq k \leq n} |f_k| = \|x\| \max_{1 \leq k \leq n} |f_k|,\end{aligned}$$

ya'ni

$$|f(x)| \leq \|x\| \max_{1 \leq k \leq n} |f_k|. \quad (6.16)$$

Aytaylik, $\max_{1 \leq k \leq n} |f_k| = |f_j|$ bo'lsm. Koordinatalari $x_i = (\operatorname{sign} f_i) \delta_{ij}$, $i = \overline{1, n}$ bo'lgan x nuqtani olaylik. U holda

$$\max_{1 \leq k \leq n} |f_k| = f_j = \sum_{i=1}^n f_i (\operatorname{sign} f_i) \delta_{ij} = \sum_{i=1}^n f_i x_i = |f(x)|,$$

ya'ni

$$\max_{1 \leq k \leq n} |f_k| \geq \|f\|. \quad (6.17)$$

Endi (6.16) va (6.17) tengsizliklardan, (6.15) tenglik kelib chiqadi.

6.3.4. Agar \mathbb{R}^3 fazosida norma

$$\|x\| = |x_1| + \sqrt{x_2^2 + x_3^2}$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning qo'shma fazosida normanining

$$\|f\| = \max\{|f_1|, \sqrt{f_1^2 + f_3^2}\} \quad (6.18)$$

kabi aniqlanishini ko'rsating.

Yechimi. $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, $f = (f_1, f_2, f_3) \in \mathbb{R}^3 \cong (\mathbb{R}^3)^*$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned}|f(x)| &= \left| \sum_{i=1}^3 x_i f_i \right| \leq |f_1| |x_1| + |f_2 x_2 + f_3 x_3| \leq \\&\leq |f_1| |x_1| + \sqrt{f_2^2 + f_3^2} \sqrt{x_2^2 + x_3^2} \leq \max\{|f_1|, \sqrt{f_2^2 + f_3^2}\} (|x_1| + \sqrt{x_2^2 + x_3^2}),\\&\text{ya'ni}\end{aligned}$$

$$|f(x)| \leq \|x\| \max\{|f_1|, \sqrt{f_2^2 + f_3^2}\}. \quad (6.19)$$

Agar $f = 0$ bo'lsa, u holda (6.18) tenglik ravshan. Aks holda, quyidagi hollarni qaraymiz.

a) $\sqrt{f_1^2 + f_3^2} > |f_1|$. Koordinatalari

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{f_2}{\sqrt{f_1^2 + f_3^2}}, x_3 = \frac{f_3}{\sqrt{f_1^2 + f_3^2}}$$

bo'lgan x nuqta olaylik.

U holda

$$|f(x)| = f_2 \frac{f_2}{\sqrt{f_1^2 + f_3^2}} + f_3 \frac{f_3}{\sqrt{f_1^2 + f_3^2}} = \sqrt{f_1^2 + f_3^2},$$

y'a ni

$$\|f\| \geq \max\{|f_1|, \sqrt{f_1^2 + f_3^2}\}. \quad (6.20)$$

b) $\sqrt{f_1^2 + f_3^2} \leq |f_1|$. Koordinatalari

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0$$

bo'lgan x nuqta olaylik.

U holda

$$|f(x)| = |f_1|,$$

y'a ni

$$\|f\| \geq \max\{|f_1|, \sqrt{f_1^2 + f_3^2}\}. \quad (6.21)$$

Endi (6.19) (6.20) va (6.21) tengsizliklardan, (6.18) tenglik kelib chiqadi.

6.3.5. c fazoning qo'shma fazosi ℓ_1 fazosiga izomorf ekanligini ko'rsatning.

Yechimi. c fazosida quyidagi vektorlarni aniqlaymiz:

$$e_0 = (1, 1, \dots, 1, \dots),$$

$$e_k = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{k-1}, 1, 0, \dots), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Natijada har bir $x = (\xi_n) \in c$ elementni

$$x = \xi_0 e_0 + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k (\xi_n - \xi_0) e_n$$

ko'rimishda yozish mumkin, bunda $\xi_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$.

Aytaylik, $f \in c^*$ bo'lgin. U holda

$$\begin{aligned} f(x) &= \xi_0 f(e_0) + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k (\xi_n - \xi_0) f(e_n) = \\ &= \xi_0 \eta_0 + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k (\xi_n - \xi_0) \eta_n, \end{aligned}$$

bunda $\eta_0 = f(e_0)$ va $\eta_n = f(e_n)$, $n \in \mathbb{N}$.

Endi $f(x)$ sonini boshqa ko'rinishda ham yozish mumkin ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun ε_n sonlarni $\varepsilon_n = \text{sign } \eta_n$ ko'rimishda aniqlaymiz. Har bir $m \in \mathbb{N}$ sonini tayinlab, $x^{(m)} = (\xi_n) \in c$ muqtani quyidagicha saylab olamiz: $\varepsilon_n \leq m$ bo'lganda $\xi_n = \varepsilon_n$, $n > m$ bo'lganda $\xi_n = 0$. U holda $\|x^{(m)}\| \leq 1$. Natijada

$$|f(x^{(m)})| = \left| \sum_{n=1}^m \alpha \tilde{\xi}_n \eta_n \right| = \sum_{n=1}^m |\eta_n| \leq \|f\|.$$

$m \in \mathbb{N}$ ning ixtiyoriyligidan, $\sum_{n=1}^\infty |\eta_n| < +\infty$ kelib chiqadi, ya'ni $(\eta_n) \in \ell_1$. Demak, har bir $x = (\xi_n) \in c$ elementi uchun $\sum_{n=1}^\infty \xi_n \eta_n$ qator absolyut yaqinlashuvchi va

$$f(x) = \xi_0 \eta_0 + \sum_{n=1}^\infty \xi_n \eta_n. \quad (6.22)$$

Demak, agar $f \in c^*$ bo'lsa, u holda ixtiyoriy $x = (\xi_n) \in c$ nchun (6.22) o'rini, bunda $\xi_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n$, $\eta_0 = \text{const}$ va $(\eta_n) \in \ell_1$. Yuqoridagidek, $m \in \mathbb{N}$ sonini tayinlab $x_m = (\xi_n) \in c$ muqtani saylab olamiz: $n \leq m$ bo'lganda $\xi_n = \varepsilon_n$, $n > m$ bo'ganda $\xi_n = \varepsilon_0 = \text{sign } \eta_0$ (ε_n sonlari yuqorida aniqlandi). U holda $\|x_m\| \leq 1$, $\xi_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \varepsilon_0$ va

$$f(x_m) = |\eta_0| + \sum_{n=1}^m |\eta_n| + \varepsilon_0 \sum_{n=m+1}^\infty \eta_n.$$

Bundan

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \geq |f(x_m)|$$

va $m \rightarrow \infty$ da

$$|\eta_0| + \sum_{n=1}^\infty |\eta_n| \leq \|f\|.$$

Har bir $y = (\eta_n) \in \ell_1$ element (6.22) formula yordamida c fazosida biror uzlusiz chiziqli f funksionalni aniqlaydi, shu bilan birga,

$$\|f\| = |\eta_0| + \sum_{n=1}^{\infty} |\eta_n|.$$

Demak, $c^* \cong \ell_1$.

6.3.6. ℓ_1 fazoning qo'shma fazosi m fazosiga izomorf ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in m$ bo'lsa, u holda

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \xi_i, \quad x = (x_i) \in \ell_1 \quad (6.23)$$

formula ℓ_1 fazoda chiziqli funksionalni aniqlaydi.

f ning uzlusizligi

$$|f(x)| \leq \sup_k |\xi_k| \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \|\xi\|_m \|x\|_{\ell_1},$$

ya'ni

$$\|f\| \leq \|\xi\|_m \quad (6.24)$$

tensizlididan kelib chiqadi.

Endi ℓ_1 fazoda har bir uzlusiz chiziqli funksional (6.23) ko'rinishda ekanligini isbotlaymiz.

ℓ_1 fazosida quyidagi vektorlarni qaraylik:

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1}, 1, 0, \dots), \quad n \in \mathbb{N}.$$

U holda $x = (x_n) \in \ell_1$ elementni

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i$$

ko'rinishda yozish mumkin va $x^{(n)} = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ uchun

$$\|x^{(n)} - x\| = \sum_{j=n+1}^{\infty} |x_j| \rightarrow 0.$$

$f \in \ell_1^*$ bo'lsin. U holda

$$f(x) = f \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i \right) = f \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i e_i \right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \xi_i,$$

bunda

$$\xi_i = f(e_i), i \in \mathbb{N}.$$

$$|\xi_i| = |f(e_i)| \leq \|f\|$$

dan $(\xi_i) \in m$. Demak,

$$\|\xi\|_m = \sup_k |\xi_k| \leq \|f\|. \quad (6.25)$$

(6.24) va (6.25) dan $\|f\| = \|\xi\|$ kelib chiqadi, ya'ni $\ell_1^* \cong m$.

6.3.7. m^* fazoning ℓ_1 fazoga izomorf emasligini ko'rsating.

Yechimi. Ravshanki, c yaqinlashuvchi ketma-ketliklar fazosi m ning qism fazosidir, c qism fazoda

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, x = (x_n) \in c \quad (6.26)$$

ifoda chegaralangan chiziqli funksionalni aniqlaydi.

$x_0 = (1, 1, \dots, 1, \dots) \in c$ nuqtada $f(x_0) = 1$ dan $\|f\| = 1$ kelib chiqadi. Xan-Banax teoremasidan bu funksionalni normasini saqlagan holda m fazosiga davom ettirish mumkin.

Faraz qilaylik, bu funksional ℓ_1 fazo elementi orqali aniqlansin, ya'ni shunday $\xi = (\xi_n) \in \ell_1$ topilib,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \xi_n, (x_n) \in m. \quad (6.27)$$

$e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, $n \in \mathbb{N}$ elementlarni qaraylik. (6.27) dan $f(e_n) = 0$, $n \in \mathbb{N}$ kelib chiqadi.

Ikkinchisi tomonidan, (6.27) ga ko'ra

$$f(e_n) = \xi_n, n \in \mathbb{N}.$$

Bundan $\xi_n = 0$, $n \in \mathbb{N}$. (6.27) dan esa

$$f(x) = 0, \forall x \in m.$$

Demak, $f \equiv 0$. Bu esa $\|f\| = 1$ ekanligiga zid. Hosil bo'lgan ziddiyat-dan, m^* fazoning ℓ_1 fazoga izomorf emasligini kelib chiqadi.

6.3.8. $C[a, b]$ fazoning refleksiv emasligini isbotlang.

Yechimi. Teskarisini faraz qilaylik. U holda chekli variatsiyali funksiyalar fazosi V da aniqlangan har bir uzlusiz chiziqli $F(f)$ funksional $C[a, b]$ fazosidagi biror $x(t)$ funksiya orqali aniqlanishi kerak, ya'ni

$$F(f) = F_x(f) = f(x).$$

Demak,

$$F_r(f) = \int_a^b x(t) df(t),$$

bunda $f(t) \in C[a; b]^*$ da $f(x)$ funksionalga mos keluvchi chekli variatsiyali funksiya.

Quyidagi funksionalni qaraylik:

$$F_0(f) = f(t_0 + 0) - f(t_0 - 0) \quad (t_0 \in [a, b]).$$

Bu funksionalning chiziqli ekanligi ravshan, uzluksizligi quyidagi baho-lashdan kelib chiqadi:

$$|F_0(f)| \leq |f(t_0 + 0) - f(t_0 - 0)| \leq V_a^b(f) = \|f\|.$$

Bundan tashqari $F_0(f) \neq 0$, shuning uchun $[a, b]$ da uzluksiz $x_0(t) \neq 0$ funksiya mavjud bo'lib, $F_0(f) = \int_a^b x_0(t) df(t)$ tenglik o'rinni bo'ladi.

Endi $f(t) = \int_a^t x_0(s) ds$ funksiyani qaraylik. Bu funksiya $[a, b]$ da uzluksiz bo'lganligidan, $F_0(f_0) = 0$. Biroq ikkinchi tomondan,

$$F_0(f) = \int_a^b x_0(t) df(t) = \int_a^b x_0^2(t) dt > 0.$$

Bu ziddiyatdan $C[a, b]$ fazoning refleksiv emasligi ko'rindi.

6.3.9. $L^0(0, 1)^* = \{0\}$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Faraz qilaylik, $f \in L^0(0, 1)^*$, $f \neq 0$ mavjud bo'lsin. Yarim intervallarning xarakteristik funksiyalari chiziqli kombinasiyalari $L^0(0, 1)$ fazoda zich bo'lganligidan, shunday $\Delta_1 \subseteq [0, 1]$ yarim interval topilib, $f(\chi_{\Delta_1}) = \delta_1 \neq 0$ o'rinnlidir. Δ_1 ni teng ikkita dizyunkt Δ'_1, Δ''_1 yarim intervallarga ajrataylik. $\chi_{\Delta_1} = \chi_{\Delta'_1} + \chi_{\Delta''_1}$ bo'lganligidan,

$$f(\chi_{\Delta'_1}) + f(\chi_{\Delta''_1}) = f(\chi_{\Delta_1}) \neq 0$$

kelib chiqadi. Bundan $f(\chi_{\Delta'_1}) \neq 0$ yoki $f(\chi_{\Delta''_1}) \neq 0$. Bu sonlarning noldan farqlisiga mos keluvchi yarim intervalni Δ_2 deb belgilaylik, ya'ni $f(\chi_{\Delta_2}) = \delta_2 \neq 0$, bunda $\mu(\Delta_2) \leq 1/2$.

Bu jarayonni davom ettirib,

a) $\mu(\Delta_n) \leq 1/2^n$;

b) $f(\chi_{\Delta_n}) = \delta_n \neq 0$

shartlarni qanoatlantiruvchi $\{\Delta_n\}$ yarim intervallarga ega bo'lamiz.

Endi $x_n = \delta_n^{-1} \chi_{\Delta_n}$ deylik. U holda $\mu(\Delta_n) \leq 1/2^n$ dan $\{x_n\}$ ketma-ketlik o'lchov bo'yicha nolga intiladi, ya'ni $x_n \xrightarrow{\mu} 0$. f ning uzluksizligidan, $f(x_n) \rightarrow 0$.

Lekin

$$f(x_n) = f(\delta_n^{-1} \chi_{\Delta_n}) = \delta_n^{-1} \delta_n = 1.$$

Hosil bo'lgan ziddiyatdan $f \equiv 0$, ya'ni $L^0(0, 1)^* = \{0\}$ ekanligini kelib chiqadi.

6.3.10. E normalangan fazo va $x_0 \in E$ bo'lsin. U holda shunday $f \in E^*$ mavjudki,

$$\|f\| = 1$$

va

$$f(x_0) = \|x_0\|$$

tengliklari o'rinnlidir.

Yechimi. x_0 elementning chiziqli qobig'i $\mathcal{L}(x_0)$ da

$$f(\alpha x_0) = \alpha \|x_0\|$$

formula bilan aniqlangan funksionalni qaraylik.

$$|f(\alpha x_0)| = |\alpha| \|x_0\| = \|\alpha x_0\|$$

dan va normaning bir-jinsli qavariq funksionalligidan, Xan – Banax teoremasiga asosan, bu funksionalni E fazosigacha davom ettiramiz. U holda

$$\|f\| = 1$$

va

$$f(x_0) = \|x_0\|$$

tengliklari o'rinnlidir.

6.3.11. E normalangan fazo va $x_0 \in E$ bo'lsin. U holda

$$\psi_{x_0}(f) = f(x_0), f \in E^*$$

orqali aniqlangan funksional E^ da chegaralangan ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. $f_1, f_2 \in E^*, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ uchun

$$\begin{aligned} \psi_{x_0}(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2) &= (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)(x_0) = \\ &= \alpha_1 f_1(x_0) + \alpha_2 f_2(x_0) = \alpha_1 \psi_{x_0}(f_1) + \alpha_2 \psi_{x_0}(f_2). \end{aligned}$$

Bundan ψ_{x_0} chiziqli funksional. Endi

$$|\psi_{x_0}(f)| = |f(x_0)| \leq \|f\| \|x_0\|$$

ekanligidan, ψ_{x_0} chegaralangan funksional va $\|\psi_{x_0}\| \leq \|x_0\|$.

6.3.12. *E normalangan fazo bo'lsin. U holda*

$$x \in E : \mapsto \psi_x \in E^{**}$$

orqali aniqlangan akslantirish izometriya ekanligini ko'rsating.

Yechimi. 6.3.10-misoldan har bir $x \in E$ uchun $\|\psi_x\| \leq \|x\|$ tengsizligi o'rinni.

6.3.10-misolga asosan, har bir $x \in E$ uchun shunday $f \in E^*$ topiladiki, $|f(x)| = \|f\| \|x\|$. Bundan

$$\|\psi_x\| = \sup_{f \in E^*} \frac{|f(x)|}{\|f\|} \geq \|x\|,$$

ya'ni $\|\psi_x\| \geq \|x\|$. Demak,

$$\|\psi_x\| = \|x\|.$$

6.3.13. *X Banax fazosi, $f_n \in X^*$, $n \in \mathbb{N}$ va ixtiyoriy $x \in X$ uchun*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, f_n \rangle = \langle x, f \rangle$$

tengligi o'rinni bo'lsin. U holda $f \in X^$ bo'lishini isbotlang.*

Yechimi. 6.1.20-misolda A_n operatorini f_n funksional bilan almashtirsak, misolning yechimi kelib chiqadi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. c_0 fazoning refleksiv emasligini ko'rsating.
2. ℓ_1 fazoning refleksiv emasligini ko'rsating.
3. ℓ_p^* fazoning ℓ_q fazoga izomorf ekanligini ko'rsating, bunda $1 < p < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
4. Agar f chiziqli funksional $c_0 \subset m$ fazoda chegaralangan bo'lsa, u holda bu funksionalni normasini saqlab, m fazosiga yagona usulda davom ettirish mumkinligini isborlang.
5. Agar X cheksiz o'lchamli normalangan fazo bo'lsa, u holda X^* fazo ham cheksiz o'lchamli ekanligini isbotlang.
6. X Banax fazosi bo'lsin. Har bir $M \subset X$ to'plam uchun

$$M^* = \{f \in X^* : |f(x)| \leq 1, \forall x \in M\}$$

to'planning yopiq va qavariq ekanligini ko'rsating.

7. X va Y normalangan fazolar, $Z = X \oplus Y$ ularning to'g'ri yig'indisi bo'lsin. U holda Z fazodagi har bir uzuksiz chiziqli funksional f yagona usulda

$$f((x, y)) = h(x) + g(y)$$

ko'rinishda tasvirlanishini isbotlang, bunda $h \in X^*$, $g \in Y^*$.

8. X Banax fazosi bo'lsin. Agar X^* separabel bo'lsa, u holda X ham separabel ekanligini ko'rsating.

9. X separabel bo'lib, X^* separabel bo'Imagan X Banax fazosiga misol keltiring.

10. Qo'shma fazosi c fazosiga izomorf bo'lgan Banax fazosi mavjud emasligini ko'rsating.

11. X Banax fazosi bo'lsim. Ixtiyoriy chiziqli erkli $\{x_n\} \subset X$ ketma-ketligi uchun shunday $\{f_n\} \subset X^*$ ketma-ketligi mavjud bo'lib,

$$\|f_n\| = 1 \quad \text{va} \quad f_i(x_j) = \delta_{ij}$$

o'rinnlidir.

6.4. Kuchsiz topologiya va kuchsiz yaqinlashish

E chiziqli topologik fazosida aniqlangan barcha uzuksiz funksionallar to'plamidan chekli sondagi f_1, f_2, \dots, f_n funksionallarni olamiz. Agar ε musbat son bo'lsa, u holda

$$\{x : |f_i(x)| < \varepsilon, i = 1, 2, \dots, n\} \quad (6.27)$$

to'plami E fazosida ochiq bo'ladi. Shu bilan birga, bunday to'plamlar nol nuqtasini o'z ichiga oladi. Shuning uchun u nol nuqtaning biror atrofi. Bunday atroflar sistemasi nol nuqta atroflarining aniqlovchi sistemasi bo'ladi. E fazoda (6.27) ko'rinishdagi to'plamlar sistemasi hosil etgan topologiya *kuchsiz topologiya* deyiladi.

Kuchsiz topologiya bo'yicha yaqinlashishga *kuchsiz yaqinlashish* deyiladi. (6.27) ko'rinishdagi to'plamlar aniqlanishidan, $\{x_n\} \subset E$ ketma-ketligi $x \in E$ elementiga yaqinlashishi quyidagiga teng kuchlidir:

$$f(x_n) \rightarrow f(x), \quad f \in E^*.$$

Kuchsiz yaqinlashish $x_n \xrightarrow{w} x$ kabi belgilanadi.

E^* fazodagi normaga mos keluvchi topologiyaga shu fazodagi *kuchli topologiya* deyiladi.

E chiziqli topologik fazosida x_1, x_2, \dots, x_n nuqtalarni olamiz. $\varepsilon > 0$ bo'lsin.

$$\{f \in E^* : |f(x_i)| < \varepsilon, i = 1, 2, \dots, n\} \quad (6.28)$$

to'plaini E^* fazosida ochiq bo'ladi. Bu atroflar sistemasi nol nuqta atroflarining aniqlovchi sistemasi bo'ladi. E^* fazoda (6.28) ko'rimishdagi to'plamlar sistemasi hosil etgan topologiya $*\text{-kuchsiz topologiya}$ deyiladi.

$*$ -Kuchsiz topologiya bo'yicha yaqinlashishga $*\text{-kuchsiz yaqinlashish}$ deyiladi. (6.28) ko'rimishdagi to'plamlar aniqlanishidan, $\{f_n\} \subset E^*$ ketma-ketligi $f \in E^*$ funksionaliga yaqinlashishi quyidagiga teng kuchlidir:

$$f_n(x) \rightarrow f(x), x \in E.$$

$*$ -Kuchsiz yaqinlashish $f_n \xrightarrow{*w} f$ kabi belgilanadi.

Masalalar

6.4.1. E Banax fazosida $\{x_n\}$ ketma-ketlik kuchli yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda bu ketma-ketlikning kuchsiz yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $\{x_n\}$ ketma-ketlik x elementga kuchli yaqinlashsin, ya'ni $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Ixtiyoriy $f \in E^*$ uchun

$$|f(x_n) - f(x)| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \|x_n - x\| \rightarrow 0$$

ekanligidan, $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Bundan $x_n \xrightarrow{w} x$.

6.4.2. E^* fazosida $\{f_n\}$ ketma-ketlik kuchli yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda bu ketma-ketlikning $*\text{-kuchsiz yaqinlashuvchi ekanligini ko'rsating.}$

Yechimi. Aytaylik, $\{f_n\}$ ketma-ketlik f funksionalga kuchli yaqinlashsin, ya'ni $\|f_n - f\| \rightarrow 0$. Ixtiyoriy $x \in E$ uchun

$$|f_n(x) - f(x)| = |(f_n - f)(x)| \leq \|x\| \|f_n - f\| \rightarrow 0$$

ekanligidan, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Bundan $f_n \xrightarrow{*w} f$.

6.4.3. E chiziqli topologik fazoda kuchsiz yaqinlashishga quyidagicha ta'rif berish mumkin ekanligini isbotlang: x_0 nuqtasi va $\{x_n\}$ ketma-ketligi berilganda har bir $\varphi \in E^*$ funksional uchun $\{\varphi(x_n)\}$ ketma-ketligi $\varphi(x_0)$ soniga yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketligi x_0 nuqtaga kuchsiz yaqinlashuvchi deyiladi.

Yechimi. Oddiylik uchun $x_0 = 0$ va har bir $\varphi \in E^*$ uchun $\varphi(x_n) \rightarrow 0$ bo'lsin. Nol nuqtaning ixtiyoriy

$$U = \{x : |\varphi_i(x)| < \varepsilon, i = 1, \dots, k\}$$

kushsiz atrofini olaylik. U holda har bir $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday n_i ($i = 1, 2, \dots, k$) soni topilib, $n \geq n_i$ bo'lganda $|\varphi_i(x)| < \varepsilon$ o'rini bo'ladi. $n_\varepsilon = \max n_i$ deb olsak, $n \geq n_\varepsilon$ bo'lganda $x_n \in U$ ni yoza olamiz.

Teskarisi, agar nol nuqtaning har bir kuchsiz U atrofi uchun shunday n_0 soni topilib, $n \geq n_0$ bo'lganda $x_n \in U$ o'rini bo'lsa, u holda $n \rightarrow \infty$ da har bir $\varphi \in E^*$ uchun $\varphi(x_n) \rightarrow 0$ ekanligi ko'rindi.

6.4.4. Normalangan fazoda berilgan har bir $\{x_n\}$ kuchsiz yaqinlashuvchi ketma-ketlikning chegaralangan ekanligini isbotlang.

Yechimi. E^* fazosida

$$A_{kn} = \{f : |f(x_n)| \leq k\}, k, n = 1, 2, \dots \quad (6.29)$$

to'plamlarini qaraylik.

Tayinlangan x_n da f o'zgaruvchidan olingan $\langle f, x_n \rangle$ funksiya uzluksiz bo'lganligidan, (6.29) to'plamlari yopiq bo'ladi. Yopiq to'plamlarning kesishmasi yopiq bo'lganligidan, $A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{kn}$ to'plami ham yopiq bo'ladi. $\{x_n\}$ ketma-ketligi kuchsiz yaqinlashuvchi bo'lganligidan, har bir $f \in E^*$ uchun $f(x_n)$ sonli ketma-ketligi yaqinlashuvchi, demak, chegaralangan. Boshqacha aytganda, E^* fazosidan olingan ixtiyoriy f element A_k to'plamlarining bittasiga tegishli bo'ladi. Shuning uchun

$$E^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

tengligini yoza olamiz. E^* fazosi to'liq bo'lganligidan, Ber teoremasi (3.1.11-misolga qarang) bo'yicha A_k to'plamlarning bittasi, Aytaylik, A_m to'plami biror $B[f_0, \varepsilon]$ sharda zinch bo'ladi. A_m yopiq bo'lganligidan, $B[f_0, \varepsilon] \subset A_m$ o'rini. Natijada $\{x_n\}$ ketma-ketlik $B[f_0, \varepsilon]$ sharida, demak, E^* fazosida har bir sharda chegaralangan bo'ladi. Jumladan, birlik sharda ham chegaralangan. Boshqacha aytganda, $\{x_n\}$ ketma-ketlik hadlari E^{**} fazo elementlari sifatida chegaralangan. $E \subset E^{**}$ munosabatidan $\{x_n\}$ ketma-ketlikning E fazosida ham chegaralangan ekanligi kelib chiqadi.

6.4.5. E normalangan fazoda $\{x_n\}$ ketma-ketligi va $x \in E$ element berilgan bo'lib, quyidagi ikki shart o'rini bo'lsin:

- 1) $\{\|x_n\|\}$ ketma-ketligi biror M soni bilan chegaralangan;
 2) E^* fazosida zich bo'lgan biror Δ to'plamidan olingan har bir f uchun $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

U holda $\{x_n\}$ ketma-ketligining x nuqtaga yaqinlashuvchi ekanini isbotlang.

Yechimi. $\varphi = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_k f_k$, $f_1, f_2, \dots, f_k \in \Delta$ bo'lsa, u holda ikkinchi shartdan:

$$\varphi(x_n) = (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_k f_k)(x_n) =$$

$$\begin{aligned} &= \alpha_1 f_1(x_n) + \alpha_2 f_2(x_n) + \dots + \alpha_k f_k(x_n) \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \dots + \alpha_k f_k(x) = \varphi(x). \end{aligned}$$

Endi E^* fazodan ixtiyoriy φ element olaylik. $\{\varphi_n\}$ orqali elementlari Δ to'plam elementlarining chiziqli kombinasiyalariдан iborat va φ elementiga yaqinlashuvchi ketma-ketlikni belgilaymiz. $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ orinli ekanligini ko'rsatishimiz kerak. M sonini $\|x_n\| \leq M$, $n = 1, 2, \dots$, $\|x\| \leq M$ o'rinni bo'ladigan etib saylab olaylik.

$\varphi_k \rightarrow \varphi$ bo'lganligidan, har bir $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday k_ε soni topilib, $k \geq k_\varepsilon$ bo'lganda $\|\varphi - \varphi_k\| < \varepsilon$ tengsizligi o'rinni boladi. Bundan $|\varphi(x_n) - \varphi_k(x_n)| = |\varphi(x_n) - \varphi_k(x_n) + \varphi_k(x_n) - \varphi_k(x) + \varphi_k(x) - \varphi(x)| \leq |\varphi(x_n) - \varphi_k(x_n)| + |\varphi_k(x_n) - \varphi_k(x)| + |\varphi_k(x) - \varphi(x)| \leq \varepsilon M + \varepsilon M + |\varphi_k(x_n) - \varphi_k(x)|$.

Shart bo'yicha $\varphi_k(x_n) \rightarrow \varphi_k(x)$ bo'lganligidan, har bir $\varphi \in E^*$ uchun $\varphi(x_n) - \varphi(x) \rightarrow 0$ ekanligi kelib chiqadi.

6.4.6. Chekli o'lchanli \mathbb{R}^n evklid fazosida har bir kuchsiz yaqinlashuvchi ketma-ketlikning kuchli yaqinlashunchi ekanini isbotlang.

Yechimi. Aytaylik, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ sistema \mathbb{R}^n daga bior ortonormal bazis bo'lib, $\{x_k\}$ ketma-ketlik \mathbb{R}^n da x elementiga kuchsiz yaqinlashuvchi bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} x_k &= x_k^{(1)} e_1 + \dots + x_k^{(n)} e_n, \\ x &= x^{(1)} e_1 + \dots + x^{(n)} e_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_k^{(1)} &= \langle x_k, e_1 \rangle \rightarrow \langle x, e_1 \rangle = x^{(1)}, \\ x_k^{(n)} &= \langle x_k, e_n \rangle \rightarrow \langle x, e_n \rangle = x^{(n)}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |\cos nt| dt = \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\cos nt| dt = \\ &= \frac{1}{n\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{2\pi} |\cos z| dz = \frac{4}{\pi}, \quad (n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

ya'ni $\{x_k\}$ ketma-ketlik x elementiga koordinata bo'yicha yaqinlashishchi. Natijada,

$$\|x - x_k\| = \left(\sum_{i=1}^n (x_k^{(i)} - x^{(i)})^2 \right)^{1/2} \rightarrow 0,$$

ya'ni $\{x_k\}$ ketma-ketlik x ga kuchli yaqinlashuvchi bo'ladı.

6.4.7. $C[0, 2\pi]$ fazosida kuchli va kuchsiz yaqinlashishlar o'zaro teng kuchlinit?

Yechimi. $C[0, 2\pi]$ fazosida

$$a_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \cos nt dt, \quad n \in \mathbb{N}$$

formula orqali aniqlangan uzluskiz chiziqli funksionallar ketma-ketligini qaraylik.

Matematik analiz kursidan ma'lumki, $[0, 2\pi]$ kesmada uzluskiz bo'lgan har bir $x(t)$ funksiya uchun uning Fure qatoriga yoyilmasi koefitsientlaridan tuzilgan $\{a_n(x)\}$ ketma-ketlik nolga yaqinlashuvchi bo'ladı ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = 0$), ya'ni $\{a_n(x)\}$ funksionallar ketma-ketligi nol funksionaliga kuchsiz yaqinlashuvchi bo'adi.

Shu bilan birga, $a_n(x)$ funksionallarni

$$a_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) d \left(\int_0^t \cos nu du \right)$$

ko'rinishda yozish mumkin, bundan tashqari

$$Var_{t \in [0, 2\pi]} \left(\int_0^t \cos nu du \right) = \int_0^{2\pi} |\cos nu| du,$$

ya'ni

Demak, $C[0, 2\pi]$ fazosida qaralayotgan uzlusiz chiziqli funksionallarning $\{a_n(x)\}$ ketma-ketligi kuchsiz yaqinlashuvchi bo'lib, kuchli yaqinlashuvchi emas.

6.4.8. $C[a, b]$ fazoda $\sin(nt)$ ketma-ketligi kuchsiz yaqinlashuvchi bo'ladimi?

Yechimi. $x_n(t) = \sin nt$ ketma-ketlik hadlarida

$$f(x_n) = x_n \left(\frac{\pi}{2} \right) = \sin \frac{n\pi}{2}$$

ko'rinishda aniqlangan f funksionalni qaraylik.

$$\{f(x_n)\} = \{1, 0, -1, 0, 1, \dots\}$$

bo'lganligidan, bu ketma-ketlik yaqinlashuvchi emas. Demak, $\{x_n\}$ ketma-ketligi kuchsiz yaqinlashuvchi emas.

6.4.9. (Shur teoremasi) ℓ_1 fazoda berilgan ketma-ketlikning kuchsiz yaqinlashuvchiligidan, uning norma bo'yicha yaqinlashuvchi bo'lishi kelib chiqishini isbotlang.

Yechimi. ℓ_1 fazosida $\{y_n\}$ ketma-ketligi y_0 nuqtaga kuchsiz yaqinlashuvchi bo'lsin. U holda $\{x_n : x_n = y_n - y_0\}$ ketma-ketligi 0 nuqtaga kuchsiz yaqinlashuvchi bo'ladi. Biz $\|x_n\| \rightarrow 0$ bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Teskarisini faraz qilaylik. Ushbu

$$\lim \|x_{n_m}\| = l > 0$$

munosabatni qanoatlantiruvchi $\|x_{n_m}\|$ qism ketma-ketligi mavjud bo'lsin. Zarur bo'lsa x_{n_m} elementlarni $\frac{x_{n_m}}{\|x_{n_m}\|}$ ko'rinishdagi elementlar bilan almashtirib, nolga kuchsiz yaqinlashuvchi va har bir hadi normasi 1 ga teng ketma-ketlikga ega bo'lamiz.

Demak, berilgan $\{x_n\}$ ketma-ketlik quyidagi shartlarni qanoatlantiradi deyishimiz mumkin:

$$x_n \rightarrow 0 \quad (6.30)$$

va

$$\|x_n\| = 1 \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (6.31)$$

bo'lsin. Endi f_k funksionalni quyidagicha aniqlaymiz:

$$f_k(x) = \xi_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

(6.30) munosabatdan $\{f_k(x_n) : n = 1, 2, \dots\}$ ketma-ketlikning nolga yaqinlashuvchi ekanligi, ya'ni

$$\xi_k^{(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (6.32)$$

bo'lishi kelib chiqadi. $n_1 = 1$ bo'lsin. U holda

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k^{(n_1)}| = \|x_{n_1}\| = 1.$$

Natijada

$$\sum_{k=1}^{p_1} |\xi_k^{(n_1)}| > \frac{3}{4}$$

tengsizlikni qanoatlantiruvchi $p_1 > 0$ soni mavjud bo'ladi.

Aytaylik, quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi

$$1 = n_1 < p_2 < \dots < n_j$$

va

$$0 = p_0 < p_1 < \dots < p_j$$

butun sonlari tanlangan bo'lsin:

$$\sum_{k=1}^{p_{s-1}} |\xi_k^{(n_s)}| < \frac{1}{4} \quad (s = 1, 2, \dots, j) \quad (6.33)$$

va

$$\sum_{k=p_{s-1}+1}^{p_s} |\xi_k^{(n_s)}| > \frac{1}{4} \quad (s = 1, 2, \dots, j). \quad (6.34)$$

U holda (6.33) munosabatga ko'ra shunday $n_{j+1} > n_j$ soni topiladiki, natijada ushbu

$$\sum_{k=1}^{p_j} |\xi_k^{(n_{j+1})}| < \frac{1}{4}$$

tengsizligi o'rinali bo'ladi. Bu tengsizlik va (6.33) munosabatdan:

$$\sum_{k=P_j+1}^{\infty} |\xi_k^{(n_{j+1})}| = \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k^{(n_{j+1})}| - \sum_{k=1}^{p_j} |\xi_k^{(n_{j+1})}| > \frac{3}{4}.$$

U holda quyidagi tengsizlikni qanoatlantiruvchi $p_{j+1} > p_j$ nomerini tanlash mumkm:

$$\sum_{k=p_j+1}^{p_{j+1}} |\xi_k^{(n_{j+1})}| > \frac{3}{4}$$

Shu taxlitda fikrlashni davom ettirsak, (6.33) va (6.34) tengsizliklar har bir $s = 1, 2, \dots$ uchun o'rinali bo'ladigan ikkita $1 < n_1 < n_2 < \dots$ va

$0 = p_0 < p_1 < \dots < p_j < \dots$ butun sonlar ketina-ketliklarning mavjud ekanligini ko'rsatadi. Ushbu

$$\eta_k = \text{sign} \xi_k^{(n_s)} \quad (p_{s-1} < k \leq p_s; \quad k, s = 1, 2, \dots)$$

ko'rinishda belgilash kiritamiz. $\{\eta_k\} \in \ell_\infty$ bo'lganligidan, ℓ_1 fazosida quyidagicha f_0 funksionalni qaraymiz:

$$f_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k \xi_k \quad (x = \{\xi_k\}).$$

$f_0(x_{n_s})$ kattalikni quyidan baholaymiz. $|\eta_1| \leq 1$ ekanligini e'tiborga olsak,

$$\begin{aligned} |f_0(x_{n_s})| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k \xi_k^{(n_s)} \right| \geq \\ &\geq \left| \sum_{k=p_{s-1}+1}^{p_s} \eta_k \xi_k^{(n_s)} \right| - \sum_{k=1}^{p_{s-1}} |\eta_k \xi_k^{(n_s)}| - \sum_{k=p_s+1}^{\infty} |\eta_k \xi_k^{(n_s)}| \geq \\ &\geq \sum_{k=p_{s-1}+1}^{p_s} |\eta_k \xi_k^{(n_s)}| - \sum_{k=1}^{p_{s-1}} |\xi_k^{(n_s)}| - \sum_{k=p_s+1}^{\infty} |\xi_k^{(n_s)}| = \\ &= 2 \sum_{k=p_{s-1}+1}^{p_s} |\xi_k^{(n_s)}| - \|x_{n_s}\|. \end{aligned}$$

Demak, (6.31) va (6.34) bo'yicha

$$f_0(x_{n_s}) > \frac{1}{2}$$

tengsizligini yoza olamiz. Bu esa $\|x_{n_s}\| = 1$ shartiga zid. Demak, $\|x_n\| \rightarrow 0$.

6.4.10. *H Hilbert fazosi, $\{x_n\} \subset H$. Agar $\{x_n\}$ ketma-ketlik $x_0 \in H$ nuqtaga kuchsiz yaqinlashib, $\|x_n\| \rightarrow \|x_0\|$ bo'lsa, u holda $\{x_n\}$ ketma-ketlik x_0 ga kuchli yaqinlashishini ko'rsating.*

Yechimi. $\{x_n\}$ ketma-ketlik $x_0 \in H$ nuqtaga kuchsiz yaqinlashishi-dan, har bir $y \in H$ uchun

$$\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x_0, y \rangle$$

o'rnlidir. $\|x_n\| \rightarrow \|x_0\|$ bo'lganligidan,

$$\langle x_n, x_n \rangle \rightarrow \langle x_0, x_0 \rangle.$$

Bundan

$$\begin{aligned} \|x_n - x_0\|^2 &= \langle x_n - x_0, x_n - x_0 \rangle = \\ &= \langle x_n, x_n \rangle + \langle x_0, x_0 \rangle - \langle x_n, x_0 \rangle - \overline{\langle x_n, x_0 \rangle} = \\ &= [\langle x_n, x_n \rangle - \langle x_0, x_0 \rangle] - [\overline{\langle x_n, x_0 \rangle} - \langle x_0, x_0 \rangle] \rightarrow 0, \end{aligned}$$

ya'ni $\|x_n - x_0\| \rightarrow 0$.

6.4.11. ℓ_2 fazo birlik sferasining kuchsiz yaqinlashish ma'nosida yopig'ini toping.

Yechimi. ℓ_2 fazo birlik sharidan ixtiyoriy $x_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots)$ nuqta olib, ushbu

$$x_1 = (\alpha_1, \sqrt{1 - \alpha_1^2}, 0, 0, \dots),$$

$$x_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \sqrt{1 - \sum_{i=1}^2 \alpha_i^2}, 0, 0, \dots),$$

.....

$$x_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n, \sqrt{1 - \sum_{i=1}^n \alpha_i^2}, 0, 0, \dots)$$

.....

ketma-ketlikni qarayiniz. Bu ketma-ketlikning barcha hadlari birlik sferaga tegishli va x_0 nuqtaga kuchsiz yaqinlashadi. Demak, ℓ_2 fazo birlik sferasining kuchsiz yaqinlashish ma'nosida yopig'i birlik shardan iborat.

6.4.12. H Hilbert fazosi, $x_n, x, y_n, y \in H$ bo'lsin. Agar $x_n \xrightarrow{w} x$ va $y_n \xrightarrow{||\cdot||} y$ bo'lsa, u holda

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$$

ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Quyidagi yozaylik:

$$\begin{aligned} \langle x_n, y_n \rangle &= \langle x_n - x, y_n - y \rangle + \\ &+ \langle x_n - x, y \rangle + \langle x, y_n - y \rangle. \end{aligned}$$

$x_n \xrightarrow{w} x$ ekanligidan, $\|x_n\| \leq M$, $\|x\| \leq M$, bunda $M > 0$. Bundan

$$|\langle x_n - x, y_n - y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y_n - y\| \leq 2M \|y_n - y\| \rightarrow 0,$$

$$|\langle x, y_n - y \rangle| \leq M \|y_n - y\| \rightarrow 0,$$

va $| \langle x_n - x, y \rangle | \rightarrow 0$.

Demak,

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle.$$

6.4.13. ℓ_2 da chegaralangan ketma-ketlik koordinatalar bo'yicha yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda bu ketma-ketlik kuchsiz yaqinlashuvchi bo'tadi.

Yechimi. ℓ_2 fazoda chegaralangan $\{x_k\}$ ketma-ketlik x elementiga kuchsiz yaqinlashuvchi bo'lishi uchun

$$\langle x_k, e_i \rangle = x_k^{(i)} \rightarrow x^{(i)} = \langle x, e_i \rangle, i = 1, 2, \dots$$

bu yerda $e_1 = (1, 0, \dots)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots)$, ..., bajarilishi yetarlidir.

Haqiqatan, e_i elementlarning chiziqli kombinatsiyasi ℓ_2 fazoda zinch. Demak, ℓ_2 da $\{x_k\}$ chegaralangan ketma-ketlik kuchsiz yaqinlashuvchiligi, ushbu vektorning $x_k^{(i)}$ koordinatalar bo'yicha sonli ketma-ketliklarning har bir $i = 1, 2, \dots$ uchun yaqinlashuvchi ekanligiga teng kuchi.

6.4.14. ℓ_2 fazoda kuchsiz yaqinlashish kuchli yaqinlashish bilan ustma-ust tushadimi?

Yechimi. ℓ_2 fazoda $e_1, e_2, \dots, e_n, \dots$ ketma-ketliklar nolga kuchsiz yaqinlashishini ko'rsatamiz.

ℓ_2 da intiyoriy chiziqli f funksionalni skalar ko'paytma ko'rinishda yozamiz: $f(x) = \langle x, a \rangle$, $x \in \ell_2$ taymlangan vektor. Bundan $f(e_n) = a_n$ va $a_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, u holda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(e_n) = 0.$$

$\|e_n\| = 1$ dan $\{e_n\}$ ketma-ketligi nolga kuchli yaqinlashuvchi emas.

Mustaqil ish uchun masalalar

- $C[0, 1]$ fazosida kuchsiz yaqinlashuvchi bo'llib, norma bo'yieha uzoqlashuvchi ketma-ketlikka misol keltiring.
- Ixtiyoriy Hilbert fazosi kuchsiz topologiyada to'la bo'ladi mi?
- $f_n(t) = \sin t$, $t \in [-\pi, \pi]$ funksional ketma-ketlik $L_2[-\pi, \pi]$ kuchsiz yaqinlashuvchi bo'llib, norma bo'yicha uzoqlashuvchi ekanligini isbotlang.
- X Banax fazosi, $\{x_n\} \subset X$, $\|x_n\| \leq 1$. Agar $x_n \xrightarrow{w} x$ bo'lsa, u holda $\|x\| < 1$ ekanligini ko'rsating.

5. H Hilbert fazosi, $x_n, x, y_n, y \in H$ bo'lsin. Agar $x_n \xrightarrow{w} x$ va $y_n \xrightarrow{w} y$ bo'lsa, u holda

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$$

o'tinlimi?

6. $\{x_n\} \subset C[0, 1]$ ketma-ketligi $[0, 1]$ ning har bir nuqtasida yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda bu ketma-ketlik kuchsiz yaqinlashuvchi bo'ladi mi?

7. $C[a, b]$ fazoda $\cos(nt)$ ketma-ketligi kuchsiz yaqinlashuvchi bo'ladi mi?

8. $C[0, 1]$ fazosi kuchsiz to'la bo'ladi mi?

9. Aytaylik, $\{x_n\} H$ Hilbert fazosida ortogonal sistema bo'lsin. Quyidagi tasdiqlarning ozaro teng kuchli ekanligini ko'rsating:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ qator yaqinlashuvchi;

b) $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ qator kuchsiz yaqinlashuvchi;

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2$ qator yaqinlashuvchi.

10. Banax fazosidagi kuchsiz yaqinlashuvchi fundamentalligini ko'rsating.

11. ℓ_2 fazoning birlik shari kuchsiz topologiyada kompakt ekanligini isbotlang.

VII BOB

Chiziqli operatorlar fazosi

7.1. Chiziqli operatorlar fazosi

X normalangan fazoni Y normalangan fazoga akslantiruvchi barcha chegaralangan chiziqli operatorlar to‘plamini $B(X, Y)$ kabi belgilaymiz. Agar $X = Y$ bo‘lsa, u holda $B(X)$ kabi belgilanadi.

$T, S \in B(X, Y)$ operatorlar uchun ularning yig‘indisi $T + S$ deb

$$(T + S)(x) = T(x) + S(x), x \in X$$

formula orqali aniqlangan operatorga aytildi.

$T \in B(X, Y)$ operatori va $\lambda \in \mathbb{C}$ soni ko‘paytmasi λT deb

$$(\lambda T)(x) = \lambda T(x), x \in X$$

formula orqali aniqlangan operatorga aytildi. Ravshanki, $T + S$, λT operatorlar ham chiziqli operatorlar bo‘ladi.

Uzluksiz chiziqli operatorlarning yig‘indisi va uzluksiz chiziqli operatorning songa ko‘paytmasi, uzluksiz operator bo‘lishi normalangan fazolarda amallarning uzluksizligidan kelib chiqadi. Demak, $B(X, Y)$ chiziqli fazo bo‘ladi.

Eslatib o‘tamiz, $T \in B(X, Y)$ operator normasi

$$\|T\| = \sup\{\|T(x)\| : x \in X, \|x\| \leq 1\}$$

formula orqali aniqlanadi.

Qo‘sish, songa ko‘paytirish va normaga nisbatan $B(X, Y)$ normalangan fazo bo‘ladi.

H Hilbert fazosi bo‘lsin. $B(H)$ fazoda har bir $x, y \in X$ uchun

$$A \in B(H) \rightarrow |\langle A(x), y \rangle| \tag{7.1}$$

formula yarim normani aniqlaydi. (7.1) korinishdagi yarim normalar $B(H)$ fazoda hosil etgan lokal qavariq topologiyaga *kuchsiz topologiya* (w -topologiya) deyiladi. Bu topologiyada yaqinlashishga kuchsiz yaqinlashish deyiladi va u $A_n \xrightarrow{w} A$ kabi belgilanadi. Kuchsiz topologiya ta’rifidan,

$$A_n \xrightarrow{w} A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \langle A_n(x), y \rangle = \langle A(x), y \rangle, \forall x, y \in H$$

ekanligi bevosita ko'rinadi.

$B(H)$ fazoda har bir $x \in X$ uchun

$$A \in B(H) \rightarrow \|A(x)\| \quad (7.2)$$

formula yarim normani aniqlaydi. (7.2) ko'rinishdagi yarim normalar $B(H)$ fazoda hosil etgan lokal qavariq topologiyaga *kuchli topologiya* (*s-topologiya*) deyiladi.

Bu topologiyada yaqinlashishga kuchli yaqinlashish deyiladi va u $A_n \xrightarrow{s} A$ kabi belgilanadi. Kuchli topologiya ta'rifidan,

$$A_n \xrightarrow{s} A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(x) = A(x), \forall x \in H$$

ekanligi bevosita ko'rinadi.

$B(H)$ fazoda

$$A \in B(H) \rightarrow \|A\| \quad (7.3)$$

formula normani aniqlaydi. (7.3) korinishdagi norma $B(H)$ fazoda hosil etgan lokal qavariq topologiyaga *tekis topologiya* (*r-topologiya*) deyiladi.

Bu topologiyada yaqinlashishga tekis yaqinlashish deyiladi va u $A_n \Rightarrow A$ kabi belgilanadi. Tekis topologiya ta'rifidan,

$$A_n \Rightarrow A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n - A\| \rightarrow 0$$

ekanligi bevosita ko'rinadi.

Aytaylik, L biror H Hilbert fazosining qism fazosi bo'lsim. $H = L \oplus L^\perp$ tenglididan har bir $x \in H$ vektori yagona ravishda $x = y + z$ ko'rinishda yoziladi, bunda $y \in L$, $z \in L^\perp$. $P : H \rightarrow H$ operatori har bir $x \in H$ vektoriga uning L qism fazosiga proeksiyasi bo'lgan y vektorini mos qo'ysim. Bu chiziqli operator L qism fazoga *proektor* deyiladi.

P_1, P_2 proektorlar uchun $P_1 P_2 = 0$ bo'lsa, P_1 va P_2 proektorlar *ortogonal* deyiladi va $P_1 \perp P_2$ kabi yoziladi.

Masalalar

7.1.1. Agar X normalangan fazo, Y esa Banax fazosi bo'lsa, u holda $B(X, Y)$ Banax fazosi ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset B(X, Y)$ fazosining xohlagan fundamental ketma-ketligi bo'lsin. U holda ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday n_ε soni topilib, barcha $n, m \geq n_\varepsilon$ sonlar uchun

$$\|T_m - T_n\| < \varepsilon$$

tengsizligi o‘rinli bo‘ladi. Natijada, X fazosining xohlagan x nuqtasi uchun

$$\|T_m(x) - T_n(x)\| \leq \|T_m - T_n\| \|x\| < \varepsilon \|x\|,$$

ya’ni

$$\|T_m(x) - T_n(x)\| \leq \varepsilon \|x\| \quad (7.4)$$

tengsizligiga ega bo‘lamiz. Bundan $\{T_n(x)\}$ ketma-ketlikning Y fazoda fundamental ekanligi kelib chiqadi. Y to‘la bo‘lganligidan, $\{T_n(x)\}$ bu fazoda yaqinlashuvchi bo‘ladi. Aytaylik,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = T(x)$$

bo‘lsin. Har bir $x_1, x_2 \in X$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ uchun

$$\begin{aligned} T(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda_1 T_n(x_1) + \lambda_2 T_n(x_2)) = \lambda_1 T(x_1) + \lambda_2 T(x_2). \end{aligned}$$

Demak, T chiziqli operator bo‘ladi.

Endi (7.4) tengsizligida $m \rightarrow \infty$ bo‘yicha limitga o‘tsak,

$$\|T(x) - T_n(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$$

tengsizligiga ega bo‘lamiz. Natijada, $T - T_n$ operatorning $B(X, Y)$ fazosiga tegishli ekanligi kelib chiqadi. U holda $T = (T - T_n) + T_n$ operatori ham $B(X, Y)$ fazosiga tegishli. Shu bilan birga,

$$\|T(x) - T_n(x)\| \leq \varepsilon \|x\|$$

ekanlididan, $\|T - T_n\| \leq \varepsilon$ tengsizligiga ega bo‘lamiz. Shu sababli $T_n \Rightarrow T$. Demak, $B(X, Y)$ Banax fazosi bo‘ladi.

7.1.2. \mathbb{F}^n fazoni \mathbb{F}^m fazoga akslantiruvchi chiziqli operatorlarning umumiyl ko‘rinishini toping, bunda $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ yoki \mathbb{C} .

Yechimi. Aytaylik, $\{e_1, \dots, e_n\}$ sistema \mathbb{F}^n fazoning bazisi, $\{f_1, \dots, f_m\}$ esa \mathbb{F}^m fazoning bazisi va $A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ chiziqli operator bo‘lsm. Agar $x = (x_j) \in \mathbb{R}^n$ bo‘lsa, u holda

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$$

va A operatorning chiziqli ekanligidan,

$$A(x) = \sum_{j=1}^n x_j A(e_j).$$

Demak, A operatori $\{e_1, \dots, e_n\}$ bazisdagı qiymatlari orqali to'liq aniqlanadi. Har bir $A(e_j)$ vektorning $\{f_1, \dots, f_m\}$ bazisi bo'yicha

$$A(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i$$

yoyilmasini olainiz. Bundan

$$A(x) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i,$$

ya'ni

$$A(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j f_i.$$

Demak, A operatori (a_{ji}) matrisa orqali to'liq aniqlanadi.

Bunda $x = (x_1, \dots, x_n)$ vektor qiymati quyidagicha topiladi:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} x_i \\ \sum_{i=1}^n a_{2i} x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} x_i \end{pmatrix}.$$

7.1.3. \mathbb{R}^n fazosida $\|x\| = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$ normasi qaralib, $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ operatori $\{a_{ij}\}_{1 \leq i,j \leq n}$ matrisa bilan aniqlansa, u holda

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (7.5)$$

ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = A(x)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ bo'lsin. U holda har bir $i \in \overline{1, n}$ uchun

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j.$$

Demak,

$$|y_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \leq$$

$$\leq \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \max_{1 \leq k \leq n} |x_k| = \|x\| \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

ya'ni

$$\|y\| \leq \|x\| \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \quad (7.6)$$

Faraz qilaylik, $\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ ifoda maksimunga $i = i_0$ da erishsin.

Koordinatalari $x_j = \text{sign}(a_{i_0 j})$, $j = \overline{1, n}$ bo'lgan x nuqtani olaylik. U holda $y = A(x)$ uchun

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0 j}| = \sum_{j=1}^n a_{i_0 j} x_j = y_{i_0} = |y_{i_0}| \leq \|y\|,$$

ya'ni

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \leq \|y\|. \quad (7.7)$$

Endi (7.6) va (7.7) tengsizliklardan, (7.5) tenglik kelib chiqadi.

7.1.4. E Banax fazosi va $T \in B(E)$ bo'lsin. Agar $\|T\| < 1$ bo'lsa, u holda $(I - T)^{-1} \in B(E)$ va

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$$

ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x \in E$ bo'lsin. $\|T\| < 1$ bo'lganligidan, $S_n = \sum_{k=0}^n T^k$ uchun $m > n$ da

$$\begin{aligned} \|S_m(x) - S_n(x)\| &= \left\| \sum_{k=0}^n T^m(x) - \sum_{k=0}^n T^k(x) \right\| = \\ &= \left\| \sum_{k=n+1}^m T^k(x) \right\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|T^k(x)\| \leq \left(\sum_{k=n+1}^m \|T\|^k \right) \|x\| \leq \\ &\leq \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} \|T\|^k \right) \|x\| = \frac{\|T\|^{n+1}}{1 - \|T\|} \|x\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Demak, $\{S_n(x)\}$ ketma-ketligi E fazoda fundamental, $y = A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ deylik. U holda

$$\|A(x) - S_n(x)\| \leq \frac{\|T\|^{n+1}}{1 - \|T\|} \|x\|$$

ekanligidan, $A - S_n \in B(E)$. Endi $\|A - S_n\| \leq \frac{\|T\|^{n+1}}{1 - \|T\|}$ ekanligidan,

$n \rightarrow \infty$ bo'lganda, $\sum_{k=0}^n T^k \Rightarrow A$ kelib chiqadi.

Endi $A = (I - T)^{-1}$ ekanligini ko'rsatamiz. Har bir $x \in E$ uchun

$$\begin{aligned} ((I - T)A)(x) &= (I - T) \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} ((I - T)(I + T + T^2 + \dots + T^n))(x) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (I - T^{n+1})(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - T^{n+1}(x)). \end{aligned}$$

Endi $\|T^{n+1}(x)\| \leq \|T\|^{n+1} \|x\| \rightarrow 0$ ekanligidan, $\lim_{n \rightarrow \infty} T^{n+1}(x) \rightarrow 0$,

Bundan $((I - T)A)(x) = x$. Xuddi shunday, $(A(I - T))(x) = x$. Demak, $A = (I - T)^{-1}$.

7.1.5. *E Banax fazosida aniqlangan A, B chegaralangan chiziqli operatorlar uchun*

$$(A + B)^* = A^* + B^*$$

tenglik o'rinali ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x \in E, g \in E^*$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \langle (A + B)^*(g), x \rangle &= \langle g, A(x) + B(x) \rangle = \langle g, A(x) \rangle + \langle g, B(x) \rangle = \\ &= \langle A^*(g), x \rangle + \langle B^*(g), x \rangle = \langle A^*(g) + B^*(g), x \rangle, \end{aligned}$$

ya'ni

$$\langle (A + B)^*(g), x \rangle = \langle A^*(g) + B^*(g), x \rangle.$$

Bu tenglik barcha $x \in E$ uchun o'rinali ekanligidan,

$$(A + B)^*(g) = A^*(g) + B^*(g),$$

ya'ni

$$(A + B)^* = A^* + B^*.$$

7.1.6. *E Banax fazosida aniqlangan A chegaralangan chiziqli operator va $\lambda \in \mathbb{C}$ soni uchun*

$$(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*$$

tenglik o'rini ekanligini ko'sating.

Yechimi. $x \in E, g \in E^*$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned}\langle (\lambda A)^*(g), x \rangle &= \langle g, \lambda A(x) \rangle = \bar{\lambda} \langle g, A(x) \rangle = \\ &= \bar{\lambda} \langle A^*(g), x \rangle = \langle \bar{\lambda} A^*(g), x \rangle,\end{aligned}$$

ya'ni

$$\langle (\lambda A)^*(g), x \rangle = \langle \bar{\lambda} A^*(g), x \rangle.$$

Bu tenglik barcha $x \in E$ uchun o'rini ekanligidan,

$$(\lambda A)^*(g) = \bar{\lambda} A^*(g),$$

ya'ni

$$(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*.$$

7.1.7. *E, F Banax fazolari va $A : E \rightarrow F$ chegaralangan chiziqli operator bo'lsa, u holda $\|A^*\| = \|A\|$ tenglik o'rini ekanligini ko'sating.*

Yechimi. $x \in E, g \in F^*$ bo'lsin. U holda

$$|\langle A^*(g), x \rangle| = |\langle g, A(x) \rangle| \leq \|g\| \|A(x)\| \leq \|g\| \|A\| \|x\|,$$

ya'ni

$$|\langle A^*(g), x \rangle| \leq \|g\| \|A\| \|x\|.$$

Demak, $\|A^*(g)\| \leq \|g\| \|A\|$, ya'ni $\|A^*\| \leq \|A\|$.

Endi $x \in E$ va $A(x) \neq 0$ bo'lsin. $y_0 = \frac{A(x)}{\|A(x)\|}$ deylik. U holda $\|y_0\| = 1$. 6.3.10-misoldan shunday $g \in F^*$ mavjud bo'lib, $\|g\| = 1$ va $g(y_0) = 1$, ya'ni $\langle g, A(x) \rangle = \|A(x)\|$. Bundan

$$\begin{aligned}\|A(x)\| &= \langle g, A(x) \rangle = \langle A^*(g), x \rangle \leq \\ &\leq \|A^*(g)\| \|x\| \leq \|A^*\| \|g\| \|x\| = \|A^*\| \|x\|,\end{aligned}$$

ya'ni $\|A(x)\| \leq \|A^*\| \|x\|$. Demak, $\|A\| \leq \|A^*\|$ va $\|A\| = \|A^*\|$.

7.1.8. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ operatori

$$A_n(x) = \left(\frac{\xi_1}{n}, \frac{\xi_2}{n}, \dots, \frac{\xi_n}{n}, 0, 0, \dots \right), x = (\xi_k) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlansa, u holda $\{A_n\}$ ketma-ketlikning nol operatoriga tekis yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. $x \in \ell_2$ uchun

$$\|A_n(x)\|^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 = \frac{1}{n^2} \|x\|^2$$

ekanligidan,

$$\|A_n\| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Bundan $\{A_n\}$ ketma-ketlik nol operatoriga tekis yaqinlashadi.

7.1.9. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$(A_n(x))(t) = t^n(1-t)x(t), t \in [0, 1]$$

formula bilan aniqlansa, u holda $\{A_n\}$ ketma-ketlikning nol operatoriga tekis yaqinlashishini ko'rsating.

Yechimi. $x \in C[0, 1]$ uchun

$$\begin{aligned} \|A_n(x)\| &= \max_{t \in [0, 1]} |t^n(1-t)x(t)| \leq \\ &\leq \max_{t \in [0, 1]} |t^n(1-t)| \|x\| = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \|x\|. \end{aligned}$$

Bundan

$$\|A_n\| \leq \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

Bundan $\{A_n\}$ ketma-ketlik nol operatoriga tekis yaqinlashadi.

7.1.10. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ operatori

$$A_n(x) = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, 0, 0, \dots), x = (\xi_k) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlansa, u holda $\{A_n\}$ ketma-ketlikning birlik operatoriga kuchli yaqinlashib, tekis yaqinlashuvchi emasligini ko'rsating.

Yechimi. $x = (\xi_k) \in \ell_2$ uchun

$$\|A_n(x) - x\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2 \rightarrow 0$$

ekanligidan,

$$A_n \xrightarrow{*} I.$$

Endi har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $e_{n+1} = (\underbrace{0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \in \ell_2$ vektorini olsak,

u holda $\|e_{n+1}\| = 1$. Bundan

$$\|A_n(e_{n+1}) - e_{n+1}\| = \|(0 - e_{n+1})\| = 1.$$

Demak,

$$\|A_n - I\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|A_n(x) - x\| \geq \|A_n(e_{n+1}) - e_{n+1}\| = 1$$

bo'lganligidan, $\{A_n\}$ ketina-ketligi birlik operatoriga tekis yaqinlashuvchi emas.

7.1.11. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ operatori

$$A_n(x) = (0, 0, \dots, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots), x = (\xi_k) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlansa, u holda $A_n \xrightarrow{s} 0$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x = (\xi_k) \in \ell_2$ uchun

$$\|A_n(x)\|^2 = \|(0, 0, \dots, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots)\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2.$$

$x = (\xi_k) \in \ell_2$ ekanligidan, $\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 < \infty$, bundan $\sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2 \rightarrow 0$.

Demak,

$$\|A_n(x)\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^2 \rightarrow 0,$$

ya'ni $A_n \xrightarrow{s} 0$.

7.1.12. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ operatori

$$A_n(x) = (0, 0, \dots, \xi_1, \xi_2, \dots), x = (\xi_k) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlansa, u holda $A_n \xrightarrow{w} 0$ ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x = (\xi_k)$, $y = (t_k) \in \ell_2$ uchun

$$\langle A_n(x), y \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_{k+n} t_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} \xi_{k+n}^2 \sum_{k=1}^{\infty} t_k^2.$$

$x = (\xi_k) \in \ell_2$ ekanligidan, $\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2 < \infty$, bundan $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_{k+n}|^2 \rightarrow 0$.

Demak,

$$\langle A_n(x), y \rangle \rightarrow 0,$$

ya'ni $A_n \xrightarrow{w} 0$.

7.1.13. Har bir $n \in \mathbb{N}$ uchun $A_n : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$(A_n(x))(t) = n \int_t^{t+\frac{1}{n}} x(s) ds, t \in [0, 1]$$

formula bilan aniqlansa, u holda $\{A_n\}$ ketma-ketlikning birlik operatoriga kuchli yaqinlashib, tekis yaqinlashuvchi emasligini ko'rsating.

Yechimi. $x \in C[0, 1]$ uchun Φ boshlang'ich funksiya bo'lsa, u holda

$$n \int_t^{t+\frac{1}{n}} x(s) = \Phi(s)|_t^{t+\frac{1}{n}} = \frac{\Phi(t + \frac{1}{n}) - \Phi(t)}{\frac{1}{n}} \rightarrow \Phi'(t) = x(t),$$

ya'ni

$$A_n(x) \rightarrow x.$$

Bundan $\{A_n\}$ ketma-ketlikning birlik operatoriga kuchli yaqinlashadi.

Endi $x_n(t) = t^{n-1}$, $n \geq 2$ bo'lsin. U holda

$$\|x_n\| = \max_{0 \leq t \leq 1} |t^{n-1}| = \max_{0 \leq t \leq 1} t^{n-1} = 1,$$

ya'ni $\|x_n\| = 1$.

Endi

$$\begin{aligned} \|A_n(x_n) - x_n\| &= \max_{0 \leq t \leq 1} \left| n \int_t^{t+\frac{1}{n}} s^{n-1} ds - s^{n-1} \right| = \max_{0 \leq t \leq 1} |s^n|_t^{t+\frac{1}{n}} - s^{n-1}| = \\ &= \max_{0 \leq t \leq 1} \left| \left(t + \frac{1}{n} \right)^n - t^n - t^{n-1} \right| = \\ &= \max_{0 \leq t \leq 1} \left| t^n + t^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2n^2} t^{n-2} + \dots + \frac{1}{n^2} - t^n - t^{n-1} \right| \geq \\ &\geq \frac{n(n-1)}{2n^2} \max_{0 \leq t \leq 1} |t^{n-2}| = \frac{n(n-1)}{2n^2} \geq \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Demak,

$$\|A_n - I\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|A_n(x) - x\| \geq \|A_n(x_n) - x_n\| \geq \frac{1}{4}.$$

Bundan $\{A_n\}$ ketma-ketligi birlik operatoriga tekis yaqinlashuvchi emas.

7.1.14. $\varphi \in C[0, 1]$ bo'lsin. $T_\varphi : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ operatori

$$T_\varphi(f)(t) = \varphi(t)f(t), \quad f \in L^2[0, 1]$$

formula bilan aniqlanadi. $T_\varphi^ = T_{\bar{\varphi}}$ tengligini isbotlang.*

Yechimi. Har bir $f, g \in L^2[0, 1]$ uchun

$$\begin{aligned}\langle f, T_\varphi^*(g) \rangle &= \langle T_\varphi(f), g \rangle = \int_0^1 \varphi(t) f(t) \overline{g(t)} dt = \\ &= \int_0^1 f(t) \overline{\varphi(t) g(t)} dt = \langle f, \overline{\varphi}g \rangle = \langle f, T_{\overline{\varphi}}(g) \rangle,\end{aligned}$$

ya'ni

$$\langle f, T_\varphi^*(g) \rangle = \langle f, T_{\overline{\varphi}}(g) \rangle.$$

Bundan $T_\varphi^*(g) = T_{\overline{\varphi}}(g)$, ya'ni $T_\varphi^* = T_{\overline{\varphi}}$.

7.1.15. H Hilbert fazosi va $T \in B(H)$ bo'lsin. U holda

$$\ker T^* = R(T)^\perp$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. Aytaylik, $x \in \ker T^*$ bo'lsin, ya'ni $T^*(x) = 0$. Ixtiyoriy $z \in R(T)^\perp$ nuqtani olaylik. U holda shunday $y \in H$ topiladiki, $T(y) = z$. Bundan

$$\langle z, x \rangle = \langle T(y), x \rangle = \langle y, T^*(x) \rangle = \langle y, 0 \rangle = 0,$$

ya'ni ixtiyoriy $z \in R(T)$ uchun $\langle z, x \rangle = 0$. Demak, $x \in R(T)^\perp$, ya'ni $\ker T^* \subset R(T)^*$.

Endi $z \in R(T)^\perp$ bo'lsin, ya'ni ixtiyoriy $y \in H$ uchun $\langle z, T(y) \rangle = 0$. Bundan

$$\langle T^*(z), y \rangle = \langle z, T(y) \rangle = 0,$$

ya'ni $T^*(z) \perp y$. Bundan $T^*(z) = 0$, ya'ni $z \in \ker T^*$. Demak, $\ker T^* = R(T)^\perp$.

7.1.16. $P : H \rightarrow H$ proektor chegaralangan operator bo'lib, $P \neq 0$ bo'lganda $\|P\| = 1$ ekanligini isbotlang.

Yechimi. $P : H \rightarrow H$ biror L qism fazoga proektor va $x \in H$ bo'lsin. U holda $x = y + z$, bunda $y \in L$, $z \in L^\perp$. Pifagor teoremasidan, $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$, ya'ni $\|y\| \leq \|x\|$. Bundan $\|P(x)\| = \|y\| \leq \|x\|$, ya'ni $\|P\| \leq 1$.

Agar $P \neq 0$ bo'lsa, u holda $0 \neq x \in L$ uchun $\|P(x)\| = \|x\|$. Bundan $\|P\| = 1$.

7.1.17. $P \in B(H)$ proektor bo'lishi uchun $P^2 = P^* = P$ bajarilishi zarur va yetarli.

Yechimi. $P : H \rightarrow H$ biror L qism fazoga proektor va $x \in H$ bo'lsin. U holda $x = y + z$, bunda $y \in L$, $z \in L^\perp$.

$$P^2(x) = P(P(x)) = P(y) = y = P(x),$$

ya'ni $P^2 = P$. Bundan $\|P(x)\| = \|y\| \leq \|x\|$, ya'ni $\|P\| \leq 1$.

Endi $x_1 = y_1 + z_1$, $y_1 \in L$, $z_1 \in L^\perp$ bo'lsin. U holda

$$\langle x, P^*(x_1) \rangle = \langle P(x), x_1 \rangle = \langle y, y_1 + z_1 \rangle = \langle y, y_1 \rangle + \langle y, z_1 \rangle =$$

$$= \langle y, y_1 \rangle + \langle z, x_1 \rangle = \langle y + z, x_1 \rangle = \langle x, P(x_1) \rangle,$$

ya'ni $\langle x, P^*(x_1) \rangle = \langle x, P(x_1) \rangle$. Bundan $P^* = P$.

Aksincha, $P^2 = P^* = P$ bo'lsin. $L = \{P(x) : x \in H\}$ yopiq qism fazodir. Haqiqatan, $x_n \in L$, $x_n \rightarrow x$ bo'lsa, u holda

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} P(x_n) = P(x),$$

ya'ni $x \in L$. P operatorining L qism fazoga proektor ekanligini ko'rsatamiz. $x = P(x) + (I - P)(x)$, $P(x) \in L$ bo'lganligidan, $(I - P)(x) \in L^\perp$ ekanligini ko'rsatish yetarli. $y \in L$ vektori uchun

$$\langle (I - P)(x), y \rangle = \langle (I - P)(x), P(y) \rangle =$$

$$= \langle P^*((I - P)(x)), y \rangle = \langle P((I - P)(x)), y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0,$$

ya'ni $(I - P)(x) \in L^\perp$.

7.1.18. $\Phi : B(X, Y) \rightarrow \mathbb{R}$, $\Phi(A) = \|A\|$ akslantirishning uzlusiz ekanligini isbotlang.

Yechimi. Xohlagan $\varepsilon > 0$ son olaylik. Agar $B(X, Y)$ fazosiga tegishli A' , A'' operatorlar uchun $\|A' - A''\| < \varepsilon$ bo'lsa, u holda

$$|\Phi(A') - \Phi(A'')| = \||A'| - |A''|\| \leq \|A' - A''\| < \varepsilon.$$

Bundan berilgan akslantirishning $B(X, Y)$ da uzlusiz ekanligi kelib chiqadi.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. Har bir $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in \ell_2$ uchun

$$T(x) = (0, 2x_1, x_2, 2x_3, x_4, \dots)$$

deylik. U holda

- a) har bir $x \in \ell_2$ uchun $T(x) \in \ell_2$ ekanligini ko'rsating;
- b) $T : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ chegaralangan operator ekanligini ko'rsating;

- c) $\|T\|$ normasini toping;
- d) har bir $x \in \ell_2$ uchun $T(x)^2$ ni toping;
- e) $\|T^2\|$ ni $\|T\|^2$ bilan taqqoslang.

2. X chiziqli fazo va $A : X \rightarrow X$ chiziqli operator uchun shunday $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ sonlari topilib, $I + \lambda_1 A + \lambda_2 A + \dots + \lambda_n A^n = 0$ bo'lsa, u holda A^{-1} mavjud ekanligini ko'rsating.

3. P va Q proektorlar bo'lsin. $P - Q$ proektor bo'lishi uchun $PQ = QP = Q$ tengligi bajarilishi zarur va yetarliligini isbotlang.

4. P va Q proektorlar bo'lsin. $P + Q$ proektor bo'lishi uchun $PQ = QP = 0$ tengligi bajarilishi zarur va yetarliligini isbotlang.

5. P va Q proektorlar bo'lsin. Agar $PQ = QP$ bo'lsa, u holda $P + Q - PQ$ proektor ekanligini isbotlang.

6. X Banax fazosi bo'lsin. $TS - ST = I$ tengligini qanoatlantiruvchi $T, S \in B(X)$ mavjud emasligini ko'rsating.

7. X Banax fazosi bo'lsin. Agar $T \in B(X)$ izometriya bo'lsa, u holda T^* izometriya ekanligini korsating.

8. X Banax fazosi bo'lsin. $\|AB\| < \|A\|\|B\|$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi $A, B \in B(X)$ operatorlarga misol keltiring.

9. Agar P va Q Hilbert fazosidagi proektorlar bo'lsa, $\|P - Q\| \leq 1$ ekanligini isbotlang.

10. X Banax fazosi, A, B esa Y Banax fazosi qism fazolari bo'lib, $Y = A \oplus B$. U holda $B(X, Y) = B(X, A) \oplus B(X, B)$ ekanligini isbotlang.

7.2. Chiziqli operatorlar spektri

E Banax fazosi, $T \in B(E)$ va $\lambda \in \mathbb{C}$ bo'lsin. U holda $\lambda I - T$ operatorning yadrosi uchun quyidagi hollar o'rinni:

a) agar $\lambda I - T$ operatorning yadrosi noldan farqli bo'lsa, ya'ni $T(x) = \lambda x$ tenglama noldan farqli x_0 yechimga ega bo'lsa, u holda λ soni T operatorining *xos soni*, x_0 vektori esa *xos vektori* deyiladi.

$\lambda I - T$ operatorning yadrosi nol bo'lsa, u holda $(\lambda I - T)^{-1}$ mavjud va bu hol ikkitaga ajraladi:

b) $(\lambda I - T)^{-1}$ operatori aniqlangan, lekin chegaralaumagan;

c) $(\lambda I - T)^{-1}$ operatorining aniqlanish sohasi butun E fazosiga teng. Bu holda teskari operator haqida Banax teoremasidan, $(\lambda I - T)^{-1}$ operatori chegaralangandir.

Agar $\lambda \in \mathbb{C}$ uchun a) yoki b) shartlar bajarilsa, ya'ni $\lambda I - T$ teskari chegaralangan operator mavjud bo'lmasa, u holda $\lambda \in \mathbb{C}$ soni T operatorining *spektriga* tegishli deyiladi. Spektr $sp(T)$ kabi belgilanadi.

Agar $\lambda \in \mathbb{C}$ uchun c) shatri bajarilsa, ya'ni $\lambda I - T$ teskarı chegaralangan operator mavjud bo'lsa, u holda $\lambda \in \mathbb{C}$ soni T operatorining *resolventasiga* tegishli deyiladi. Resolventa $res(T)$ kabi belgilanadi.

Masalalar

7.2.1. *E Banax fazosi va $T : E \rightarrow E$ chegaralangan chiziqli operator bo'lsa, u holda*

$$sp(T) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|T\|\}$$

ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $|\lambda| > \|T\|$ bo'lsin.

$$\lambda I - T = \lambda \left(I - \frac{T}{\lambda} \right),$$

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| < 1$$

tensizliklardan va 7.1.4-misoldan $(\lambda I - T)^{-1} \in B(E)$ ekanligi kelib chiqadi. Bundan $\lambda \in res(T)$. Demak,

$$sp(T) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|T\|\}.$$

7.2.2. *E Banax fazosi va $T : E \rightarrow E$ chegaralangan chiziqli operator bo'lsa, u holda $sp(T)$ yopiq to'plam ekanligini isbotlang.*

Yechimi. $res(T) = \mathbb{C} \setminus sp(T)$ to'plamning ochiq to'plam ekanligini isbotlash yetarli. Aytaylik, $\lambda \in res(T)$ va $|\xi - \lambda| < \|(\lambda I - T)^{-1}\|$ bo'lsin.

$$\|(\xi - \lambda)(\lambda I - T)^{-1}\| = |\xi - \lambda| \|(\lambda I - T)^{-1}\| < 1$$

tensizlikdan va

$$\xi I - T = (\lambda I - T)[I + (\xi - \lambda)(\lambda I - T)^{-1}]$$

munosabatdan $\xi \in res(T)$ kelib chiqadi. Demak, $res(T)$ to'plamning har bir λ nuqtasi o'zining $\|(\lambda I - T)^{-1}\|$ atrofi bilan birga $res(T)$ to'plamga tegishli bo'ladi. Bundan $res(T)$ ochiq to'plamdir.

7.2.3. *E Banax fazosi va $T : E \rightarrow E$ chegaralangan chiziqli operator bo'lsa, u holda $sp(T)$ bo'sh bo'lмаган kompakt to'plam ekanligini ko'rsating.*

Yechimi. 7.2.1-misoldan $sp(T)$ chegaralangan to'plam, 7.2.2-misolga ko'ra \mathbb{C} da yopiq to'plam. Demak, $sp(T)$ kompakt to'plam bo'ladi.

Endi $sp(T)$ to'plamning bo'sh emasligini ko'rsatamiz.

Faraz qilaylik, $sp(T) = \emptyset$, ya'ni $res(T) = \mathbb{C}$ bo'lsin. U holda $|\lambda| > \|T\|$ uchun

$$\|(\lambda I - T)^{-1}\| = \left\| \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{T}{\lambda} \right)^{-1} \right\| = \left\| \frac{1}{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k}{\lambda^k} \right\| = \frac{1}{|\lambda|} \left(I - \frac{\|T\|}{|\lambda|} \right)^{-1}$$

bo'lganligidan,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|(\lambda I - T)^{-1}\| = 0$$

kelib chiqadi. U holda har bir $f \in E^*$ uchun $f((\lambda I - T)^{-1}) = 0$ o'rini. Xan – Banax teoremasidan $(\lambda I - T)^{-1} = 0$. Hosil bo'lgan ziddiyatdan $sp(T) \neq \emptyset$ ekanligi kelib chiqadi.

7.2.4. Agar $A : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ operatori

$$A(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$$

formula orqali aniqlansa, u holda bu operatorning xos sonlarini toping.

Yechimi. A operatori ikki o'lchovli fazoda aniqlangan va uning matritsasi $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Operator xos sonlar unga mos matritsa xos sonlariga teng bo'lib, u

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

tenglama ildizlaridan iborat. Bundan $\lambda^2 - 5 = 0$, ya'ni $\lambda = \pm\sqrt{5}$.

7.2.5. $T : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ chegaralangan chiziqli operatori

$$T(x) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots), \quad x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlanadi.

a) T operator normasini toping;

b) T operatorining xos soni mavjud emasligini isbotlang.

Yechimi. a) Har bir $x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$ uchun $T(x) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots)$ ekanligidan,

$$\|T(x)\| = \sqrt{0^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2 + \dots} = \|x\|,$$

ya'ni $\|T(x)\| = \|x\|$. Bundan $\|T\| = 1$.

b) Faraz qilaylik, $\lambda \in \mathbb{C}$ soni T operatorining xos soni bo'lsin. U holda noldan farqli $x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$ vektori topilib, $T(x) = \lambda x$ tengligi, ya'ni

$$(0, x_1, x_2, x_3, \dots) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4, \dots)$$

tengligi bajariladi. Bundan $\lambda x_1 = 0$ va $i > 1$ bo'lganda $\lambda x_i = x_{i-1}$. Agar $\lambda = 0$ bo'lsa, $\lambda x_i = x_{i-1}$ tengligidan $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = 0$ kelib chiqadi. Agar $\lambda \neq 0$ bo'lsa, $\lambda x_1 = 0$ va $\lambda x_i = x_{i-1}$ tengliklardan $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = 0$ kelib chiqadi, ya'ni $x = 0$. Bu esa $x \neq 0$ ekanligiga zid. Demak, farazimiz noto'g'ri va T operatorining xos soni mavjud emas.

7.2.6. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ chiziqli operatori

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds, \quad x \in C[0, 1]$$

formula bilan aniqlanadi. Uning spektrini toping.

Yechimi. A^n operator darajasini bo'laklab integrallash orqali topamiz:

$$(A^n x)(t) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^t (t-s)^{n-1} x(s) ds.$$

Bundan $\|A^n\| \leq \frac{1}{(n-1)!}$. Demak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n-1)!} \right)^{\frac{1}{n}} = 0$$

bo'lganligidan, A operatori spektral radiusi

$$r(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = 0.$$

Demak, $sp(A) = \{0\}$.

7.2.7. Agar $A, B \in B(E)$ bo'lsa,

$$sp(AB) \cup \{0\} = sp(BA) \cup \{0\}$$

tengligini isbotlang.

Yechimi. Aytaylik, $\lambda \notin sp(AB) \cup \{0\}$ bo'lsm. U holda shunday $C \in B(E)$ mavjud bo'lib,

$$C(\lambda I - AB) = (\lambda I - BA)C = I.$$

Bundan

$$(I + BCA)(\lambda I - BA) = (\lambda I - BA)(I + BCA) = \lambda I.$$

Demak,

$$\frac{1}{\lambda}(I + CBA)^{-1} = \lambda I - BA.$$

Bundan $\lambda \notin sp(BA) \cup \{0\}$.

7.2.8. $C[0, 1]$ fazoda erkli o'zgaruvchiga ko'paytirish operatori berilgan: $Ax(t) = tx(t)$, $x \in C[0, 1]$. A ning spektrini toping.

Yechimi.

$$(\lambda I - A)x(t) = (\lambda - t)x(t)$$

bo'lganligidan, $|\lambda| > 1$ uchun

$$(\lambda I - A)^{-1}x(t) = \frac{1}{\lambda - t}x(t),$$

ya'ni $(\lambda I - A)^{-1}$ chegaralangan operator bo'ladi.

$|\lambda| \leq 1$ da $(\lambda I - A)^{-1}$ chegaralanmagan operator. Bundan $sp(A) = [0, 1]$.

7.2.9. A chegaralangan chiziqli operator. $\alpha, \beta \in res(A)$ uchun

$$R_\alpha - R_\beta = (\alpha - \beta)R_\beta R_\alpha$$

tengligini isbotlang.

Yechimi.

$$A - \alpha I = A - \beta I + (\beta - \alpha)I$$

tengligidan

$$R_\alpha^{-1} = R_\beta^{-1} + (\beta - \alpha)I.$$

Bu tenglikni chapdan R_β ga ko'paytirsak, u holda

$$R_\beta R_\alpha^{-1} = I + (\beta - \alpha)R_\beta.$$

Oxirgi tenglikni o'ngdan R_α ga ko'paytirsak, u holda

$$R_\beta = R_\alpha + (\beta - \alpha)R_\beta R_\alpha.$$

7.2.10. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = \int_0^1 s^2 tx(s) dt$$

kabi aniqlansa, uning noldan farqli xos sonlarini toping.

Yechimi. $\lambda \neq 0$ operatorning xos soni bo'lsin. U holda biror $x \neq 0$ uchun $Ax(t) = \lambda x(t)$. Bunday

$$\int_0^1 s^2 t x(s) ds = \lambda x(t).$$

Agar $c = \int_0^1 s^2 x(s) ds$ deb belgilasak, u holda

$$x(t) = \frac{c}{\lambda} t.$$

Bunday

$$c = \int_0^1 s^2 \frac{c}{\lambda} s ds = \frac{c}{\lambda} \int_0^1 s^3 ds = \frac{c}{4\lambda},$$

ya'ni $\lambda = \frac{1}{4}$ kelib chiqadi.

7.2.11. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = x(0) + tx(1)$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning spektrini toping.

Yechimi. Avval operatorning xos sonlarini topaniiz:

$$x(0) + tx(1) = \lambda x(t). \quad (7.8)$$

Bunday

$$x(t) = \alpha + \beta t$$

ko'rinishga ega. Bu ifodani (7.8) ga qo'ysak, u holda

$$\alpha + (\alpha + \beta) = \lambda \alpha + \lambda \beta t, \quad t \in [0, 1].$$

Endi 1 va t funksiyalarning chiziqli erkli ekanligidan,

$$\begin{cases} (1 - \lambda)\alpha = 0, \\ \alpha + (1 - \lambda)\beta = 0. \end{cases}$$

$x(t)$ noldan farqli xos vektor. Demak, α va β lar bir vaqtida nol bo'la olmaydi. Bunday $\lambda = 1$ xos son ekanligi kelib chiqadi.

$\lambda = 0$ ham xos son ekanini ko'rsatamiz. Bu esa noldan farqli $x(0) = x(1) = 0$ bo'lgan har bir funksiya

$$Ax(t) = 0$$

tenglamani qanoatlantiradi, ya'ni $\lambda = 0$ soni xos sondir.

Endi har bir $\lambda \neq 0, 1$ soni A operatorning resolventasiga tegishli ekanligini ko'rsatamiz.

$y(t) \in C[0, 1]$ uchun

$$(Ax)(t) - \lambda x(t) = y(t) \quad (7.9)$$

tenglamani qaraymiz. $t = 0$ va $t = 1$ qiymatlarda

$$x(0) = \frac{y(0)}{1 - \lambda}, \quad x(1) = \frac{y(1)}{1 - \lambda} - \frac{y(0)}{(1 - \lambda)^2}.$$

Bu qiymatlarni (7.9) ga qo'ysak,

$$x(t) = -\frac{y(t)}{\lambda} + \frac{y(0)}{\lambda(1 - \lambda)} + \frac{ty(1)}{\lambda(1 - \lambda)} - \frac{ty(0)}{(1 - \lambda)^2}.$$

Bundan $\lambda \neq 0, 1$ sonlari $A - \lambda I$ operatoriga teskari operator

$$((A - \lambda I)^{-1}y)(t) = -\frac{y(t)}{\lambda} + \frac{y(0)}{\lambda(1 - \lambda)} + \frac{ty(1)}{\lambda(1 - \lambda)} - \frac{ty(0)}{(1 - \lambda)^2}$$

kabi aniqlanadi va chegaralangandir.

Demak, A operator spektri $\lambda = 0, 1$ sonlardan iborat.

7.2.12. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = x(-t)$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning xos sonlarini toping.

Yechimi. A operatorining xos sonlari

$$Ax = \lambda x, \quad x(-t) = \lambda x(t) \quad (7.10)$$

tenglama noldan farqli $x(t)$ yechimga ega barcha λ sonlardan iboratdir.

Ravshanki, $\lambda = 1$ bo'lsa, u holda har bir juft funksiya, $\lambda = -1$ bo'lsa, u holda har bir toq funksiya (7.10) tenglama yechimi bo'ladi, ya'ni $\lambda = \pm 1$ operatorning xos sonlaridir.

A operatorining ± 1 dan boshqa xos sonlari mavjud emasligini ko'rsatamiz.

Faraz qilaylik, $\lambda_0 \neq \pm 1$ uchun $x_0(t)$ funksiya (7.10) ning yechimi bo'lsin, ya'ni

$$x_0(-t) = \lambda_0 x_0(t), \quad t \in [0, 1]. \quad (7.11)$$

Bu tenglikda t ni $-t$ ga almashtirsak, u holda

$$x_0(t) = \lambda_0 x_0(-t), \quad t \in [0, 1]. \quad (7.12)$$

Endi (7.11) va (7.12) tengliklardan,

$$x_0(t) = \lambda_0^2 x_0(t), t \in [0, 1].$$

$\lambda_0^2 \neq 1$ bo'lganligidan, $x_0 \equiv 0$, ya'ni $\lambda \neq \pm 1$ bo'lgan sonlar operatorning xos sonlari bo'la olinaydi. Demak, xos sonlar $\lambda = \pm 1$ dan iborat.

7.2.13. $A : C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi]$ operatori

$$(Ax)(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(t+s)x(s) ds$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning noldan farqli xos sonlarini toping.

Yechimi. $\lambda \neq 0$ soni operatorning xos soni bo'lishi uchun

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(t+s)x(s) ds = \lambda x(t)$$

tenglaina noldan farqli $x(t)$ yechinga ega bo'lishi kerak. Bundan

$$\sin t \int_{-\pi}^{\pi} \cos s x(s) ds - \cos t \int_{-\pi}^{\pi} \sin s x(s) ds = \lambda x(t), \quad (7.13)$$

ya'ni

$$x(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t.$$

Bu tenglikni (7.13) ga qo'ysak, u holda

$$\lambda \alpha \sin t + \lambda \beta \cos t = \pi \alpha \sin t + \pi \beta \cos t.$$

$\sin t$ va $\cos t$ funksiyalarning chiziqli erkli ekanligidan,

$$\begin{cases} \alpha \lambda - \beta \pi = 0, \\ \alpha \pi - \beta \lambda = 0. \end{cases}$$

$x(t) \neq 0$ dan $\alpha \neq 0$ yoki $\beta \neq 0$. Bundan

$$\lambda_1 = \pi, \lambda_2 = -\pi$$

operatorning noldan farqli xos sonlaridir.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ kompleks sonlar ketma-ketligi bo'lsin. Agar $T : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ operator

$$T(x) = (c_1x_1, c_2x_2, c_3x_3, \dots), \quad x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlansa, u holda

a) T chegaralangan chiziqli operator ekanligini ko'rsating va uning normasini toping;

b) operator spektri $sp(T) = \overline{\{c_n : n \in \mathbb{N}\}}$ ga tengligini isbotlang.

2. Banax fazosi va $T \in B(E)$ bo'lsin.

$$(\lambda I - T)(\lambda I + T) = \lambda^2 I - T^2$$

ayniyat yordamida $sp(T^2) = \{\lambda^2 : \lambda \in sp(T)\}$ ekanligini isbotlang.

3. $T : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ chegaralangan operator

$$T(x) = (0, x_1, 0, x_3, 0, \dots), \quad x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlanadi.

a) 0 soni T operatorning xos soni ekanligini ko'rsating;

b) T^2 ni toping va bu orqali $sp(T) = \{0\}$ ekanligini ko'rsating.

4. $T : \ell_2 \rightarrow \ell_2$ chegaralangan chiziqli operatori

$$T(x) = (0, 0, x_2, x_3, \dots), \quad x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$$

formula bilan aniqlanadi.

a) T operator normasini toping;

b) T operatorining xos soni mavjud emasligini isbotlang.

5. $T \in B(X)$ operatori uchun $T^2 = 0$ bo'lsa, bu operatorning noldan farqli xos sonlari mavjudmi?

6. $A : C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi]$ operatori

$$(Ax)(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t+s)x(s) ds$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning noldan farqli xos sonlarini toping.

7. $A : C[0, \pi] \rightarrow C[0, \pi]$ operatori

$$(Ax)(t) = \int_0^{\pi} \cos(t-s)x(s) ds$$

formula bilan aniqlansa, u holda uning noldan farqli xos sonlarini toping.

8. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = \int_0^1 s^2 t^2 x(s) ds$$

kabi aniqlansa, uning noldan farqli xos sonlarini toping.

9. $T \in B(X)$ bo'lsin. Agar $\lambda \in sp(T)$ bo'lsa, u holda $\lambda^n \in sp(T^n)$ ekanligini ko'rsating.

10. $T \in B(X)$ bo'lsin. Agar $T^{-1} \in B(X)$ va $\lambda \in sp(T)$ bo'lsa, u holda $\lambda^{-1} \in sp(T^{-1})$ ekanligini ko'rsating.

7.3. Kompakt operatorlar

Oldingi bo'limlarda ko'rganimizdek, chekli o'lchamli fazolarda chiziqli operatorlar matritsalar orqali to'liq aniqlanadi. Lekin cheksiz o'lchamli fazolarda chegaralangan chiziqli operatorlarni har doim ham bunday tavsiflash mumkin emas. Chekli o'lchamli fazolardagi operatorlar sinfiga yaqin bo'lgan operatorlar bu kompakt operatorlardir. Kompakt operatorlar funksional analizning juda ko'p tatbiqlarida qo'llaniladi, jumladan, integral tenglamalar nazariyasida keng qo'llaniladi.

Ta'rif. Agar X Banax fazosidagi chiziqli operator har bir chegaralangan to'plamni nisbiy kompakt to'plamga akslantirsa, u holda A kompakt operator deyiladi.

Chekli o'lchamli fazolarda har bir chiziqli operator kompakt operatordir. Chunki bu fazolarda chiziqli operator chegaralangan to'plamni chegaralangan to'plamga akslantiradi va har bir chegaralangan to'plam nisbiy kompaktdir.

Agar X Banax fazosidagi A chiziqli operatorning qiymatlari to'plami $R(A)$ chekli o'lchamli bo'lsa, u holda A chekli o'lchamli operator deyiladi.

Masalalar

7.3.1. Agar A kompakt operator, B chegaralangan operator bo'lsa, u holda AB va BA ham kompakt operator bo'ladi.

Yechimi. Aytaylik, $S \subset X$ chegaralangan to'plam bo'lsin. A kompakt ekanligidan, $A(S)$ nisbiy kompakt to'plamdir. Nisbiy kompakt

to‘planning uzlusiz akslantirishdagi obrazi nisbiy kompaktligi va B operatorining uzlusizligidan, $(AB)(S) = B(A(S))$ to‘plam ham nisbiy kompakttdir. Demak, AB kompakt operator bo‘ladi. Xuddi shunday BA kompakt ekanligi kelib chiqadi.

7.3.2. Agar $\{A_n\}$ Banax fazosidagi kompakt operatorlar ketma-ketligi A operatoriga norma bo‘yicha yaqinlashsa, u holda A kompakt operator bo‘ladi.

Yechimi. A operatorining kompaktligini isbotlash uchun X fazosidagi ixtiyoriy $\{x_n\}$ chegaralangan ketma-ketlik olinganda, $\{Ax_n\}$ ning yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketligi mavjudligini ko‘rsatamiz.

A_1 kompakt operator bo‘lganligidan, $\{A_1x_n\}$ ning yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketligi mavjud. Aytaylik,

$$x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}, \dots$$

shunday qismiy ketma-ketlikki, $\{A_1x_n^{(1)}\}$ yaqinlashuvchi. Endi $\{A_2x_n^{(1)}\}$ ketma-ketlikni qaraylik. Bu ketma-ketlikdan ham yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketlik ajratish mumkin. Aytaylik,

$$x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)}, \dots$$

shunday qismiy ketma-ketlikki, $\{A_2x_n^{(2)}\}$ yaqinlashuvchi. Shu tarzda mulohaza yuritib,

$$x_1^{(3)}, x_2^{(3)}, \dots, x_n^{(3)}, \dots$$

qismiy ketma-ketlikka ega bo‘lamizki, $\{A_3x_n^{(3)}\}$ yaqinlashuvchi. Bu jarayonni davom ettiramiz va diagonal ketma-ketlikni qaraylik:

$$x_1^{(1)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(n)}, \dots$$

Har bir A_1, \dots, A_n, \dots operatorlar bu ketma-ketlikni yaqinlashuvchi ketma-ketliklarga o‘tkazadi.

Endi $\{Ax_n^{(n)}\}$ ham yaqinlashuvchi ekanligini ko‘rsatamiz. X to‘la bo‘lganligidan, bu ketma-ketlikning fundamentalligini ko‘rsatish yetarli. Quyidagi o‘rinli:

$$\begin{aligned} \|Ax_n^{(n)} - Ax_m^{(m)}\| &\leq \|Ax_n^{(n)} - A_kx_n^{(n)}\| + \\ &+ \|A_kx_n^{(n)} - A_kx_m^{(m)}\| + \|A_kx_m^{(m)} - Ax_m^{(m)}\|. \end{aligned}$$

Aytaylik, $\|x_n\| \leq C$ bo‘lsin. Oldin shunday k sonini olamizki,

$$\|A - A_k\| < \frac{\varepsilon}{3C}$$

bo'lsin. Endi shunday n_0 sonini olamizki, $n, m > n_0$ sonlari uchun

$$\|A_k x_n^{(n)} - A_k x_m^{(m)}\| < \frac{\varepsilon}{3}$$

bo'lsin ($\{A_k x_n^{(n)}\}$ yaqinlashuvchi ekanligidan, bunday son mavjud).

Bundan

$$\|Ax_n^{(n)} - Ax_m^{(m)}\| < C \frac{\varepsilon}{3C} + \frac{\varepsilon}{3} + C \frac{\varepsilon}{3C} = \varepsilon.$$

Demak, $\{Ax_n^{(n)}\}$ fundamental, bundan esa A kompakt operator bo'ladi.

7.3.3. Cheksiz o'lchamli X Banax fazosida birlik operator kompakt operator emasligini ko'rsating.

Yechimi. Faraz qilaylik, cheksiz o'lchamli X Banax fazosida birlik operator kompakt operator bo'lsin. U holda X fazoning birlik shari kompakt to'plain bo'ladi. Lekin cheksiz o'lchamli fazoda uning birlik shari kompakt to'plam emas. Demak, cheksiz o'lchamli Banax fazosida birlik operator kompakt operator emas ekan.

7.3.4. Cheksiz o'lchamli X Banax fazosida kompakt operatorning chegaralangan teskari operatori mavjud emas.

Yechimi. Faraz qilaylik, cheksiz o'lchamli X Banax fazosida T kompakt operatorning chegaralangan teskari operatori T^{-1} mavjud bo'lsin. U holda 7.3.1-misoldan $I = TT^{-1}$ kompakt operator bo'ladi. Lekin 7.3.3-misolga ko'ra I kompakt operator emas. Hosil bo'lgan ziddiyatdan, cheksiz o'lchamli Banax fazosida kompakt operatorning chegaralangan teskari operatori mavjud emasligi kelib chiqadi.

7.3.5. X Banax fazosida chegaralangan chekli o'lchamli operatorning kompakt operator bo'lishini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $A : X \rightarrow X$ chegaralangan chekli o'lchamli operator bo'lsin. U holda

$$\{A(x) : \|x\| \leq 1\}$$

chekli o'lchamli $R(A)$ fazoda chegaralangan to'plam. 3.2.10-misoldagi Boltsano – Veyershtrass teoremasidan, bu to'plam nisbiy kompaktdir. Demak, A kompakt operator.

7.3.6. H Hilbert fazosi va $A : H \rightarrow H$ kompakt operator bo'lsa, u holda $T = I - A$ operatori qiymatlari sohasi $R(T)$ yopiq ekanligini ko'rsating.

Yechimi. Aytaylik, $y_n \in R(T)$ va $y_n \rightarrow y \in H$ bo'lsin. U holda shunday $x_n \in H$ vektori topilib,

$$y_n = T(x_n) = x_n - T(x_n) \tag{7.14}$$

tengligi bajariladi. Har bir x_n vektoridan uning ker T qism fazoga proeksiyasini ayirib, x_n vektorini ker T ga ortogonal etib olish mumkin. Endi $\{x_n\}$ ketma-ketlikning chegaralangan ekanligini ko'rsatamiz. Faraz qilaylik, $\{x_n\}$ ketma-ketlik chegaralanmagan bo'lsin. U holda qismiy ketma-ketlikka o'tib, $\|x_n\| \rightarrow \infty$ deb olish mumkin. Endi (7.14) tenglikdan

$$\frac{x_n}{\|x_n\|} - A \left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \right) \rightarrow 0. \quad (7.15)$$

A operatori kompakt ekanligidan, yana qismiy ketma-ketlikka o'tib, $\left\{ A \left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \right) \right\}$ yaqinlashuvchi deb olishimiz mumkin. U holda $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}$ ketma-ketlik ham birlik normali biror $z \in H$ vektoriga yaqinlashadi. (7.15) formuladan, $T(z) = 0$, ya'ni $z \in \ker T$. Endi $x_n \perp \ker T$ ekanligidan, $z \perp \ker T$. Demak, $z \in \ker T^\perp$ va $z \in \ker T$. Bundan $z = 0$. Bu esa $\|z\| = 1$ tengligiga zid. Hosil bo'lgan ziddiyatdan, $\{x_n\}$ ketma-ketlikning chegaralangan ekanligi kelib chiqadi.

Yana qismiy ketma-ketlikka o'tib, $\{A(x_n)\}$ yaqinlashuvchi deb olishimiz mumkin. U holda (7.14) dan $\{x_n\}$ yaqinlashuvchi bo'ladi. Ayttaylik, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ bo'lsin. Yana (7.14) tenglikdan $y = T(x)$ kelib chiqadi. Bundan $y \in R(T)$, ya'ni $R(T)$ yopiq qism fazo.

7.3.7. Hilbert fazosidagi o'z-o'ziga qo'shma operatorning barcha xos qiymatlari haqiqiydir.

Yechimi. $A = A^*$ va $A(x) = \lambda x$, $x \neq 0$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \lambda \langle x, x \rangle &= \langle \lambda x, x \rangle = \langle A(x), x \rangle = \\ &= \langle x, A^*(x) \rangle = \langle x, A(x) \rangle = \langle x, \lambda x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle, \end{aligned}$$

ya'ni $\lambda \langle x, x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle$, yoki $\lambda \|x\|^2 = \bar{\lambda} \|x\|^2$. Endi $\|x\| \neq 0$ ekanligidan, $\lambda = \bar{\lambda}$, ya'ni λ haqiqiy son.

7.3.8. O'z-o'ziga qo'shma operatorning har xil xos qiymatlari mos xos vektorlari ortogonaldir.

Yechimi. A o'z-o'ziga qo'shma operator, $\lambda \neq \mu$ bu operatorning xos qiymatlari bo'lsin. x, y mos ravishda λ, μ sonlarga mos xos vektorlar, ya'ni $A(x) = \lambda x$, $A(y) = \mu y$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \lambda \langle x, y \rangle &= \langle \lambda x, y \rangle = \langle A(x), y \rangle = \langle x, A^*(y) \rangle = \\ &= \langle x, A(y) \rangle = \langle x, \mu y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle = \mu \langle x, y \rangle, \end{aligned}$$

ya'ni $(\lambda - \mu) \langle x, y \rangle = 0$. Bundan $\langle x, y \rangle = 0$, ya'ni $x \perp y$.

7.3.9. ℓ_2 fazosida T operatori quyidagi

$$T((x_n)_{n=1}^{\infty}) = \left(0, x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n-1}, \dots \right)$$

formula orqali aniqlanadi. U holda

a) T operatorning kompakt ekanligini ko'rsating;

b) T operatorining birorta xos soni yo'qligini ko'rsating.

Yechimi. a) $x \in \ell_2$ va $y = T(x), y = (y_1, y_2, y_3, \dots)$ bo'lsin. Har bir $x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$ uchun $T(x) = \left(0, x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n-1}, \dots\right)$ ekanligidan, $y_n = \frac{x_{n-1}}{n-1}, n > 1$. Agar $\|x\| \leq 1$ bo'lsa, u holda $|x_n| \leq 1, n \in \mathbb{N}$. Bundan $|y_n| = \left|\frac{x_{n-1}}{n-1}\right| \leq \frac{1}{n-1}, n > 1$. Demak, y nuqta asosiy parallelepipedda joylashgan va asosiy parallelepipedning kompaktligidan birlik shar obrazni nisbiy kompakt bo'ladi. Bundan T kompakt operator.

b) Faraz qilayhk, $\lambda \in \mathbb{C}$ soni T operatorning xos soni bo'lsin. U holda noldan farqli $x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell_2$ vektori topilib, $T(x) = \lambda x$ tengligi, ya'ni

$$\left(0, x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n-1}, \dots\right) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3, \lambda x_4, \dots)$$

tengligi bajariladi. Bundan $\lambda x_1 = 0$ va $i > 1$ bo'lganda $\lambda x_i = \frac{1}{i-1} x_{i-1}$. Agar $\lambda = 0$ bo'lsa, $\lambda x_i = \frac{1}{i-1} x_{i-1}$ tengligidan $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = 0$ kelib chiqadi. Agar $\lambda \neq 0$ bo'lsa, $\lambda x_1 = 0$ va $\lambda x_i = \frac{1}{i-1} x_{i-1}$ tengliklardan $x_1 = x_2 = x_3 = \dots = 0$ kelib chiqadi, ya'ni $x = 0$. Bu esa $x \neq 0$ ekanligiga zid. Demak, farazimiz noto'g'ri va T operatorining xos soni mavjud emas.

7.3.10. $A : L_2[0, 1] \rightarrow L_2[0, 1]$ operatori

$$(Ax)(t) = \int_0^1 st(1-st)x(s) ds$$

formula orqali aniqlansa, u holda A kompakt operatori ekanligini isbotlang.

Yechimi. A operatorini quyidagi shaklda ifodalaymiz:

$$(Ax)(t) = t \int_0^1 sx(s) ds - t^2 \int_0^1 s^2 x(s) ds = tc_1 - t^2 c_2,$$

bunda $c_1 = \int_0^1 sx(s) ds, c_2 = \int_0^1 s^2 x(s) ds$. Bundan A chekli o'lchamli operator va demak, kompakt operator bo'ladi.

7.3.11. Hilbert fazosidagi har bir kompakt operator chekli o'lchamli operatorlar ketma-ketligining tekis limiti ekanligini isbotlang.

Yechimi. Faraz qilaylik, $\{\lambda_n\}$ ketma-ketlik A kompakt operatorining modullari bo'yicha kamayish tartibida yozilgan xos sonlari, $\{e_n\}$ xos vektorlardan iborat ortonormal bazis bo'lsin. U holda har bir $x \in H$ uchun

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

tengligi o'rinnlidir. Har bir $m \in \mathbb{N}$ uchun

$$A_m(x) = \sum_{n=1}^m \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

operatorini aniqlaymiz. Bunda A_m chekli o'lchamli operatorlardir. Endi $x \in H$ uchun

$$\begin{aligned} \|A(x) - A_m(x)\|^2 &= \langle A(x) - A_m(x), A(x) - A_m(x) \rangle = \\ &= \left\langle \sum_{n=m+1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \sum_{n=m+1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n \right\rangle = \\ &= \sum_{n=m+1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} \langle \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \lambda_k \langle x, e_k \rangle e_k \rangle = \\ &= \sum_{n=m+1}^{\infty} \langle \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n \rangle = \sum_{n=m+1}^{\infty} |\lambda_n|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq |\lambda_m|^2 \|x\|^2. \end{aligned}$$

Bundan

$$\|A - A_m\| \leq |\lambda_m| \rightarrow 0.$$

7.3.12. *H Hilbert fazosi, $\{e_n\}$ bu fazoda ortonormal bazis, $\{\lambda_n\}$ nolga monoton kamayuvchi sonlar ketma-ketligi bo'lsin. Har bir $x \in H$ uchun*

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

A chegaralangan operator va har bir λ_n uning xos sonlari ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $x \in H$ uchun

$$\|A(x)\|^2 = \langle A(x), A(x) \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n, \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n \right\rangle =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \lambda_1^2 \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \lambda_1^2 \|x\|^2,$$

ya'ni

$$\|A(x)\| \leq \lambda_1 \|x\|.$$

Endi $x = e_1$ vektori uchun

$$\begin{aligned} \|A(e_1)\|^2 &= \langle A(e_1), A(e_1) \rangle = \\ &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle e_1, e_n \rangle e_n, \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \langle e_1, e_n \rangle e_n \right\rangle = \langle \lambda_1 e_1, \lambda_1 e_1 \rangle = \lambda_1^2 \|e_1\|^2, \end{aligned}$$

ya'ni

$$\|A(e_1)\| = \lambda_1 \|e_1\|.$$

Bundan

$$\|A\| = \lambda_1.$$

Endi

$$A(e_n) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i \langle e_n, e_i \rangle e_i = \lambda_n e_n$$

ekanligidan, har bir λ_n operatorning xos sonidir.**7.3.13. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori**

$$(Ax)(t) = \int_0^1 K(s, t)x(s) ds$$

formula orqali aniqlansa, u holda A kompakt operatori ekanligini isbotlang.

Yechimi. $M = \sup_{0 \leq s, t \leq 1} |K(s, t)|$ bo'lsin. U holda $\{(s, t) : 0 \leq s, t \leq 1\}$ to'plamning kompaktligidan, $K(s, t)$ funksiya bu kvadratda tekis uzuksiz bo'ladi, ya'ni $\forall \varepsilon > 0$ uchun $\exists \delta > 0$ topilib,

$$|s_1 - s_2| + |t_1 - t_2| < \delta$$

bo'lganda

$$|K(s_1, t_1) - K(s_2, t_2)| < \varepsilon$$

tengsizligi bajariladi. Bundan

$$|y(s_1) - y(s_2)| = \left| \int_0^1 (K(s_1, t) - K(s_2, t)) x(t) dt \right| \leq$$

$$\leq \int_0^1 |K(s_1, t) - K(s_2, t)| |x(t)| dt \leq \int_0^1 \varepsilon \|x\| dt = \varepsilon \|x\|.$$

ya'ni

$$|y(s_1) - y(s_2)| \leq \varepsilon \|x\|. \quad (7.16)$$

(7.16) tengsizlikdan $y(s)$ funksiyaning uzlusizligi kelib chiqadi, ya'ni $y \in C[0, 1]$.

Endi $F = \{x : x \in C[0, 1]\}$ chegaralangan to'plam bo'lsa, u holda (7.16) tengsizlikdan $\{A(x) : x \in F\}$ to'plamning tekis darajali uzlusizligi kelib chiqadi.

Agar $\|x\| \leq c$ bo'lsa, u holda

$$\|y\| = \sup_{0 \leq s \leq 1} |y(s)| \leq \int_0^1 |K(s, t)| |x(t)| dt \leq M \|x\|,$$

ya'ni

$$\|y\| \leq Mc.$$

Demak, A operatori har bir chegaralangan to'plamini tekis chegaralangan va tekis darajali uzlusiz to'plamga, ya'ni nisbiy kompakt to'plamga o'tkazadi. Bundan A operatori kompakt bo'ladi.

7.3.14. $A : L_2[0, \pi] \rightarrow C[0, \pi]$ operatori

$$(Ax)(t) = \int_0^\pi \sin(t+s)x(s) ds$$

formula orqali aniqlansa, u holda A kompakt operatori ekanligini isbotlang.

Yechimi. $x \in L_2[0, \pi]$ va $\|x\| \leq 1$ bo'lsin. U holda

a)

$$\begin{aligned} |A(x)(t)| &= \left| \int_0^\pi \sin(t+s)x(s) ds \right| \leq \sqrt{\int_0^\pi \sin^2(t+s) ds} \sqrt{\int_0^\pi |x(s)|^2 ds} = \\ &\leq \left(\sqrt{\int_0^\pi 1 ds} \right) \|x\| \leq \sqrt{\pi}, \end{aligned}$$

ya'ni $|A(x)(t)| \leq \sqrt{\pi}$.

b)

$$\begin{aligned}
 |A(x)(t_1) - A(x)(t_2)| &= \left| \int_0^\pi [\sin(t_1 + s) - \sin(t_2 + s)]x(s) ds \right| = \\
 &= 2 \left| \int_0^\pi \sin \frac{t_1 - t_2}{2} \cos(s + \frac{t_1 + t_2}{2})x(s) ds \right| = \\
 &\leq \sqrt{\int_0^\pi [\sin \frac{t_1 - t_2}{2} \cos(s + \frac{t_1 + t_2}{2})]^2 ds} \sqrt{\int_0^\pi |x(s)|^2 ds} \leq \\
 &\leq |t_1 - t_2| \sqrt{\pi},
 \end{aligned}$$

ya'ni $|A(x)(t_1) - A(x)(t_2)| \leq |t_1 - t_2| \sqrt{\pi}$.

Bundan A operatori $L_2[0, \pi]$ fazo birlik sharini tekis chegaralangan va tekis darajali uzluksiz to'plamga o'tkazadi. Demak, A kompakt operator bo'ladi.

7.3.15. Agar $T : H \rightarrow H$ ermit kompakt operatori bo'lsa, u holda $\pm \|T\|$ sonlardan kamida bittasi T operatorining xos sonlari ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $T = 0$ operatori uchun ravshan bo'lganligidan, $T \neq 0$ holni qaraymiz. T ermit operatori bo'lganligidan,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle T(x), x \rangle|$$

tengligi o'rinni. Bundan H fazoda shunday $\{x_n\}$ ketma-ketlik mavjud bo'lib, $\|x_n\| = 1$ va $n \rightarrow \infty$ da $|\langle T(x_n), x_n \rangle| \rightarrow \|T\|$. Yana T ermit operatori bo'lganligidan,

$$\langle T(x_n), x_n \rangle = \langle x_n, T^*x_n \rangle = \langle x_n, T(x_n) \rangle = \overline{\langle T(x_n), x_n \rangle},$$

ya'ni $\langle T(x_n), x_n \rangle$ haqiqiy son. Qismiy ketma-ketlikka almashtirib,

$$\langle T(x_n), x_n \rangle \rightarrow \lambda,$$

bunda $\lambda = \|T\|$ yoki $\lambda = -\|T\|$ deb olamiz. U holda

$$\begin{aligned}
 \|T(x_n) - \lambda x_n\|^2 &= \langle T(x_n) - \lambda x_n, T(x_n) - \lambda x_n \rangle = \\
 &= \|T(x_n)\|^2 - 2\lambda \langle T(x_n), x_n \rangle + \lambda^2 \|x_n\|^2 \leq \\
 &\leq \|T\|^2 \|x_n\|^2 - 2\lambda \langle T(x_n), x_n \rangle + \lambda^2 \|x_n\|^2 =
 \end{aligned}$$

$$= 2\lambda^2 - 2\lambda \langle T(x_n), x_n \rangle,$$

ya'ni

$$0 \leq \|T(x_n) - \lambda x_n\|^2 \leq 2\lambda^2 - 2\lambda \langle T(x_n), x_n \rangle \rightarrow 0.$$

Bundan

$$T(x_n) - \lambda x_n \rightarrow 0.$$

Endi T operatorining kompaktligidan, $\{x_n\}$ ketma-ketlikning shunday $\{x_{n_p}\}$ qismiy ketma-ketmaligi mavjud bo'lib, $\{T(x_{n_p})\}$ ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'ladi. $T(x_{n_p}) \rightarrow y$ bo'lsin. U holda $\lambda x_{n_p} \rightarrow y$ va $\lambda T(x_{n_p}) \rightarrow T(y)$. Bundan $T(y) = \lambda y$. Nihoyat

$$\|y\| = \lim_{p \rightarrow \infty} \|\lambda x_{n_p}\| = |\lambda| = \|T\| \neq 0$$

ekanligidan, λ soni T operatorining xos soni bo'ladi.

7.3.16. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = tx(t).$$

kabi aniqlansa, u holda A kompakt operator bo'ladimi?

Yechimi. $C[0, 1]$ fazoda quyidagi funksiyalarni qaraylik:

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & \text{agar } t \in [0, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}}), \\ 2^{n+1}t - 2^n - 1, & \text{agar } t \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+1}}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}), \\ 1, & \text{agar } t \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}, 1]. \end{cases}$$

U holda $\|x_n\| = 1$ va $t_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}$ uchun $x_n(t_n) = 1$, $x_m(t_n) = 0$, $n > m$.
Bundan

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq |t_n x_n(t_n) - t_n x_m(t_n)| \geq \frac{1}{2},$$

ya'ni

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq \frac{1}{2}.$$

Bundan $\{Ax_n\}$ ketma-ketlikning birorta ham qismiy ketma-ketligi yaqinlashuvchi emas. Demak, A kompakt operator emas.

7.3.17. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = x(t^2)$$

kabi aniqlansa, u holda A kompakt operator bo'ladimi?

Yechimi. x_n va t_n lar oldingi masaladagi funksiya va nuqtalar bo'lsin. Har bir n uchun $y_n = x_n(\sqrt{t})$ deylik. U holda

$$\|Ay_n - Ay_m\| \geq |x_n(t_n) - x_m(t_n)| \geq 1,$$

ya'ni

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq 1.$$

Demak, A kompakt operator emas.

7.3.18. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = \int_0^1 e^{ts} x(s) ds$$

kabi aniqlansa, u holda A kompakt operator bo'ladimi?

Yechimi. $x_n \in C[0, 1]$, $\|x_n\| = 1$ bo'lсин. U holda

$$Ax_n(t) = \int_0^1 e^{ts} x_n(s) ds = e^t \int_0^1 e^s x_n(s) ds.$$

Agar

$$a_n = \int_0^1 e^s x_n(s) ds$$

deb belgilasak, u holda

$$|a_n| = \left| \int_0^1 e^s x_n(s) ds \right| \leq e,$$

ya'ni $\{a_n\}$ chegaralangan sonli ketma-ketlik. Demak, uning yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketligi mavjud. U holda

$$Ax_n(t) = a_n e^t$$

ham yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketligiga ega. Demak, A kompakt operator ekan.

7.3.19. Agar $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$Ax(t) = x(0) + tx(1)$$

kabi aniqlansa, u holda A kompakt operator bo'ladimi?

Yechimi. $x_n \in C[0, 1]$, $\|x_n\| = 1$ bo'lсин. Agar

$$a_n = x_n(0), b_n = x_n(1)$$

deb belgilasak, u holda

$$|a_n| \leq 1, |b_n| \leq 1,$$

yani $\{a_n\}, \{b_n\}$ clegaralangan souli ketma-ketliklar. Denak, $\{a_n\}, \{b_n\}$ yaqinlashuvchi qismiy ketma-ketliklar mayjud. U holda

$$Ax_n(t) = a_{n_k} + tb_{n_k}$$

ham $C[0, 1]$ cia norma bo'yicha yaqinlashuvchi bo'ldi. Bundan A kompakt operator ekan.

Mustaqil ish uchun masalalar

1. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$(Af)(t) = \int_0^1 K(t, s)f(s)ds + \sum_{k=1}^n \varphi_k(t)f(t_k)$$

formula orqali aniqlansa, bunda $K(t, s) - 0 \leq t, s \leq 1$ kvadratda uzluk-siz, $\varphi_k(t) \in C[0, 1]$, $t_k \in [0, 1]$, $k = \overline{1, n}$. A kompakt operatori ekanligini isbotlang.

2. Hilbert fazosidagi har bir chegaralangan chiziqli operator kompakt operatorlar ketma-ketligining kuchli limiti ekanligini isbotlang.

3. H Hilbert fazosi, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ortonormal bazisi va $A : H \rightarrow H$ chegaralangan operator. Agar $\sum_{k=1}^{\infty} \|A(e_n)\|^2$ qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda A kompakt operator ekanligini isbotlang.

4. Kompakt operator qiymatlar sohasi separabelligini isbotlang.

5. H Hilbert fazosi, $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ortonormal bazisi va $A : H \rightarrow H$ kompakt operatori bolsa, u holda $\|A(e_n)\| \rightarrow 0$ ekanligini isbotlang.

6. Har bir $A : \ell_2 \rightarrow \ell_1$ chegaralangan chiziqli operatori kompakt ekanligini isbotlang.

7. $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ operatori

$$(Af)(t) = \int_0^1 K(t, s)f(s)ds$$

formula orqali aniqlansa, bunda $K(t, s) - 0 \leq t, s \leq 1$ kvadratda uzluk-siz, u holda A chegaralangan teskar operatorga ega bo'lishli munqimmi?

8 - 12 misollarda $A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ kompakt operator bo'ladimi?

$$8. Ax(t) = \int_0^t x(s)ds;$$

$$9. Ax(t) = \int_0^1 x(s)|t - s|^{-1}ds;$$

7.4. Integral operatorlar va tenglamalar

Agar funksional tenglamada nomalum funksiya integral ishorasi ostida qatnashsa, u holda bu tenglama integral tenglama deb ataladi. Integral tenglamadagi ifoda nomalum funksiya nisbatan chiziqli bo'lsa, u holda tenglama chiziqli integral tenglama deb ataladi. Endi chiziqli integral tenglamalarning ahamiyatli sinflaridan birini qaraymiz:

$$\varphi(t) = \lambda \int_a^b K(t, s)f(s)ds + f(t) \quad (7.17)$$

$$\int_a^b K(t, s)dsdt < \infty$$

shartini qanoatlanitirs, u Hilbert - Shmidt yadrosi deb ataladi.

$$\int_a^b \int_a^b K(t, s)f(s)ds = f(t) \quad (7.18)$$

tenglamasi I-tur Fredholm tenglamasi deyildi. Agar $K(t, s)$ funksiyasi $s > t$ qiyamatlarda $K(t, s) = 0$ tengligini qanoatlanitirs, u holda (7.17)

va (7.18) tenglamalar mos

$$\varphi(t) = \lambda \int_a^t K(t,s)f(s)ds + f(t), \quad (7.19)$$

$$\int_a^t K(t,s)f(s)ds = f(t) \quad (7.20)$$

ko'rinishlarga keladi. Bunday tenglamalar I va II Volterra tenglamalari deb ataladi.

Agar yuqoridaq tenglamalarda $K(t,s) = K(s,t)$ bo'lsa, u holda ular simmetrik integral tenglamalar deyiladi.

Integral tenglama yadrosi

$$K(t,s) = \sum_{i=1}^n a_i(t)b_i(s)$$

ko'rinishda bo'lsa, u holda u aynigan yadro deyiladi. Faraz qilaylik, (7.17) tenglama aynigan yadroga ega bo'lsin. U holda

$$\varphi(t) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i(t) \int_a^b b_i(s)f(s)ds + f(t) \quad (7.21)$$

tenglamasiga ega bo'llamiz. Bu tenglama yechimi $\varphi = \varphi(t)$ funksiyasi bo'lsin. Agar

$$c_i = \int_a^b \varphi(s)b_i(s)ds, \quad i = \overline{1, n}$$

deb belgilasak, u holda (7.21) tenglamaning yechimi quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\varphi(t) = f(t) + \lambda \sum_{i=1}^n c_i a_i(t). \quad (7.22)$$

Bu tenglikni $b_i(t), i = \overline{1, n}$ funksiyasiga ko'paytirib, $[a, b]$ segmentda t o'zgaruvchisi bo'yicha integrallaymiz:

$$\int_a^b \varphi(t)b_i(t) = \int_a^b f(t)b_i(t) + \lambda \sum_{i=1}^n c_i \int_a^b a_j(t)b_i(t)dt, \quad i = \overline{1, n}. \quad (7.23)$$

Tenglikning o'ng tomonidagi integrallar ozgarmas sonlar bo'lib, ularni quyida qo'sha belgidaymiz:

$$\int_a^b a_j(t)b_i(t)dt = k_{ij}, \quad i, j = \overline{1, n},$$

$$\int_a^b f(t)b_i(t) = f_i, \quad i = \overline{1, n}. \quad (7.20)$$

U holda (7.23) tenglama

$$c_i - \lambda \sum_{j=1}^n k_{ij}c_j = f_i, \quad i = \overline{1, n} \quad (7.24)$$

ko'rinishga keladi. Bu tenglamalar sistemasining c_1, c_2, \dots, c_n yechimlarini (7.22) ga qoyib, (7.21) integral tenglama yechiniga ega bo'lamiz. Agar (7.24) tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmasa, u holda (7.21) integral tenglama ham yechimga ega bo'lmaydi.

Integral tenglamalarni yechimini ketma-ket yaqinlashtirish usuli bilan topish mumkin. Faraz qilaylik, $M = \max_{a \leq t, s \leq b} |K(t,s)|$ bolsin. Agar $|\lambda| < \frac{1}{M(b-a)}$ bolsa, u holda (7.21) tenglama yechimi uchun tengligi bajariladi, bunda

$$\varphi_{n+1}(t) = \lambda \int_a^b K(t,s)\varphi_n(s)ds + f(t), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (7.25)$$

$\varphi_0(t)$ funksiyasi sifatida $[a, b]$ segmentda uzlucksiz ixтиoriy funksiyani olish mumkin.

Agar (7.17), (7.18), (7.19) va (7.20) tenglamalarda $f(t) = 0$ bo'lsa, u holda bir jinsli integral tenglama, aksinchalik, $f(t) \neq 0$ bo'lsa, bir jinsli bo'lmanган integral tenglamalar deyiladi. Xususiy holda, tenglama Abel tenglamasi deyildadi.

$$f(t) = \int_0^t \frac{\varphi(s)}{(t-s)^\alpha} ds, \quad (0 < \alpha < 1, f(0) = 0)$$

Masalalar

7.4.1. Agar A Hilbert – Shmidt operatorining yadrosi $K(s, t)$ bolsa, u holda A^* qo'shma operatori $\overline{K(t, s)}$ yadroli Hilbert – Shmidt operatori ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $f, g \in L_2[a, b]$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} \langle f, A^*g \rangle &= \langle Af, g \rangle = \int_a^b \left\{ \int_a^b K(s, t)f(t) dt \right\} \overline{g(s)} ds = \\ &= \int_a^b \int_a^b K(s, t)f(t)\overline{g(s)} dt ds = \int_a^b \left\{ \int_a^b K(s, t)\overline{g(s)} ds \right\} f(t) dt = \\ &= \int_a^b f(t) \overline{\left\{ \int_a^b \overline{K(s, t)}g(s) ds \right\}} dt = \int_a^b f(s) \overline{\left\{ \int_a^b \overline{K(t, s)}g(t) dt \right\}} ds, \end{aligned}$$

ya'ni

$$\langle f, A^*g \rangle = \int_a^b f(s) \overline{\left\{ \int_a^b \overline{K(t, s)}g(t) dt \right\}} ds.$$

Bundan

$$A^*g(s) = \int_a^b \overline{K(t, s)}g(t) dt.$$

Demak, A^* qo'shma operatori $\overline{K(t, s)}$ yadroli Hilbert – Shmidt operatori bo'ladi.

7.4.2. $C[a, b]$ fazosida

$$Af(t) = \lambda \int_a^t K(t, s)f(s) ds + \varphi(t)$$

operatorning biror darajasi qisqartirib akslantirish ekanligini ko'rsating.

Yechimi. $f, g \in C[a, b]$ bo'lsin. U holda

$$\begin{aligned} |Af(t) - Ag(t)| &= |\lambda| \left| \int_a^t K(t, s)[f(s) - g(s)] ds \right| \leq \\ &\leq |\lambda| M(t-a) \max_{a \leq s \leq b} |f(s) - g(s)|, \end{aligned}$$

bunda $M = \max_{a \leq t, s \leq b} |K(t, s)|$. Bundan

$$|A^2 f(t) - A^2 g(t)| \leq |\lambda|^2 M^2 \frac{(t-a)^2}{2} m,$$

bunda $m = \max_{a \leq s \leq b} |f(s) - g(s)|$. Umuman,

$$|A^n f(t) - A^n g(t)| \leq |\lambda|^n M^n \frac{(t-a)^n}{n!} m.$$

Demak,

$$|\lambda|^n M^n \frac{(t-a)^n}{n!} < 1$$

tengsizlikni qanoatlanadirigan n soni uchun A^n qisqartirib akslantirish bo‘ladi.

7.4.3.

$$\varphi(t) = 2 \int_0^1 (1+ts)\varphi(s) ds + t^2$$

aynigan yadroli tenglamani yeching.

Yechimi. Berilgan tenglamani

$$\varphi(t) = 2 \int_0^1 \varphi(s) ds + 2t \int_0^1 s\varphi(s) ds + t^2$$

ko‘rinishda yozib,

$$c_1 = \int_0^1 \varphi(s) ds$$

va

$$c_2 = \int_0^1 s\varphi(s) ds$$

deb belgilasak, u holda $\varphi(t) = 2c_1 + 2c_2t + t^2$.

Endi c_1 va c_2 noma'lumlarni topamiz:

$$c_1 = \int_0^1 \varphi(t) dt = \int_0^1 (2c_1 + 2c_2t + t^2) dt = 2c_1 + c_2 + \frac{1}{3},$$

ya’ni $c_1 + c_2 = -\frac{1}{3}$. Xuddi shunday

$$c_2 = \int_0^1 t\varphi(t) dt = \int_0^1 (2c_1t + 2c_2t^2 + t^3) dt = c_1 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{1}{4},$$

ya'ni $c_1 - \frac{1}{3}c_2 = -\frac{1}{4}$. Demak, biz quyidagi chiziqli tenglamlar sistemasiga ega bo'ldik:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = -\frac{1}{3}, \\ c_1 - \frac{1}{3}c_2 = -\frac{1}{4}. \end{cases}$$

Bu tenglama yechimlari: $c_1 = -\frac{13}{48}$, $c_2 = -\frac{1}{16}$. U holda integral tenglama yechimi

$$\varphi(t) = t^2 - \frac{1}{8}t - \frac{13}{24}$$

funksiyasi bo'ladi.

7.4.4.

$$\varphi(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos s \varphi(s) ds + \sin t$$

aynigan yadroli tenglamani yeching.

Yechimi. Berilgan tenglamani

$$\varphi(t) = \sin t \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos s \varphi(s) ds + \sin t$$

ko'rinishda yozib,

$$c = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos s \varphi(s) ds$$

deb belgilasak, u holda $\varphi(t) = (1+c) \sin t$.

Endi c noma'lumni topamiz:

$$c = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+c) \cos t \sin t \varphi(t) dt = \frac{1+c}{2},$$

ya'ni $c = \frac{1+c}{2}$. Bundan $c = 1$. U holda integral tenglama yechimi

$$\varphi(t) = 2 \sin t$$

funksiyasi bo'ladi.

7.4.5.

$$\varphi(t) = \int_0^{\pi} \sin t \cos s \varphi(s) ds + \sin t$$

aynigan yadroli tenglamani yeching.

Yechimi. Berilgan tenglamani

$$\varphi(t) = \sin t \int_0^\pi \cos s \varphi(s) ds + \sin t$$

ko‘rinishda yozib,

$$c = \int_0^\pi \cos s \varphi(s) ds$$

deb belgilasak, u holda $\varphi(t) = (1 + c) \sin t$.

Endi c nomiga’lumni topamiz:

$$c = \int_0^\pi \varphi(t) dt = \int_0^\pi (1 + c) \cos t \sin t \varphi(t) dt = 0,$$

ya’ni $c = 0$. U holda integral tenglama yechimi

$$\varphi(t) = \sin t$$

funksiyasi bo‘ladi.

7.4.6.

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 ts \varphi(s) ds + \frac{3t}{4}$$

integral tenglamani ketma-ket yaqinlashtirish usuli yordamida yeching.

Yechimi. $\varphi_0(t) = 0$ deb olib, (7.25) formula bo‘yicha quyidagilarga ega bo‘lamiz:

$$\varphi_1(t) = \frac{t}{2} \int_0^1 s \varphi_0(s) ds + \frac{3t}{4} = \frac{3t}{4},$$

$$\varphi_2(t) = \frac{t}{2} \int_0^1 s \frac{3s}{4} ds + \frac{3t}{4} = \frac{3t}{4} \left(1 + \frac{1}{6}\right),$$

$$\varphi_3(t) = \frac{t}{2} \int_0^1 s \frac{3s}{4} \left(1 + \frac{1}{6}\right) ds + \frac{3t}{4} = \frac{3t}{4} \left(1 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6^2}\right),$$

.....

$$\varphi_n(t) = \frac{3t}{4}(1 + 16 + \frac{1}{6^2} + \cdots + \frac{1}{6^{n-1}}) = \frac{9t}{10}(1 - \frac{1}{6^n}).$$

U holda

$$\varphi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9t}{10}(1 - \frac{1}{6^n}),$$

$$\text{ya'ni } \varphi(t) = \frac{9t}{10}.$$

7.4.7.

$$\varphi(t) = \int_0^t (s-t)\varphi(s) ds + t$$

II-tur Volterra tenglamasini yeching.

Yechimi. Berilgan tenglama yechimini quyidagi

$$\varphi(t) = \varphi_0(t) + \varphi_1(t) + \cdots + \varphi_n(t) + \cdots$$

funksional qator ko‘rinishda izlaysiz. No‘malum $\varphi_0(t), \varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t), \dots$ funksiyalarini aniqlaylik:

$$\varphi(t) = \varphi_0(t) + \varphi_1(t) + \cdots + \varphi_n(t) + \cdots = \quad (7.26)$$

$$= t + \int_0^t (s-t)\varphi_0(s) ds + \int_0^t (s-t)\varphi_1(s) ds + \cdots + \int_0^t (s-t)\varphi_n(s) ds + \cdots .$$

Bundan

$$\varphi_0(t) = t,$$

$$\varphi_1(t) = \int_0^t (s-t)s ds = -\frac{t^3}{3!},$$

$$\varphi_2(t) = \int_0^t (s-t)(-\frac{s^3}{3!}) ds = \frac{t^5}{5!},$$

$$\varphi_3(t) = \int_0^t (s-t)\frac{s^5}{5!} ds = -\frac{t^7}{7!},$$

.....

Bu tengliklarni (7.26) qatorga qoyib, berilgan integral tenglamaning yechimiga ega bo‘lamiz:

$$\varphi(t) = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \cdots .$$

Bundan $\varphi(t) = \sin t$.

7.4.8. $C[0, 1]$ fazoda

$$f(s) = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(s-t)f(t) dt$$

integral tenglama λ parametrning qanday qiymatlarida noldan farqli yechimga ega bo'ladi?

Yechimi. $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ dan

$$f(s) = \lambda \cos s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t f(t) dt + \lambda \sin s \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t f(t) dt. \quad (7.27)$$

Demak, bu tenglama yechimlari

$$f(t) = \lambda(a \cos t + b \sin t)$$

shaklga ega. Bu ifodani (7.27) ga qo'ysak,

$$a = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t (a \cos t + b \sin t) dt,$$

$$b = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t (a \cos t + b \sin t) dt$$

tengliklarga ega bo'lamiz. Bundan

$$a = \lambda \left(\frac{a\pi}{4} + \frac{b}{2} \right),$$

$$b = \lambda \left(\frac{a}{2} + \frac{b\pi}{4} \right)$$

sistemaga ega bo'lamiz. Bu sistema va bundan integral tenglama ham,

$$\lambda = \frac{4}{\pi \pm 2}$$

qiymatda noldan farqli yechimga ega bo'ladi.

7.4.9. $C[0, \pi]$ fazosidagi

$$Ax(t) = \int_0^{\pi} \cos(t+s)x(s) ds$$

operatorining xos sonlarini toping.

Yechimi. λ operatorning xos soni bo'lsin. U holda

$$\int_0^\pi \cos(t+s)x(s) ds = \lambda x(t).$$

bunda $x(t)$ funksiyasi λ ga mos xos vektor. Bundan

$$\cos t \int_0^\pi \cos s x(s) ds - \sin t \int_0^\pi \sin s x(s) ds = \lambda x(t), \quad (7.28)$$

ya'ni

$$x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t, \quad (7.29)$$

bunda

$$c_1 = \int_0^\pi \cos s x(s) ds, \quad c_2 = \int_0^\pi \sin s x(s) ds.$$

(7.29) formuladagi $x(t)$ ni (7.28) ga qo'ysak, u liolda

$$\lambda(c_1 \cos t + c_2 \sin t) = \int_0^\pi [\cos t \cos s - \sin t \sin s](c_1 \cos t + c_2 \sin t) ds.$$

Endi

$$\int_0^\pi \cos^2 s ds = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^\pi \cos s \sin s ds = 0, \quad \int_0^\pi \sin^2 s ds = \frac{\pi}{2}$$

tengliklaridan,

$$\lambda(c_1 \cos t + c_2 \sin t) = c_1 \frac{\pi}{2} \cos t - c_2 \frac{\pi}{2} \sin t.$$

$\cos t$ va $\sin t$ funksiyalarning chiziqli erkli ekanligidan,

$$\lambda c_1 = \frac{\pi}{2} c_1, \quad \lambda c_2 = -\frac{\pi}{2} c_2.$$

(7.28) dagi $x(t)$ xos vektor bo'lsa, u holda u noldan farqli, ya'ni $c_1 \neq 0$ yoki $c_2 \neq 0$. Bundan

$$\lambda_1 = \frac{\pi}{2}, \quad \lambda_2 = -\frac{\pi}{2}$$

operatorning xos sonlaridir.

7.4.10. $C[0, \frac{\pi}{2}]$ fazosidagi

$$Ax(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t+s)x(s) ds$$

operatorining xos sonlarini toping.

Yechimi. λ operatorning xos soni bo'lsin. 7.4.9-misoldagidek, $x(t)$ xos vektor uchun

$$x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t,$$

bunda

$$c_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos s x(s) ds, \quad c_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin s x(s) ds$$

va

$$\lambda(c_1 \cos t + c_2 \sin t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos t \cos s - \sin t \sin s](c_1 \cos t + c_2 \sin t) ds.$$

Endi

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 s ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 s ds = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos s \sin s ds = \frac{1}{2}$$

tengliklaridan,

$$\lambda(c_1 \cos t + c_2 \sin t) = c_1 \frac{\pi}{4} \cos t - \frac{c_1}{2} \sin t + \frac{c_2}{2} \cos t - c_2 \frac{\pi}{4} \sin t.$$

$\cos t$ va $\sin t$ funksiyalarning chiziqli erkli ekanligidan,

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4}c_1 + \frac{1}{2}c_2 = \lambda c_1, \\ -\frac{1}{2}c_1 - \frac{\pi}{4}c_2 = \lambda c_2. \end{cases}$$

Bu sistemadan,

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}}, \quad \lambda_2 = -\sqrt{\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{4}}$$

operatorning xos sonlaridir.

7.4.11. *Integral tenglamani yeching:*

$$x(t) - \int_0^1 (st - s^2 t^2) x(s) ds = t^2.$$

Yechimi. Bu tenglama yechimini

$$x(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2$$

korinishda izlaysiz. Bu ifodani tenglamaga qo'yysak, u holda

$$c_0 + c_1 t + c_2 t^2 = t \int_0^1 s(c_0 + c_1 s + c_2 s^2) ds - t^2 \int_0^1 s^2(c_0 + c_1 s + c_2 s^2) ds + t^2.$$

Bundan

$$c_0 + c_1 t + c_2 t^2 = t \left(\frac{c_0}{2} + \frac{c_1}{3} + \frac{c_2}{4} \right) + t^2 \left(1 + \frac{c_0}{3} + \frac{c_1}{4} + \frac{c_2}{5} \right).$$

Demak,

$$c_0 = 0,$$

$$c_1 = \frac{c_1}{3} + \frac{c_2}{4},$$

$$c_2 = 1 + \frac{c_1}{4} + \frac{c_2}{5}.$$

Bundan

$$c_0 = 0, c_1 = \frac{60}{113}, c_2 = \frac{160}{113},$$

yani, tenglama yechimi:

$$x(t) = \frac{60}{113}t + \frac{160}{113}t^2.$$

Mustaqil ish uchun masalalar

1 – 4 misollarda II-tur Fredholm aynigan yadroli integral tenglamalari yeching:

$$1. \varphi(t) = 2 \int_0^1 (1 + 3ts) \varphi(s) ds + t^2,$$

$$2. \varphi(t) = 2 \int_0^{\pi} \cos s \cos t \varphi(s) ds + 1,$$

$$3. \varphi(t) = 3 \int_0^{\pi} (1 + \sin t \sin s) \varphi(s) ds + t,$$

$$4. \varphi(t) = \lambda \int_0^1 (1 + t + s) \varphi(s) ds + t,$$

5 – 8 masalalarda tenglamalarni ketma-ket yaqinlashtirish usuli bilan yeching:

$$5. \varphi(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 \varphi(s) ds + e^t - \frac{1 - e}{2}.$$

$$6. \varphi(t) = \frac{1}{3} \int_0^1 ts \varphi(s) ds + \frac{1 - e}{2}.$$

$$7. \varphi(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 s \varphi(s) ds + \frac{3}{2}e^t - \frac{1}{2}te^t - \frac{1}{2}.$$

$$8. \varphi(t) = \frac{1}{4} \int_0^1 ts \varphi(s) ds + \sin t - \frac{t}{4}.$$

9 – 12 masalalarda Volterra tenglamalarini yeching:

$$9. \varphi(t) = \int_0^t \varphi(s) ds + 1.$$

$$10. \varphi(t) = \int_0^t (s - t) \varphi(s) ds + 1.$$

$$11. \varphi(t) = 4 \int_0^t (s - t) \varphi(s) ds + t,$$

$$12. \varphi(t) = \int_0^t (6t - 6s + 5) \varphi(s) ds + 6t + 29.$$

ADABIYOTLAR

1. Aleksandrov P.S. Vvedenie v teoriyu mnojestv i obshuyu topologiyu. – M.: Nauka, 1977.
2. Antonevich A.B., Knyazev P.N., Radyno Ya.B. Zadachi i upravleniya po funktsional'nomu analizu. – Minsk: Vysheishaya shkola, 1978.
3. Ayupov Sh.A., Berdikulov M.A., Turgunbaev R.M. Funksiyalar nazariyasi. – Toshkent, 2004.
4. Ayupov Sh.A., Berdikulov M.A., Turgunbayev R.M. Funktsional analiz. – Toshkent, TDPU, 2007.
5. Berezanckii Yu.M., Us G.F., Sheftel' Z.G. Funktsional'niy analiz. – Kiev: Vysha shkola, 1990.
6. Danford N., Shvarts D. Lineynye operatori. T. 1.: Obshaya teoriya. Izd-vo inostr. lit. 1962.
7. Edvards R. Funktsional'niy analiz. – M.: Mir, 1969.
8. Engel'king R. Obshaya topologiya. – M.: Mir, 1986.
9. Gaymnazarov G., Gaymnazarov O.G. Funktsional analiz kursidan masalalar, – Toshkent, Fan va texnologiya, 2006.
10. Gorodetskiy V.V., Nagnibida N.I., Nastasiev P.P. Metody resheniya zadach po funktsional'nomu analizu. – M.: Vysshaya shkola, 1990.
11. Ibragimov M.M. Funktsional analizden misallar. – Nukus, Bilim, 2007.
12. Iosida K. Funktsional'niy analiz. – M.: Mir, 1967.
13. Kantorovich L.V., Akilov G.P. Funktsional'niy analiz. – M.: Nauka, 1977.
14. Kirillov A.A., Gvishiani A.D. Teoremi i zadachi funktsional'nogo analiza. – M.: Nauka, 1979.

15. Knyazev P.N. Funksional'niy analiz. – Minsk: Vysheyshaya shkola, 1985.
16. Kolmogorov A.N., Fomin S.V. Elementi teoriy funksiy i funktsional'nogo analiza. – M: Nauka, 1977.
17. Kutateladze S.S. Osnovy funktsional'nogo analiza. – Novosibirsk, 2001.
18. Lyusternik L.A., Sobolev V.I. Elementy funktsional'nogo analiza. – M.: Nauka, 1965.
19. Natanson I.P. Teoriya funksiy veshestvennoy pereimennoy. – M: Nauka, 1974.
20. Ochan Yu.S. Sbornik zadach po matematicheskому analizu. – M.: Prosveshenie, 1981.
21. Riss F., Sekefal'vi-Nad'. Leksiy po funktsional'nomu analizu. – M.: Mir, 1979.
22. Robertson A., Robertson B. Topologicheskie vektorniye prostranstva. – M.: Mir, 1967.
23. Rudin U. Funktsional'niy analiz. – M.: Mir, 1975.
24. Sadovnichiyy V.A. Teoriya operatorov. – M.: Vysshaya shokla, 1999.
25. Sarimsakov T.A. Funktsional analiz kursi. – Toshkent, O'qituvchi, 1980.
26. Sarimsakov T.A. Haqiqiy o'zgaruvchili funksialar nazariyasi. – Toshkent, 1989.
27. Shefer X. Topologicheskie vektornie prostranstva. – M.: Mir, 1971.
28. Sherstenev A.N., Lugovaya G.D. Funktsional'niy analiz. – Kazan, 2008.
29. Trenigin V.A. Funktsional'niy analiz. – M.: Nauka, 1980.
30. Trenigin V.A., Pisarevskiy B.M., Soboleva T.S. Zadachi i upravleniya po funktsional'nomu analizu. – M.: Nauka, 1984.
31. Vainberg M.M., Funktsional'niy analiz. – M.: Prosveshenie, 1979.
32. Vulix B.Z. Vvedenie v funktsional'niy analiz. – M.: Nauka, 1967.